



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online.

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyrightvilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der ofte er vanskelig at opdage.

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig.

### **Retningslinjer for anvendelse**


Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at kunne tilvejebringe denne kilde.

Vi beder dig også om følgende:


- Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug  
Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål.
- Undlad at bruge automatiserede forespørgsler  
Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maskinoversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe.
- Bevar tilegnelse  
Det Google-"vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det.
- Overhold reglerne  
Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig.

### **Om Google Bogsøgning**

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på internettet på <http://books.google.com>



My dear  
Mother  
11



# Homöopathisk Hus- og Familielæge.

En Fremstilling  
af  
Homöopathiens Grundlæggninger  
til  
Helbredelse af Sygdomme.

Af  
**Dr. Clotar Müller,**  
praktiserende Læge i Leipzig.

Øversat fra Tysk.

Forøget og med et Forord af

**Oscar Hansen,**  
Cand. med. & chir., homöopathisk Læge.

---

Kjøbenhavn.

Forlagt af den homöopathiske Forening.  
I Commission hos Andr. Frd. Høst & Søn.

1881.

Der h.  
F.

10 F. 09 51274

## Forord.

---

Da jeg for 2 Aar siden udgav en Bearbejdelse af Clotar Müllers „Charakteristik von dreißig der wichtigsten homöopathischen Heilmittel“ (Kortfattet homöopathisk Lægemiddellære), ansaa jeg det for meget vigtigt at Forfatterens Huuslæge ogsaa blev overført i det danske Sprog, da disse 2 Bøger supplere hinanden. Homöopathisk Forening havde tidligere udgivet Chempells Huuslæge og da denne deels var noget kortfattet deels var udsolgt, blev Udgivelsen af nærværende Bog strax besluttet. Det er aldeles ikke Hensigten med Bogen at Lægfolk skulle paatage sig at behandle Sygdomme, men den er, som ogsaa Forfatteren betoner, kun en Hjælp i Nødstilfælde. Der er adskillige Steder tilføjet deels nyere Lægemidler deels Midler, hvoraf jeg i min Praxis har seet gode Resultater og med



Hensyn til Fortyndingerne er der fulgt en Middel-  
vei, thi meget lave Fortyndinger bør ikke anvendes  
af Lægfolk og høiere Fortyndinger maa ligeledes  
være overladt Læger.

Årsagen til at jeg særlig har valgt Elotar  
Müllers Huuslæge ligger i, at han overalt bærer  
Indtrykket af at være en grundig og videnskabe-  
lig homøopathisk Læge, og hans Raad staae  
altid til. Endvidere er han bekjendt som  
særlig dygtig i Lægemiddellæren der er Basis  
for hele Homøopathien. Oversættelsen har mange  
Steder været vanstelig og især det alfabetiske  
Register, men da Lægemidlerne danne det Vigtigste  
ved Bogens Indhold og jeg i mine Tilfælselser  
kun har anført hvad der er sikkert, kan  
dette vel opveie det reent Literære. Hermed  
sendes Bogen ud til enhver Ynder af Homøo-  
pathien og til Enhver, der har Interesse for at  
indsee en fuldbyrdet Sandhed, som Angreb nu  
ikke kan omstøde.

**Oscar Hansen,**

Cand. med. & chir.

Homøopathisk Læge.

Kjøbenhavn, den 19de Marts 1881.

# Første Deel.

## § 1.

### Homøopathiens Grundfæetninger og Lærdomme.

Medicinen i sin Begyndelse lader sig føre tilbage til Mennefteslægtens ældfte Tider; Trangen til at hæve eller lette Legemets mangfoldige Mangler og Sygelighed er altfor naturlig og kraftig, til at ikke allerede Menneftet i dets mest raa og ubannebe Tidsalder ftulde have føgt og fundet Midler, til ialfald deelviis at opnaae dette Maal. Ja, Trangen til at fittre fine Medmennefter mod disse fynlige Forftyrrelfer af Sundheden, fom tilmed ftedfe erindrede om egen Fare, og at bringe Hjælp og Lindring imod Smerten, denne til alle Tider meeft frygtebe Ledfager af legemlige Lidelfer, var faa mægtig, at allerede temmelig tidlig Enfelte føgte deres Kalb deri, og helligede deres hele Livs Stræben til at udfinde Midler til Lindring af Smerterne og de Syges Pleie og Helbredelfe. Deraf er det da kommet, at længe forinden Grunden blev lagt til de flefte enten Kunfter eller Videnfaber, fandtes

allerede Lægestanden saavel i Navnet som i Gjerningen, og at allerede Lægekunsten blev lært og udøvet. Paa et Tidrum af 3000 Aar tør denne den ældste af alle Videnskaber see tilbage og i ethvert Aarhundrede være stolt af den uubtømmelige Kilde af reen Begejstring og opoffrende Uegennyttighed, hvormed hver af dens bedste Kræfter troligen forfulgte dette ædle Maal. Saa roesværdig nu end denne Kjendsgjerning er for den i Menneftet dybtgrundede Sands for Kjærlighed og afgiver et Vidnesbyrd om den opoffrende Stræben efter Sandhed, saa er dog disse kjæmpemæssige Bestræbelser's Resultat ingenlunde meget lovende for den menneskelige Aandskrafts og Begavelses Rækkeevne. Thi naar man forfølger Medicinens Historie fra dens Oprindelse indtil dette Aarhundredes Begyndelse, og overstuer og sammenligner dens enkelte Perioder og Phafer med uhildet Blik, saa staar man gysende foran en styg Forvirring og et uopløseligt Vildrede af Modsigelser, uholdbare Antagelser og ubeviste Paastande, og savner med Beklagelse, endog saa enhver Begyndelse af Bygningen og Fremskridtet til et bestemt fastsat Maal. — Paa den ene Side opkobede den groveste Overfladisthed Masser af formeentlige Erfaringer, hvis absolute Uduelighed gjorde enhver Benyttelse umulig; paa den anden Side fortabte Phantasien og Speculationen sig i de meest forvirrede Theorier og Systemer, hvis stadige Bristen gav Signalet til Opsørelsen af lignende endnu mere uholdbare.

De virkelige Fremskridt og de eneste Resultater, som stode Prøve af saa mange betydelige Mænd i en saa lang Arrække vedkom altsaa ubeluffende Medicinens Hjælpevidenskaber: Anatomien, Physio-

logien, Physik og Chemi, medens selve det egentlige Maal, — Sygdommens Helbredelse, — ikke fremme-  
des, og saaledes Lægekunsten næsten forblev hen-  
staaende paa det samme videnskabs- og principløse  
Standpunkt, hvorpaa den havde staaet siden Menne-  
ffeslægten's Barndom.

Dette var desværre Frugten af en mere end  
totusindaaarig medicinsk Erfaring! derfor kunde en  
berømt Læge, Hofraad Girtanner, ved Slutningen  
af forrige Aarhundrede sige høit og offentlig: „Det  
er indlysende, hvorfor der ikke findes og hvorfor der  
ikke kan findes to Læger, som ere fuldkommen enige  
i Alt. Thi da Lægevidenskaben aldeles mangler  
Principer, da Intet i samme er afgjort, da der  
i samme ikkun findes saa fikke, tilforladelige Er-  
faringer, saa har enhver Læge Ret til kun at følge  
sin egen Mening.

Hvor der ikke er Tale om nogen Videnskab, hvor  
alle kun mene, der er den ene Mening lige-  
saa meget værd som den anden. I Uvidens-  
hedens tykke ægyptiske Mørke, hvori Lægerne vanke  
omkring, er end ikke den mindste Lysstraale tilstede,  
ved Hjælp af hvilken de kunne orientere sig. Naar  
to Læger træffe sammen hos en ikke farlig Syg,  
saa gaaer det dem ofte som det gif Sandfigerne i  
Rom: det bliver dem vanskeligt at skjule Latteren,  
naar de see paa hinanden.\*)

Ja den berømte Boerhave fandt ingen Betænke-  
lighed ved offentlig at paaftaae, at det vilde have  
været langt fordeelagtigere for Menneskeslægten,  
dersom der aldrig havde været Læger til i Verden,

\*) Udsørlig Fremstilling af det Brown'ske System. Göt-  
tingen 1798. Bind 2, Side 598.

og den høitstillede Schönlein sagde om Medicinen, at den saa godt som ingen Fremskridt havde gjort siden den helleniske og romerske Cultur, og at den maatte ombygges fra neden af paa et, ganske nyt Grundlag.

Netop paa den Tid, da Medicinens trøstesløse og jammerlige Tilstand begyndte at blive indlysende for enkelte klare Hoveder i dens hele Haabløshed, netop i den Periode, hvor atter et af alle Europas Læger med skamløs Letfindighed optaget System, Browns morderiske Lære, kom i Forfald, falder Samuel Hahnemann's Liv og Virksomhed, den Mand's, som med uforfærdet Mund aabent godtgjorde Lægekunstens Svagheder og Synder for den forbausede Menneſtehed, og først af alle Læger, tilveiebragte et simpelt og sandt Princip, Grundbetingelser for enhver planmæssig Uddannelse.

Samuel Christian Friederich Hahnemann, født den 10. April 1755 i Meissen, død den 2. Juni 1843 i Paris, blev, efter at have udøvet Lægekunsten praktisk i nogle Aar, saa mægtig greben af dens Utilstræffelighed og Jammerlighed, at han aldeles opgav sin Praxis, og alene beskæftigede sig med Chemi og videnskabelige Arbejder. Heri, og navnlig i Chemien, ydede han i flere Henseende saa dygtige Resultater, at hans Navn allerede herved vilde været overleveret Fremtiden. Alene herved var det bestemt, at tænde et langt stærkere lysende Lys i Lægekunstens Mørke. Midt i disse theoretiske Arbejder, navnlig ved Bearbejdelsen af Cullens Lægemiddellære, og gjort opmærksom ved dennes forvirrede Forflaringer om Chinabarkens feberstillende Kræfter, opdagede hans skarpe Blik pludselig den Lov, som af en Substants Virkning i det sunde

Legeme lærer at kjende dens passende Anvendelse i lignende Sygdomme. Paa sig selv gjorde han først Forsøget og fandt, at et Løb Chinabark, dette anerkjendte Middel mod Koldfeber, fremkaldte Symptomer i det sunde Legeme, som nøjagtig lignede et Anfald af Koldfeber. Fortsatte Forsøg paa hans Nærmeste og med andre Substantier gjorde hans Opdagelse til uomstødelig Visshed og gav hans stæbende Aand det sikre Fundament, hvorpaa han med jernfast Sikkerhed og glimrende Skarpsindighed opbyggede et medicinsk System; han traadte op imod det Bestaaendes Autoritet og fastede en tusind-aarig formeentlig Erfarings Sætninger overende. — At vove en slig Kamp imod alle, det kunde kun en klippefast Tro paa sin Sags Sandhed, og en uroffelig Sjælefasthed, men at kunne gennemføre denne Kamp med Glands og Seir, derfor kunde han kun takke sit Genies Kraft og Sandhedens overbevisende Magt, for hvilken i Længden Menneskets Øre ikke kan blive lukket. Derfor forbleve Spotternes og Simpelhedens Raaben, som hans lærde og høitstaaende Modstandere førte imod ham, uden Virkning paa den stakkels, ubeskyttede Mand, derfor udslyngede Faculteterne og Universiteterne forgjæves deres Buller og Banbuller, og Regjeringerne deres Forviisnings- og Confiskationsdecreter, derfor fandt hans Lære hurtig begejstrede Tilhængere og Beskyttere, som skaffede den Anerkjendelse og Beskyttelse saaledes at den inden kort Tid fandt Udbredelse og fik fast Fod i alle Lande, og forlængst har indtaget dens berettigede Stilling, uden at føres vilb eller forhindres deri af dens Fjenders Skraal.

For saa vidt nu Medicinen er berettiget til at være alle dannede Menneskers Fællesejendom

og idetmindste at blive forstaaet af Alle i dens Grundsætninger og Elementer, saa skal her Homøopathiens Væsen blive fatteligt fremstillet i al Kort-  
hed, og dens Læresætninger tydeligt blive forklarede, saamegetmere, da med den stigende Oplysning enhver Kunst og Videnskab atter mere og mere maa  
tage dens tidligere exclusive og kastermæssige Stil-  
ling, og det netop med Hensyn til Sundhedsplejen  
maa synes paatrængende nødvendigt, at visse Kund-  
skaber faae en muligst almindelig Udbredelse. Netop  
Homøopathien egner sig fremfor alle andre Videns-  
skaber til en populær Fremstilling i vide Kredse,  
fordi man om den med Rette kan sige: „Let-  
fattelighed er et Tegn paa Sandhed.“

Homøopathiens øverste Grundsætning, ved hvis  
Fastsættelse Hahnemann, istedetfor den hidtidige  
principløse Vilkaarlighed og hule Theori, gav en  
sikker og positiv Lov for Lægemidlernes Anvendelse  
i Sygdomstilfælde, er altsaa, som alt bemærket,  
Lighedsløven (*Similia Similibus*)\* Denne Ly-  
der i dens praktiske Anvendelse saaledes: Ethvert  
Sygdomstilfælde helbrederes paa den hurtigste og  
sikkerste Maade ved det Læge-  
middel, som i det sunde Legeme frembringer  
de mest lignende Tilstande. Overensstem-  
melse imellem Sygdommens Symptomer og Læge-  
midlets Virkninger er det ledende og afgjørende  
Moment for Lægemidlets Anvendelse. Hahnemann  
opdagede denne nye Lov, som stod i fuldkommen  
Modsatning med Grundsætningen i den hidtidige  
Medicin, først ved Prøver med Chinabark, men  
snart viste det sig, at det samme, selv ubevidst,

---

\* D. e. Lignende helbreder Lignende.

allerede ofte var blevet anvendt, og laa til Grund for alle tidligere sande Helbredelser af Sygdomme. Saaledes havde f. Ex. allerede Hippocrates helbredet en Slags Cholera med Veratrum, et Midbel, som hos Sunde frembringer Brækning, Diarrhoe og choleraagtige Tilstande; den engelske Svedfeber, en i Aaret 1485 grasserende Sygdom, af hvilken der i dens Begyndelse døde 99 af 100 Angrebne, blev ved Anvendelse af sveddrivende Midler forandret til en ganske farefri Sygdom; Opium, som hos Sunde fremkalder Søvn, var med største Held blevet anvendt af Osthoff og Flere imod en epidemisk Feber, som var ledsaget af uimodstaaelig Sovetrang og Vildelser; imod Frost var allerede længe Jis og Snee, og mod Smerterne ved Forbrændinger en jevn Varmegrad bekjendt og anvendtes som de bedste Helbredelsesmidler; Faren for Mennekeskopper havde Jenner lært at afvende ved Indpodning af det aldeles lignende Rokoppestof. Ved slige ubestridelige Kjendsgjerninger var altsaa Helbredelsen af Sygdomme efter Lighedsprincipet gjort utvivlsom, og Hahnemann kunde med Rette opstille samme som en Naturlov, som, støttet ved utallige uomstødelige Beviser og Kjendsgjerninger, som saadan maatte optages i Videnskaben, selv om denne ikke var istand til at forklare denne tilstrækkeligt, ligesom Naturvidenskabens første Love og Grundsætninger næsten alle ere givne ved Jagttagelser og Erfaring, og deres Forklaring og Væsens Begrundelse a priori i de fleste Tilfælde er umulig. Uagtet Hahnemann saaledes ikke behøvede den videnskabelige Forklaring, hvorledes Helbredelsen efter Lighedsloven fandt Sted, og til lige kun tillagde en saadan forholdsmæssig liben



Værbi, saa har han dog i sin „Organon der Heilkunst“ (5te Oplags § 28 og 29) opstillet følgende Anskuelse som den sandsynligste, da den er grundet paa lutter Erfarings-Præmisser: Enhver sund Organisme oplives af en aandelig (dynamisk) Kraft (Livskraft) og holder den i harmonisk Orden; uden denne Kraft er Organismen død. Naar Menneftet bliver sygt, saa er oprindeligt denne Livskraft trykket af en, Livet fjendtlig, Indflydelse (Sygdomsarsagen), hvilket ytrer sig ved Fornemmelser og Virkninger i Organismen, som ere uregelmæssige, hvilke kaldes Sygdomssymptomer. Disse samlede Symptomer ere det Eneste, som Lægen kan bedømme ved ethvert Sygdomstilfælde; Sygdommen bestaaer derfor ligeoverfor Lægen alene i disse samlede Symptomer. Ere alle Sygdomssymptomer fjernede, saa maae altsaa ogsaa Sygdommen selv, d. e. Livskraftens Nedtrykning være helbreddet; Lægen har altsaa ene og alene at bortfjerne Indbegrebet af Sygdomstegnene, for at helbrede hele Sygdommen; derfor ere de samlede Symptomer den eneste Henviisning til det Lægemiddel, som skal vælges. Men Sygdomssymptomerne kunne ikke helbredes af Lægemidlerne uden disse have Kraft til ligeledes at fremkalde Forandringer i Legemets Befindende; denne Lægemidlers Kraft kan alene iagttages ved deres Indvirkning paa det sunde Legeme. De sygelige Symptomer, som Lægemidlerne fremkalde i det sunde Legeme, ere ligeledes det Eneste, hvorefter vi lære at kjende deres Lægekraft imod Sygdommen. Ved Indgiot af en Medicin, som nøjagtig er valgt efter Symptomernes Lighed bliver nu fremkaldt en lignende, kunstig, noget stærkere Sygdomsaffektion i den af den naturlige Sygdom forstemte Livskraft,

og indskudt istedetfor den svagere naturlige Sygdomsophidselse, imod hvilken derfor den instinctmæssige Livskraft nødsages til at rette en forhøiet Energi, men som den paa Grund af den ved Medicinen frembragte Sygdoms korte Virketid, snart overvinder og saaledes atter bliver istand til at fortsætte Organismens Liv i Sundhed. — Ganske paa samme Maade helbreder f. Ex. undertiden Naturen en tilstedeværende Sygdom, hvis Symptomer have Lighed med den førstes; saaledes bliver f. Ex. et chronisk (langvarigt) Hududslet eller en Dienbetændelse vedvarende hævet ved udbrydende Kopper eller ved Indpodning af Krokoppervæbste, ligesom en tilstedeværende Righoste ved Mæslinger etc. Kun derved, at begge disse Sygdomstilstande, som træffe hinanden i Organismen, have Lighed og Overensstemmelse med hinanden i Symptomerne og de angrebne Organer, kan en vedvarende og radikal Helbredelse finde Sted, medens forskjellige og ueensartede Sygdomme, som den daglige Erfaring lærer, bestaa og udvikles ved Siden af hinanden. Homøopathien følger altsaa strengt den samme Vej, som Naturen følger til Sygdommens grundige Helbredelse, kun at den førstnævnte har ulige flere Udsigter end Naturen, som kun tilsender nogle faa Sygdomme som homøopathisk Hjælp mod andre Sygdomme og desuden kun formaaer at naa sit Maal ved store Ubehageligheder og Farer.

Foruden Hahnemanns Forklaring have ogsaa flere af hans Elever, senere Homøopathier, anstillet videnskabelige Granskninger over hvorledes Helbredelsen finder Sted efter Lighedsloven, og navnlig efter Lægemidlernes saakaldte Førstevirkninger og Eftervirkninger, saavelsom Sygdomspir-

ringens Afstumpning etc., givet mere eller mindre fattelige og tilfredsstillende Forklaringer angaaende Helbredelsesprocessen. Men med Rette har Hahnemann ikke lagt for megen Vægt paa disse theorethiske Forklaringsforsøg, fordi man derved altid maatte forlade de rene Kjendsgjerningers reale Grund og gribe til kunstige Slutninger og Combinationer. Ja, selv om ikke en eneste nogenlunde holdbar Theori for Helbredelsesprocessen var lykkedes for Homöopatherne, saa vilde desuagtet Lighedsprincippet fremdeles have fuld Gylbighed som Naturlov, da samme støttes ved rene Jagttagelser og Kjendsgjerninger, saaledes som f. Ex. Tilstedeværelsen af Hagl ikke vil bestrides af Noget, uagtet det maaste hidindtil endnu ikke er lykkedes, tilfredsstillende at forklare, hvorledes de fremkomme.

Men for at kunne anvende Lighedsloven, d. e. for at kunne udfinde det Lægemiddel for det tilstedeværende Sygdomstilfælde, som frembringer de meest lignende Tilfælde i det sunde Legeme, og som Følge deraf maa være det homöopathiske Lægemiddel i det foreliggende Tilfælde, saa er fremfor Alt fornødent: 1) den nøjagtige Undersøgelse af Sygdomssymptomerne og 2) den mest mulige Kjendskab til Lægemidlernes Virkninger paa det sunde Legeme.

Hvad nu det første Punkt angaaer, Undersøgelsen af Sygdomssymptomerne, saa maa denne med Homöopathien for Dje være ulige nøjagtigere og omhyggeligere, end ved den tidligere Lægekunst. Fremfor Alt maa der ganske afstaaes fra den blotte Generalisering d. e. det er aldeles utilstrækkeligt, at inddele og opkalde Sygdommene efter deres bestemt fremtrædende Symptomer,

i visse Klasser, som f. Ex. som Lungebetændelse, Nervefeber, Kighoste etc., men ethvert tilstedeværende Sygdomstilfælde maa altid betragtes som et særskilt Individ, og opfattes i alle sine enkelte Maader at vise sig paa. Thi Homöopathien kjenner ikke til Sygdomsfamilier, men alene til Sygdomstilfælde, og vælger det mest passende Lægemiddel, ikke efter Sygdomsnavnet, men efter Symptomerne for det enkelte Sygdomstilfælde. Inddelingen og Benævnelsen af Sygdommene efter bestemte fremtrædende Symptomer, kan kun have nogen Værdi for Pathologien (Sygdomslæren) og Diagnosen (Sygdommens Navn) idet denne ved Grupperingen af de enkelte Sygdomme letter Oversigten og frembyder Tilknætningspunkter for en Sammenligning af lignende Sygdomme; men ved Sygesengen tør den, med Hensyn til Valget af Lægemidlet, for Homöopathen være uden eller kun af meget begrænset Indflydelse. Homöopathen maa meget mere betragte ethvert Sygdomstilfælde som et ejendommeligt og med den største Opmærksomhed og den størst mulige Skarpsindighed udforske alt dertil henhørende, ja selv ikke lade det meest ubetydelige Symptom upaaagtet. Hertil udfordres den fuldstændigste Kjendskab til Lægemets Bygning, Bestaffenheden, Beliggenheden og Sammenhængen af Lægemets samtlige Dele, d. e. Anatomien, ligesom ogsaa disses Betydning og Funktioner i sund Tilstand, d. e. Physiologien, og endelig de i Sygdommen forekommende Afvigelser og Strukturforandringer, d. e. Pathologien. Ligeledes udfordres hertil et ganske særdeles Hensyn til Anamnese, d. e. de Sygdomstilstande, som ere gaaede forud i det foreliggende Tilfælde, ligesom fremfor Alt ogsaa til

Ætiologi, d. e. Kundskab om Aarsagen og Foranledningen til Sygdommen; thi Fjernelsen af den skadelige, endnu virkende Indvirkning maa naturligvis ogsaa i Homøopathien være den første og væsentligste Opgave. Saaledes maa f. Ex. naturligvis overalt, hvor det er muligt, den indtrængte Splint udtages af Øjet, Ruglen udbrages af Skudsaaret, Giften fjernes af Maven ved Brækning, den kvælende Luft i Bærelset hos Skindøde fornyes med frisk etc. Af alt dette fremgaar tydeligt, at Homøopathen for rigtig at opfatte og udforske alle det foreliggende Sygdomstilfælde Fremtoninger, maa kende alle Medicinens Hjælpevidensskaber ligesaa godt som Allopathen, ja tilbøls endnu i større Fuldstændighed, kun med den Betydning, at han ikke, som denne, alene benytter den til Diagnosen (Benaævnelse af Sygdommen) men til en sikrere Helbredelse. Hahnemann selv betjente sig istedetfor alle kunstige Classificationer af Sygdommene, til Brug ved en almindelig Oversigt kun af Inddelingen i acute og chroniske Sygdomme, og forstod ved den første Betegnelse en hurtig Sygdomsproces i den abnorm nedtrykte Livskraft, som kunde udvikle sig i middelmaadig, kortere eller mindre kort Tid; chroniske Sygdomme kaldte han saadanne, som fra en lille, ofte ubemærket Begyndelse forstemme den levende Organisme dynamisk, og efterhaanden fjerner den saaledes fra den sunde Tilstand, at den til Sundhedens Vedligeholdelse bestemte Livskraft kun formaaer at møde den med en ufuldkommen, uhenigtsmæssig og unyttig Modstand, men som ikke kan udslette den, men maa lade den udbrede sig indtil Organismen endelig ødelægges. Som eneste Kilber til chroniske

Sygdomme antog han senere Psora (Snatshygelighed), Syphilis og Sykosis, imidlertid har den sidste Antagelse ikke bekræftet sig i dens fulde Udstrækning og i Særdeleshed ikke i dens Indvirkning paa Behandlingen og er derfor aldeles opgivet af de fleste af Homøopathiens Udvøvere.

For at optage et Sygdomstilfælde nøjagtigt, er det derfor for det meste nødvendigt at optage de iagttagne Symptomer. Men lader i den Anledning først og fremmest den Syge eller hans Nærmeste rolig fortælle Sygdommens Tilblivelse og give en Skildring af alle hans Besværligheder og alle de Symptomer, som afvige fra den sædvanlige Tilstand. Derefter maa Lægen personlig undersøge Legemets sygelige Bestaenighed og dets forandrede Functioner, hvorved han maa tage Hensyn til den Syges Rjøn, alle forudgangne Sygdomme, Aarsagen til det nuværende Tilfælde og de maaske allerede benyttede Lægemidler o. s. v., navnlig ogsaa ved mange Sygdomme undersøge Bryst og Underlivsorganerne ved at føle, banke og lytte (Percussion og Auscultation); thi til Fuldstændiggjørelse af Sygdomsbilledet maa ogsaa alle indre Sygdomssymptomer saavidt muligt opsiges og tages med i Betragtning. Endelig maa ved indgaaende Spørgsmaal den Syges Opgivelser fuldstændiggjøres og nærmere bestemmes; saaledes navnlig med Hensyn til Smerternes Sæde og Art, med Hensyn til Indflydelsen af Dagstiden og de forskjellige Legemsstillinger, til Søvnen, Vandladning, Hudvirksomheden, Kræfternes Tilstand, den maanedlige Renselse, Sindstilstanden etc.

Først naar paa denne Maade Billedet af en tilstedeværende indre Sygdom med Skarpsindighed

og Forbudsfrihed er bragt til ydre Anstuelighed med alle dens Ejendommeligheder, først da er Lægen istand til at gaa til sin næste Opgave, nemlig at opsoge et Lægemedel, hvis Virkninger paa det sunde Legeme have den størst mulige Lighed med de foreliggende Sygdomssymptomer.

Den anden Nødvendighed for Lighedslovens praktiske Anvendelse er altsaa, som allerede sagt, et fuldkomment Kjendskab til Lægemedlernes Virkninger paa det sunde Legeme. Efterat Lægerne i saa mange Aarhundreder havde anvendt Lægemedler i rigeligt Maal, var man berettiget til at vente, at deres Kræfter og Virkninger paa Organismen vare tilstrækkelig bekjendte til at kunne begrunde og retfærdiggjøre deres Anvendelse. Men til Lægernes Stam maa det blive bekjendt, at de i saa Henseende ere gaaede tilværks med formastelig Letsindighed og have imødegaaet Sygdomme med Lægemedler, hvis Virkninger de slet ikke kjendte. Thi ligesom man forgjæves havde grublet over Sygdommens indre Væsen, havde opstillet de forskjelligste Hypothesser og Theorier, og paa disse opbygget de kunstigste Systemer og Helbredelsesmetoder, istedetfor ene og alene at holde sig til den rene Sagttagelse af de Sygdomssymptomer, som vare kjendelige, saaledes havde man ogsaa villet udforske Lægemedlernes eiendommelige Helbredelseskræfter alene ved en overfladisk Sagttagelse af sammes ydre og kemiske Egenskaber, ved den bedrageriske Erfaring af deres Resultat, ved Sygeleiet, eller endelig ogsaa ved en vilkaarlig, meest paa rene Indbildninger begrundet Classificeren. Til Overflødighed havde man endogsaa forplumret ja ligefrem ødelagt den eneste, om ogsaa høist

ufikre Rilbe, nemlig at samle Erfaringer om Lægemidlernes Virkninger af deres Anvendelse mod Sygdomme derved at man ikke anvendte rene og ublandede Lægemidler, men Blandinger af de forskjelligste Substantier, saaledes at det var umuligt at komme til Erkjendelse af, hvilket af de mange Lægemidler man skulde tilskrive Virkningen. Saaledes kom det da, at der med Hensyn til de fleste Lægemidler fandt de mangfoldigste og hinanden modsigende Paastande Sted, og at efter den netop da herskende Skole et Middel blev regnet for styrkende eller opløsende, som af Andre blev anseet for et bedøvende Middel. Og slige Modsigelser forekom ikke alene ved de svagtvirkende Lægemidler, men netop med Hensyn til de kraftigste Lægemidler, som Opium, Digitalis, Arsenik, Antimon, Mercur etc. herskede den største Tvivl og Strid, og bleve de meest modstridende Paastande opstillede. Saaledes har man f. Ex. i Aarhundreder været uenige om Opium styrker eller svækker, pirrer eller beroliger, opheber eller kjøler, og Sydenham erklærede, at han uden dette Middel ikke gad være Læge, medens den berømte Stahl ligefrem kaldte enhver Anvendelse af dette Middel en Forargelse. Ja, Gui Patin paa stod for Alvor om Antimon, et hyppig anvendt og meget yndet Lægemiddel, at der ved samme var ødelagt flere Menneſter end i Trediveaarskrigen. Angaaende Kvikſølvets Virkninger ere mangfoldige Bind fyldte, og der gives ingen Lægekraft og ingen Egenſkab, som ikke er tilskrevet dette Middel af Nogle, medens den af ligesaa Mange er beſtridt. Det maa ſandelig tilskrives en vanærende Forblindelse eller en ubeſkrivelig Letſindighed, at der anvendtes en Maſſe af de kraftigſte og giftigſte Sub-



stantfer imod ubekjendte Sygdomme, uden at der har des andet end svage Anelser eller aldeles vilkaarlige og indbildte Forestillinger om deres Virkninger, og Hahnemann revsede med fuldkommen Ret en sliq Formastelse da han skrev: Ingen Lømmemand bearbejder sit Træ med Værktøi, som han ikke kjender; han kjender ethvert nøie, og veed derfor, hvor han skal anvende det ene eller andet, for at frembringe det, som det er Hensigten at fremstille, og dog er det kun Træ, som han behandler, og han er kun en Lømmemand.

Hahnemann har ikke alene den Fortjeneste, at have erkjendt og staaanselsløst at have stillet denne affkyelige Forvirring og det skjændige Uvæsen, som blev drevet med Tusinders Sundhed, i Gabetoppen, men han har tillige tændt et klart Lys i det ægyptiske Mørke og banet en sikker Vej ud af denne Labyrinth, idet han paaviste, at det eneste Middel til at lære de enkelte Lægemidlers Virkninger at kjende, er at prøve dem paa det sunde Lægemæ. Om ogsaa allerede nogle lyse Hoveder saasom Størck, Hoffmann, Wepfer, v. Haller etc. havde gjort Hentydninger og nogle enkelte Forsøg med Hensyn til Nytten og Nødvendigheden af at prøve Lægemidler paa Sundt, saa vare saadanne dog kun enkeltstaaende Antydninger og bleve snart igjen opgivne, fordi Møglen til deres Benyttelse og praktiske Anvendelse, nemlig Lighedsprincippet, endnu ikke var opdaget. Hahnemann lod sig ikke nøie med at have viist Vejen, men han lagde selv, trods Møisommeligheden og Offre af Tid og Penge, strax Haand paa Værket med storartet Skarpsindighed, Flid og Udholdenhed, prøvede deels paa sig selv, deels paa sine Nærstaaende, grundede og levede

Prøveforeninger, og skaffebe saaledes i forholds-  
mæssig kort Tid en reen Lægemiddel-Lære  
tilveje, som snart var tilstrækkelig til Helbredelsen  
af de fleste forekommende Sygdomme, og som efter-  
haanden ved hans Clevers og Tilhængeres An-  
strængelser, stadigen har nærmet sig Fuldkommen-  
heden mere og mere.

Til disse Prøver udfordres foruden en fast  
Willie og Udholdenhed, fremfor Alt og nødvendigtvis  
stor Forsigtighed, Nøjagtighed, skarp Iagttagelses-  
evne, streng Samvittighedsfuldhed og klar Forstand,  
for rigtig at opfatte de iagttagne Forandringer ved  
Tilstanden og betegne dem i tydelige Udtryk. Der-  
for ville Læger bedst egne sig dertil, da disse til-  
lige besidde et fuldkomnere Kjendskab til Legemets  
Organer og deres Functioner. Tilmed maa et-  
hvert Lægemiddelstof, der skal prøves, indtages al-  
deles rent og ublandet, og under hele Prøvetiden  
enhver fremmed medicin's Substant's strengt und-  
gaaes, ligesom overhovedet iagttages en naturlig  
Diæt og en regelmæssig Levemaade, med Und-  
gaaelse af alle overdrevne, aandelige og legemlige  
Anstrængelser, al anstrængende Nattevaagen, Udsfei-  
elser og Sindsbewægelser.

Men da nu ethvert Lægemiddelstof har sine  
eiendommelige, fra alle andre afvigende Virkninger,  
saa maa ogsaa ethvert omhyggeligt prøves med  
Hensyn til Eiendommeligheden af dets særegne Virk-  
ninger; derfor maa ethvert Lægemiddelstof prøves  
paa flere, helst muligt mange Personer, for at alle  
dets Virkninger kunne komme for Dagen og de sær-  
deles karakteristiske og eensartede Symptomer kunne  
vise sig fremfor de mere tilfældige og individuelle.  
Just derfor maa Prøvepersonerne deels være af det

mandlige, deels af det kvindelige Rjøn, for at navnlig Symptomerne paa de forskjellige Rjønssystemer kunne erkjendes. Endelig maa man herved endnu tage Hensyn til, at stærke, giftige Substanter kun maa tages i ringe Indgiot, medens de af mildere Natur maa tages i større Dosis og de svageste kun ere at prøve paa pirrelige og modtagelige Personer. Hos Personer, der ere let modtagelige for Lægemidlernes Virkning er det ogsaa hensigtsmæssigt, at prøve Lægemiddelfstoffer i højere Fortyndinger og Rivninger. Foruden disse forsætlige Prøver paa Sunde ere ogsaa lignende at foretage paa Dyr, for ved de hos disse mulige Obduktioner at kunne iagttage Forandringen i de indre Legemsdele. Fremdeles maa ogsaa de tilfældige Forgiftninger med Lægemiddelfstoffer omhyggelig samles, og de derved indvundne, ofte meget vigtige Symptomer, lægges til de andre, og endelig maa ogsaa, for at fuldstændiggjøre ethvert Lægemiddels Karakterbillede, tilføjes de ved samme opnaaede constante Erfaringer og Resultater, fordi de garantere en højest værdifuld Bekræftelse og Udvidelse af Prøvens Resultater.

Kun paa denne Maade er det muligt, at udforske de rene Virkninger af et Lægemiddel og lidt efter lidt at faa en sand Lægemiddellære d. e. en Samling af de ægte, rene paalidelige Virkninger af de simple Lægemiddelfstoffer, hvert for sig, hvori for hvert enkelt staaer optegnet en anseelig Række særskilte Forandringer i Tilstanden og objektive Symptomer, i hvilke Sygdoms-Elementerne af flere naturlige Sygdomme ere tilstede, som engang ville være at helbrede ved samme. Fra en saadan Lægemiddellære maa derfor enhver Formodning, Paastand og Opdigtelse aldeles udelukkes.

Nu har man for at udfinde det homøopathiske Lægemiddel, omhyggelig at sammenligne de enkelte Symptomer af den Sygdom, som skal helbredes, med Symptomerne af de prøvede Lægemidler, og det Lægemiddel, som frembyder den største Lighed i alle sine Sygdomssymptomer, maa være det meest passende homøopathiske Lægemiddel i dette Sygdomstilfælde. Jo mere træffende det valgte Lægemiddels Symptomer passer til Sygdomsbilledet i alle dets Nuancer, jo mere lignende Sygdommens Ejendommeligheder med Hensyn til dens Begyndelse, Forværrelse, Forsvinden, dens Omstiftelser, de den ledsagende Sindsforandringer o. s. v. gjenfindes, desto sikrere, hurtigere og paalideligere følger Helbredelsen. Ved Valget af det specifikke Lægemiddel maa man imidlertid isærdeleshed have Sygdomstilfældets mest paafaldende, særegne og karakteristiske Tegn og Symptomer for Øje; de mere almindelige og mere ubestemte, saasom Appetitløshed, Hovedpine, Mæthed, urolig Søvn, Ildebefindende etc., fortjene i deres Almindelighed og Ubestemthed, kun ringe Opmærksomhed, da dette næsten forekommer ved enhver Sygdom og næsten ved ethvert Lægemiddel.

Det saaledes valgte homøopathiske Lægemiddel helbreder i de fleste Tilfælde Sygdommen hurtigt og bekvemt; især finder Helbredelsen hurtigt Sted ved heftige Tilfælde og ved Sygdomme, som ikke have været tilstede i længere Tid; langvarig Sygelighed udfordrer stedse forholdsvis længere Tid. Imidlertid lykkes det ikke altid at helbrede en Sygdom ved eet homøopathisk Lægemiddel; Sygdommen

fordrer ofte to eller flere Lægemidler efter hinanden; thi ganske affeet fra, at selv ved den meest omhyggelige Fremgangsmaaade det ikke i alle Tilfælde vil lykkes selv den meest erfarne Homøopath, strax den første Gang at udfinde det meest passende homøopathiske Lægemiddel, saa vil det allerede paa Grund af en anden Omstændighed ofte være nødvendigt at vælge et andet, tredie og flere Lægemidler. For det Første forekomme nemlig Sygdomme med altfor saa Symptomer, isærdeleshed ydre og stedlige Sygdomme; ved disse er det ofte overordentlig vanskeligt at finde det meest passende Lægemiddel, idet flere af de prøvede Lægemidler frembyde en fuldstændig Symptomlighed. For det Andet hænder det undertiden ved langvarige, complicerede Sygdomme, at efter det først anvendte passende Lægemiddel, vil et eller flere af de meget talrige Sygdomssymptomer forsvinde, men derimod andre blive tilbage eller ogsaa forandres, eller at nye komme frem. I begge Tilfælde maa man, naar man har givet Lægemidlet tilstrækkelig Tid til at udfolde sin Virkning, overbevise sig om, at det ikke formaaer at tilintetgjøre Sygdommen i alle dens Symptomer, hvorefter der paany foretages en Undersøgelse af samtlige endnu tilstedeværende Sygdomssymptomer (Sygeexamen) og efter samme følger Valget af et andet Lægemiddel, og saaledes fremdeles en tredie og fjerde Gang, dersom det skulde vise sig nødvendigt.

Det hidtil sagte omfatter Homøopathiens egentlige Væsen og banner saa at sige dens Grundpiller, som enhver, der hylder den homøopathiske Helbredelsesmaaade, ufravigelig maa fastholde. Foruden disse er der imidlertid endnu nogle Regler og Læresætninger, som, om end mindre vigtige, dog ere

nødvendige Konsekventer af disse Grundprinciper, og derfor idetmindste for en Del udgjøre nødvendige Betingelser for Homøopathiens Udvøelse.

Hertil hører fremfor Alt den Regel, at der altid kun kan anvendes et eneste homøopathisk Lægemiddel ad Gangen. Derfor er i Homøopathien enhver Sammenblanding af to eller maaste flere Medicinstoffer ubetinget forkastelig og altid at betragte som en fuldstændig Krænkelse af dens Væsen, og det fordi ifølge denne ethvert Medicinstof har sin ejendommelige, fra ethvert andet afvigende Virkning, og kun enkelte og ublandede Medicinstoffer hidtil ere prøvede paa Sunde og ere bekjendte i deres sande Virkninger. Thi Virkningerne af kunstig sammensatte og blandede Medicin-  
substantier ere aldeles ubekjendte og derfor aldeles ubrugbare som Helbredelsesmidler efter homøopathiske Principer. Ligesaa lidet kan den i den nyere Tid af enkelte Homøopather yndede Anvendelse af tvende Lægemidler stiftetviis billiges, da den som oftest gjør Indgreb i begge Midlers Virkninger og tillige ofte kun er et Skalkeskjul for en mangelfuld Lægemiddelfundstab og et upassende Middelvalg; ialtfald burde den kun finde Anvendelse i sjældnere og særdeles indviklede Sygdomstilfælde.\* Naturlig-  
ligvis gjøre herfra en Undtagelse saadanne kemiske Forbindelser af tvende eller flere enkelte Legemer, som ere dannede af Naturen og trods deres Sammensætning kun udgjøre een kemisk Forbindelse, saaledes f. Ex. alle enkelte og dobbelte Salte,

---

\* Hertil maa dog bemærkes, at mange acute Sygdomme, ja ogsaa chroniske ikke kunde helbredes uden to Lægemidler stiftetviis.  
Dr. S.

Sublimat, Svovllever etc.; thi endogsaa affeet fra deres chemiske Enhed, maa allerede derfor et saadant Stof i homøopathisk Betydning gjælde for et enkelt Lægemiddel, fordi der med samme er foretaget Prøver paa Sunde, og dets ejendommelige Virkninger ere udforskede og bekjendte. Ligeledes maa ogsaa Anvendelsen af Mineralkilder som Drikke eller som Bade, uagtet de fleste af samme indeholde mange Urstoffer, og derfor kunde betragtes som Medicinblandinger, være tilladt og fuldkommen berettigede i Homøopathien, forudsat nemlig, at de tilstrækkeligt ere prøvede paa Sunde og som Følge deraf Virkningen af disse naturlige Medicinblandinger som altid blive sig selv lige, kunne benyttes efter Lighedsprincippet. Det er derfor meget at paastaa, at de fleste af disse velgjørende Helbredelsesmidler allerede af homøopathiske Læger ere bleve underkastede en omhyggelig Prøve paa Sunde, og at der bestaaer faste ubedragelige Meddelelser og Erfaringer for deres Anvendelse som Lægemidler, medens de tidligere bleve anvendte efter de mest utilforladelige og vageste Anbefalinger og efter den letfærdigste Glendrian.

En anden højst vigtig Regel i Homøopathien er fremdeles den, at ethvert passende Lægemiddel maa anvendes i en forholdsmæssig meget lille Dosis. Denne Regel er det netop, som af alle Homøopathiens Læresætninger er blevet meest angrebet, og som fra første Færd af dens Modstandere er gjort til Gjenstand for Mistro og Trivl og til en stadig Skive for Spot og Bittigheder. Dog blev Hahnemann ene og alene ved rene Forsøg og paa en vis Maade af Nødvendighed lebet hen paa de smaa, efter almindelige

Begreber uberegnelige Indgiwter. Thi i Begyndelsen gav han sine efter homöopathiske Love valgte Lægemidler i temmelig massive Doser, som kom den sædvanlige Brug nær, men da han af disse iagttog altfor stærke Førstevirkninger, ja endogsaa midlertidige Forværrelser af Sygdomssymptomerne, hvilke rigtignok efter nogen Tids Forløb fulgtes af Bedring og Helbredelse, saa formindskede han altid Indgiwternes Størrelse mere og mere, indtil han endelig kom til den Paastand, at en Medicins-Indgiwt, den være nok saa lille, vilde dog kunne bedre, ja aldeles helbrede den samme homöopathisk tilsvarende Sygdom. Det blev saaledes nødvendigt for de homöopathiske Lægemidlers Bedkommende at opstille en heel ny Form med Hensyn til Anvendelse og en fra den hidtidige Brug himmelvidt forskjellig Indgiwtslære og Beregning, hvilken opnaaedes ved Fortynding med Vind, eller Rivning med Melkesukker. Ved denne Tilberedning af Lægemidlerne viste sig imidlertid snart det Særlyd og den Kjendsgjerning, at ved den hensigtsmæssige Fortynding eller Rivning indtil en vis Grad Lægemidlets Virksomhed paa ingen Maade blev svagere i samme Forhold, men kun holdt sig reent og frit for hine besværlige Førstevirkninger, ja at selv enkelte Stoffer ved den finere Fordeling indtil en vis Grad syntes at vinde i Kraft og Virksomhed i at helbrede. Denne paafaldende Opdagelse, som stod i den stærkeste Modfætning til den i Aarhundreder stedsfundne Ufsik og Misbrug med kolossale Medicinmasser, maatte naturligvis fremkalde den største Opsigt og de heftigste Modsigelser, saa meget mere, som den gjorde nye Forberedelser og Manipulationer til Fremstillingen af homöo-



pathiske Medicamenter fornøden, og tillige paa Grund af disses Simpelhed og overordentlige Billighed maatte gjøre Apothekernes lønnende Forretning stor Glæde. Her er ikke Stedet at omtale den Masse Stridigheder og de ved Hjælp af gamle Privilegier forsøgte Dispenseerforbud og andre Retsindskrænkninger, som opstode heraf, kun saameget fortjener at nævnes som Resultatet af alle disse Homøopathiens libensfabelige Modstanderes Bestræbelser, at der nu næsten overalt er etableret Apotheker efter Homøopathiens strenge Forskrifter, som samvittighedsfuldt controlleres, og hvori udelukkende tilberedes homøopathiske Medicamenter.

Hvad nu angaaer selve denne Lægemidlernes Kraftudvikling ved Fortynding og Rivning og dennes endelige Begrænsning ved forøget Fortynding, saa have, ligesom ogsaa med Forklaringen af dette Punkt, iblandt selve Homøopatherne gjort sig meget forskjellige Anstuelser gjældende; navnlig have Nogle drevet disse Fortyndinger til en uendelig Højde, og netop heri søgt den største Virksomhed, saavel som Homøopathiens sande Væsen. Imidlertid er det ikke underkastet nogen Tvivl, at en sliq overbreven Lidenhed af de homøopathiske Lægemidler intet har at skaffe med selve Homøopathien, men kun kan være en Følge af en vis Fortjærlighed, af en individuel Anstuelsemaade eller en Erfaringsfag hos enkelte Homøopathier. Kun saameget staaer uroffeligt fast, at et homøopathisk valgt Lægemiddel netop paa Grund af dets specifikke Forhold til det tilstedeværende Sygdomstilfælde kun behøver en meget lille Indgift, for at frembringe hurtig og fuldstændig Helbredelse; alle Indvendinger mod denne de smaae Indgivers Virksomhed ere forlængst mod-

beviste af Erfaringen saavel som ved Grunde, og Homöopatherne have forlængst i denne Henseende anført stadfæstede og af Ingen betvivlede Kjendsgjerninger som talende Analogier og Beviser. Det vidner derfor kun om den største Uvidenhed eller en forsætlig Forstokkelse hos Homöopathiens Modstandere, naar slige forlængst tilstrækkeligt imødegaaede Indvendinger og godtkjøbs Bittigheder uophørligt lige indtil den nyeste Tid drøvttygges med stort Velbehag; maaskee at med Tiden selv slige Mæver faae Bæmmelse for den Slags Rost! Eigesaa lidt som vi formaa at veie og begribe et homöopathisk Lægemiddels Kraft, ligesaa lidt kunne vi f. Ex. med Sandserne iagttage og maale Smitstoffer, saasom Pest, Typhus, Skarlagensfeber, Mæslinger, Koldfeber, og dog levnes os ikke den mindste Tvivl om deres overordentlige Indflydelse. I det magnetiske Jern kan hverken Physiken eller Chemien eftervise den ringeste Forskjel fra sædvanligt Jern, og dog kan man med den mindste Magnet gjøre talløse Jernstænger magnetiske, uden at den oprindelige Magnet taber noget af sin Kraft eller sin Vægt. Et lille Stykke Moskus, som i lang Tid har ligget i et stort Rum og har fyldt samme med den stærkeste Lugt, har, ialtsald ikke efter nogen eksisterende Vægtstaaal, Spor af Vægttab. Ja selv efter dets Bortfjernelse beholder en heel Række af Bærelser Moskuslugten i Maanedes. Ogsaa Chemien leverer tilstrækkelige Beviser for smaa Mængders Virksomhed; saaledes reagerer f. Ex. 1 Deel Jod endnu i 45000 Dele Vand tydelig paa Stivelse, og 1 Deel Røgesalt i 1,640,000 Dele Vand paa Helvedsteen etc. Overhovedet er det strengt taget for os ligesaa umuligt at forklare, hvorledes

en større, massiv Indgiot af et Lægemiddel frembringer bestemte Virkninger i Organismen, som en lille homøopathisk; vi vide ligesaa lidt, hvorfor og hvorledes 3 Gram Jalappa stedsfrembringer Kolik og Diarrhoe, som vi kunne forklare den helbredende Virkning af een Draabe i 3die Fortynding af den samme Medicin. Derimod kunne vi af tilsvarende Kjendsgjerninger med Sikkerhed slutte, at netop i den Omstændighed, at der maa finde en specifik Sammenhæng Sted mellem det homøopathiske Lægemiddel og den Sygdom, som skal helbredes, ligger Grunden til, at dette allerede i en overordentlig svag Indgiot ytrer sin fulde Helbredelsesvirkning, saaledes, at naar Ligheden mellem Medicins- og Sygdomssymptomerne mangler, ogsaa Virkningerne af de smaa, ja endogsaa af en meget stærkere Indgiot svækkes eller aldeles udeblive. Den homøopathiske Lighed er altsaa uundgaaelig nødvendig for at gjøre Virkningen af overordentlig smaa Indgioter mulig, eller med andre Ord, meget smaa Indgioter af et Lægemiddel kunne kun være virksomme, naar det er valgt homøopathisk rigtigt. Denne den homøopathiske Ligheds Indflydelse eller Specificitet viser sig ogsaa i analoge, almindelig bekjendte Kjendsgjerninger og giver tillige et væsentligt Bidrag til Forklaringen af de smaa Medicinindgioters Virksomhed. Naar f. Ex. En liber som Følge af en Maveforstyrrelse og føler Ildebefindende, Affsty for Mad, Tryk i Maven, saa er allerede Synet eller blot Lugten af en Kogt Kjødsuppe tilstrækkelig til paany at fremkalde Kvalme og Opkastning. Og dog vil den Samme, som allerede af Lugten af Kjødsuppen fik Sygdomssymptomer, naar han ikke liber af en fordærvet Mave, ikke alene

kanne nyde een, men flere Kopper Kjødsuppe uden nogensomhelst Besværlighed. Hvad kan nu være Årsagen til en saa heftig Virkning af en saa lille, neppe paaviselig Størrelse af en Substant, som i andre Tilfælde nydes i en tusinde Gange større Mængde og da ikke fremkalder noget Sygdomssymptom. Åbenbart kun den, at Kjødsuppen, direkte eller indirekte, indvirker paa det samme Organ — Mave eller dennes Nerver, som allerede ere sygeligt afficerede —, saaledes at der finder en særegen Sammenhæng, en Slags Lighed Steb mellem Kjødsuppens Indflydelse og Sygdomssymptomerne. Paa en aldeles lignende Maade fremkommer nu ogsaa Virkningen af et homöopathisk valgt Lægemiddel i en meget lille Indgiot, kun at Overensstemmelsen og det specifikke Slægtskab mellem Lægemidlet og Sygdommen er ulige større og renere, hvorfor ogsaa Virkningen af førstnævnte bliver ulige kraftigere og mere helbredende, selv om ogsaa den Indgiot af Medicin, som anvendes, er fortyndet og svagere. Men at virkelig et lidende Organ eller en lidende Organisme besidder en uendelig større Modtagelighed og Reactionsevne imod beslægtede, specifikke (d. e. homöopathisk-lignende) Medicinpirringer, end i dets uforstyrrede Sundhedstilstand, er en Kjendsgjerning, som ikke kan negtes af Homöopathiens værste Modstandere. Hundreder af de meest dagligdags Kjendsgjerninger tale altfor uimodsigeligt derfor: et betændt Øje, som i sund Tilstand kunde taale meget stærkt Lys, bliver selv ved det svageste Lysstjær blændet og irriteret til Taarer og en heftig Smerte; en af Hoste Lidende bliver utaalelig paa-virket af en ubetydelig Mængde Tobaksrøg, medens

man ellers i Timevis kunde sidde i den tykkeste Dunst uden at generes etc. etc.

Forsvrigt er, som allerede sagt, en til det Uendelige drevet Medicinformindstelse ingenlunde fornøden til den homøopathiske Helbredelse i alle eller selv i mange Tilfælde, og det er ikke heri, at Homøopathiens Væsen og Værd maa søges; thi det er en upaatvivlelig Kjendsgjerning, at et Lægemiddel, naar det kun isvrigt er det efter den homøopathiske Lighed rigtigt valgte, udviker sin Helbredelsesvirkning hurtigt og sikkert, selv om det gives i en forholdsvis stærk og massiv Dosis. Mange Tilfælde af ganske forbausende Helbredelser, som for størstedelen henhøre til de saakaldte ubevidst homøopathiske og undertiden lykkes for Homøopathiens største Modstandere, levere herfor et uomstødeligt Bevis. Overhovedet er i Homøopathien en Fastsættelse af en Normalindgiot for alle Helbredelsesmidler og alle Sygdomme ligesaa utilstedelig og urimelig som ved enhver anden Lægemethode. Den større eller mindre Modtagelighed; Kjønnets, Alderen, Constitutionen, den Syges Levemaade, saavel som Sygdommens Character og Sæde, Klimaet og endelig fremfor Alt Lægemidlernes forstjellige Kraft, alt dette er med Hensyn til Bestemmelsen af Lægemidlets Størrelse altfor vigtige Omstændigheder til ikke ved hvert enkelt Tilfælde at tages i Betragtning og gjøre Udslaget. Kun saameget maa altid fastholdes som en uigjenskaldbelig Grundsætning, at et homøopathisk Lægemiddel aldrig maa anvendes i en saa stærk Indgiot, at besværende eller selv farlige Førstevirkninger kunne opstaa deraf, eller at et uheldigt Middelvalg kunde bibringe Syg-

dommen nye Symptomer eller ugunstige Omstændigheder.

Nær beslægtet med Bestemmelsen om Indgiøtens Størrelse er Spørgsmaalet om Gjentagelsen af de homøopathiske Lægemidler. I Almindelighed maa herved den Regel være gjældende, at man maa give et homøopathisk Lægemiddel tilstrækkelig Tid til at virke, og ikke give nogen anden Indgiøt af det samme Middel eller af et andet nærmest passende, før det førstes Virkning er aldeles forbi. Ved Forsøg paa Sunde har det viist sig, at enkelte Lægemidlers Virkning er særdeles langsom og vedholdende, saaledes at en enkelt Indgiøt undertiden behøver flere Dage, ja Uger, for at kunne udvilde alle sine Kræfter og virke fuldstændig. Imidlertid er det kun i chroniske Sygdomme tilstedeligt, i et saa langt Tidsrum at forlade sig paa en enkelt Medicinsindgiøts Virkningsvarighed, og da kun i saadanne Tilfælde, hvor en fremskridende Bedring med Sikkerhed iagttages. Ved alle andre Sygdomme, isærdeleshed saadanne, som forløbe meget acut og ere livsfarlige, er det hensigtsmæssigt at anvende det passende Lægemiddel i flere, langsomme eller hurtigere paa hinanden følgende Indgiøter, eftersom Sygdommen viser sig heftigere og farligere, da Erfaringen ubestrideligt har lært, at ved en sliG Gjentagelse af Indgiøterne Lægemidlets Virkning ingenlunde er blevet forstyrret eller tilintgjort, men tvertimod forstærket og befordret. Isærdeleshed bliver en saadan Gjentagelse af Indgiøten paaviislig og nødvendig, naar den første Indgiøt har mildnet Sygdomssymptomernes Heflighed uden dog at hæve eller forandre samme, eller naar Hef-

tighebends Formindstfelfe efter nogen Tids Forløb ikke strider frem til Bedring. Foruden af en Sygdoms hurtige og livsfarlige Forløb vil Bestemmelsen for en hurtigere eller langsommere Gjentagelse af Indgivten være afhængig, deels af Sygdomstilstædets og de især angrebne Organers Gjenbyggelighed, deels af det angrebne Individ's større eller mindre Sensibilitet og Energi og endelig ogsaa af det valgte Lægemedels mere eller mindre flygtige eller vedvarende Virksomhed, saaledes at ogsaa heri den homøopathiske Læge ikke kan undvære, hverken skarp Jagttagelse af alle de Momenter, som maa tages i Betragtning, eller et erfarent Blif for at kunne vælge den rette Middelvei.

Ligeledes tør Anvendelsen af et nyt Lægemedel ikke finde Sted for hurtigt eller for overilet, og det er i Regelen ifkun tilladeligt i det Tilfælde, at en eller flere Indgiver af det først valgte Middel ikke frembringer nogensomhelst eller kun ubetydelig Bedring, eller der efter samme fremtræder en væsenlig Forandring i Sygdomssymptomerne. I chroniske Sygdomme vil ogsaa i dette Tilfælde en længere Afventning af Virkningerne, ja i enkelte Tilfælde en udtrykkelig længere Pause være hensigtsmæssig, medens i heftige Sygdomme Manglen paa Virkning, eller den førstvalgte Medicins Utilstrækkelighed ofte hurtigt og uophørligt maa erstattes ved et mere passende Valg.

En yderligere Betingelse i den homøopathiske Helbredelseslære er endelig endnu en omhyggelig Regulering af Diæten og Levemaaden. Det laa nødvendigtvis i Virkningen af de homøopathiske Lægemedler saavel som i de forholdsmæssig meget smaa Indgiver, at Hahnemann maatte paastaa

enhver forstyrrende Indvirkning omhyggelig fjernet, som kunde paavirke Organismen indirecte, og som kunde virke skadelig paa det homöopathiske Lægemiddel i dets Virkningsperiode, — og derfor foreskrev meget strenge Betingelser for Sygebeholden. Det Hensigtsmæssige og Lægende i samme blev ogsaa almindelig indseet og anerkjendt, endogsaa af Homöopathiens heftigste Modstandere, ja ofte blev denne fornuftige Diæt paa den latterligste Maade alene tilskrevet den eneste Aarsag til de homöopathiske Helbredelser, uagtet de homöopathiske Lægemidler stode deres Prøve ligesaa fortrinligt for Bættebørn som for Dyr. Af andre Modstandere blev ogsaa den homöopathiske Diæt fremstillet og udforsket som en Sultkur, uagtet en sliq Overdrivelse aldrig har været Meningen i Homöopathernes Tanke, og det er dem ligesaa magtpaaliggende, som det er enhver anden medicinsk Skole, i passende Tilfælde at styrke Organismen med nærende Kost. Overhovedet vise sig alle disse Indvendinger aldeles ugrundede af den Omstændighed, at mange Homöopathier, belærte ved Erfaringen, ere komne betydeligt bort fra den oprindelige strænge Diæt og have indskrænket samme til et strængt Forbud imod enkelte aabenbart som Medicin virkende Stoffer og Substantier, uden derfor at have opnaaet mindre heldige Helbredelsesresultater. De generelle Grundsætninger og Forskrifter for denne modererede homöopathiske Diæt kunne her forbigaaes, da de senere særskilt ville blive omtalte.

---

Denne korte Oversigt og Fremstilling af Homöopathiens Grundsætninger og Lærdomme vil



være fuldkommen tilstrækkelig til det fastsatte Die-  
meds Opnaaelse, og gjøre den Uhilbede og For-  
domsfri nøie bekendt med samme, men tillige  
flaaende overbevise om dens Simpelhed, Sandhed  
og Fortrinlighed. Imidlertid skal og bør Ingen  
alene af et saadant theoretisk Bekjendtskab med Ho-  
møopathien og ved den rigtignok bestikkende Sam-  
menligning mellem dens simple, naturlige Principer  
og Hverdagsmedicinens principløse Hypothesefram-  
danne sig sin Dom og paa en Maade blive forledet  
til at skjænke den sin Tillid alene paa Grund af  
dens Aaastande og Tanter. Homøopathien taaler,  
ja forlanger endogsaa en streng Prøvelse ved Forsøg  
og Kjendsgjerninger, ved den ædruelige Erfaring,  
og kun derved kan den, som reen Erfarings-Videnstabs,  
blive rigtig forstaaet og bedømt, og den vil kun  
have sine Resultater og ikke de theoretiske Discus-  
sioner at takke for sin Gylldighed og sit Værd. Men  
den fordrer af Enhver, som agter at prøve den, en  
samvittighedsfuld og ærlig Prøve, og har dertil en  
ufrænkelig, hellig Ret. Derfor tilraaber ogsaa  
Hahnemann sine Modstandere istedetfor enhver  
yderligere Polemik, disse simple Ord: „Gjør  
det efter, men gjør det nøjagtigt efter,  
og I ville snart være overbeviste.“ Og  
sandelig, hans Ord have ikke svigtet, thi i den for-  
holdsvis korte Tid af halvtredstindstyve Aar har  
Homøopathien fundet en overraskende og storartet  
Anerkjendelse og Udbredelse. Dens Tilhængere og  
Udøvere ere ikke alene talrig udbredte i Tydskland  
og hele Europa, men ogsaa i Amerika. I dette prak-  
tiske Land har den glimrende Fremgang, og dens Udvi-  
ling bryder sig med hver Dag større og større Bane;  
overalt har der dannet sig Foreninger, Polikliniker,

Hospitaler, iffe ved Regjeringernes og Autoriteternes Gunst, men ved frivillige Offre af de Overbeniste og de taknemmelige Helbredede, — talrige Tidsskrifter og en dygtig Literatur, selv enkelte Lærestole ved Universiteterne repræsentere dens Interesser og bidrage mægtig til at udbrede dens fri Udvikling til alle Sider. Ja endnu mere betydenbe er dens indirekte Indflydelse paa Medicinen i dens Heelhed: den almægtige Allopathi, dens engang saa forbittrede Modstander, er efterhaanden almindelig blevet erkjendt i dens hele Jammerlighed, og selv dens Tilhængere ere ved Homöopathiens haandgribelige Resultater blevene bevægede til større Ensigformighed og Indskrænkninger i deres modbydelige Medicinblandinger; en ny, bedre Aand er overalt vaagnet i Medicinen, som, ubelukkende grundet paa det exakte Forsøgs Fundament, har kastet tidligere Aarhundreders lærde Brøvl og vrange Viisdom overbord, og fortiden foretrækker, heller slet intet Lægemiddel at give end at anvende de gamle efter principløs Vilkaarlighed og letfærdig Slendrian. Denne almindelige Anerkjendelse af tidligere Feiltagelser og denne dybe Trang efter Sandhed er ubestrideligt Homöopathiens Værk og tillige en sikker Borgen for dens videre Fremskridt og dens endelige og fuldkomne Seir.

## § 2.

## De homøopathiske Lægemidlers Tilberedelse, Opbevaring og Ind- giver.

Efter Homøopathiens Grundsætninger maatte Hahnemann fremfor Alt anvende Lægemidlerne i en Form, som ved Siden af den største Simpelhed og Regelmæssighed dog maatte bevare alle deres medicinske Kræfter usvækkede og uforandrede og tillige bevare samme i lang Tid. At dertil udfordres en anden Fremgangsmaade end den ved Allopathien almindelige, som betjente sig af meget forskjelligartede, sammensatte og usikre Tilberedelsesmaader og Præparater, var øjensynlig. Efter flere Forsøg og Erfaringer opdagede han, at Formen som Viin-aandsopløsningen var den hensigtsmæssigste og i enhver Henseende opfyldte de nødvendige Forbringer; kun for de Lægemiddelfstoffer, som ikke lade sig opløse i Vand eller Spiritus, og hvis virkomme Bestanddele ikke lade sig udtrække af hine tvende Stoffer, som f. Ex. næsten for alle Metaller, maatte indføres Pulveriseringen og Rivningen med Melkesukker. Uagtet der nu ved Tilstedeværelsen af mange gode og tilforladelige homøopathiske Apotheker er givet Enhver en let Lejlighed til at forskaffe sig færdige homøopathiske Lægemidler i Tincturer, Fortyndninger og Rivninger, og uagtet det ligefrem ikke er at tilraade en Lægmænd, selv at tilberede sig disse Lægemidler, da den Sagkundskab, som udfordres, neppe kan være tilstede, og de møjsommelige Manipulationer udtrække megen Tid, saa skal dog her i al Korthed fremstilles de vigtigste Grundsætninger og

Regler for den homøopathiske Pharmacopæ (Tilberedelse af Lægemidlerne).

Af de friske Planter, som maa samles paa den efter deres Blomstringstid bestemte Aarstid, blive Blomsterne, Frøet, Blade, Bark, Stængler eller Rødder, alt efter den vedkommende Fortkrift, rensede ved Afstykning i Vand, skaarne smaat og udpressede; den udpressede Saft bliver, for at den ikke skal gaa i Gjæring eller Forraadnelse, blandet med et ligesaa stort Quantum Viinaand, efter 24 eller 48 Timers Forløb helbet fra det nedfaldne Bundfald og opbevares som Tinctur i et velproppet Glas. Ved udenlandske Planter, som kun ere at faae i tørret Tilstand, og ved meget tørre Frøsorter, Rødder og Bark, tilsætter man, efter at de ere pulveriserede til den størst mulige Fjnhed, den dobbelte eller firedobbelte Vægtmængde Viinaand, lader denne Blanding henstaa flere Dage, og fragnyder da, uden at presse, den klare ovenstaaende Vædske eller bortfjerner ved Filtrering de faste, uopløste Bestanddele fra samme; Vædsken opbevares da lige som ovennævnte som Tinctur. For nu at tilberede Fortyndingerne af denne Urtinctur, blander man deraf 10\*) Draaber med 90 Draaber Viinaand, ryster det tilbørlig og faaer saaledes den 1ste Fortynding; 10 Draaber af denne 1ste Fortynding, sammenrystet med 90 Draaber Viinaand, giver den 2den Fortynding, 10 Draaber af 2den Fortynding med 90 Draaber Viinaand den 3die Fortynding, og saaledes fremdeles.

\*) Dette Forhold (1 til 9 eller 10 til 90) danner den saakaldte Decimalscala, medens den oprindelige, af Hahnemann anvendte Centesimalscala har Forholdet 1 til 99.

Derimod maa de uopløselige Substantier, altsaa Metallerne, flere Salte, Kisel- og Kalkjord, Kul, Encopodium, først pulveriseres saa fiint som muligt og derpaa meget længe og omhyggeligt rives med Mælkesukker i det samme Forhold, saaledes at 1 Bægtdeel\*) af den raa Substant revet med 9 Bægtdele Mælkesukker giver den første Rivning, 1 Bægtdel af den 1ste Rivning og 9 Bægtdele Mælkesukker giver den 2den Rivning, og 1 Bægtdel af den 2den Rivning og 9 Bægtdele Mælkesukker den 3die Rivning. Udover den 3die og 4de Rivning gaaer man ikke, men naar en svagere Indgiwt skulde være nødvendig, saa opløser man  $\frac{6}{10}$  Gram af den sidste Rivning i 90 Draaber Vand (ikke Vinaand, da denne ikke opløser Mælkesukkeret), hvorved man faaer den 4de Fortynding, som paa Grund af dens Vandindhold ikke kan opbevares længe, eller ialtfald da maa tilføjes Vinaand; blander man da atter 10 Draaber med 90 Draaber Vinaand faaes den 5te Fortynding, og dette kan da fortsættes ligesom ved Tincturerne indtil den 12te, 18de eller 30te Fortynding. Enhver Fortynding bliver da godt tilproppet i en Flaske og betegnet med Lægemiblets Navn og Fortyndingens Nummer.

Disse saaledes tilberedte homøopathiske Lægemidler maa opbevares omhyggeligt og samvittighedsfuldt, hvis de ikke undertiden skulle tabe betydeligt i deres Virksomhed. I dette Øjemed maa dertil fremfor alt bruges rene, nye Glas, som tilføres med nøjagtigt passende, ikke ormstufne Prop-

---

\*) Altsaa omtrent  $\frac{6}{10}$  Gram af den raa Substans til 6 Gram Mælkesukker.

per. Disse nøie betegnede Glas maa opstilles, ikke lægges, i Kasser eller Skabe, som ere forsynede med Rum, for at Propperne ikke altid komme i Berøring med Vædsken. Kasserne eller Skabet maa opbevares paa et tørt Sted, som ikke udsættes for Solen og Raskelovnsvarmen, og hvor det ikke udsættes for Uddunstninger og Lugt, for Røg, Rjøffendunst, Kaffe- og Tobaktskvalm. Ligeledes maa de stærkt lugtende Lægemidler, saasom Kamfer, Kreosot og Moskus, opbevares for sig selv, for at ikke beres selv i de lavere Fortyndinger gjennemtrængende Uddunstninger og Lugt skal virke ufordeelagtigt paa de andre Medicamenter. Endelig er der endnu at iagttage, at ethvert Medicinglas strax efter Brugen atter tilproppes meget omhyggeligt, fordi de med Vinaand tilberedte Tincturer og Fortyndinger ere meget flygtige, og i kort Tid ville fuldstændig fordampe, dersom Proppen ikke slutter aldeles lufttæt.

Hvad nu angaaer Maaden og Formen for Indgiøten af de homøopathiske Lægemidler, da er samme overordentlig simpel. Indvendig er en enkelt Indgiøt eller 2 Draaber af den paagjældende Fortynding, og ved Rivninger  $\frac{6}{100}$  Gram, d. e. omtrent en Verts Størrelse eller hvad der kan ligge paa en Penneskiøpspids. Begge, Draaben, saavel som de 6 Centigram, giver man bedst i en Theestefuld Vand. Dersom i enkelte Tilfælde en Draabe er for stor Dosis, saa kommer man den i et Glas med 6—8 Theestefulde Vand, og giver deraf en Theestefuld, altsaa  $\frac{1}{6}$  eller  $\frac{1}{8}$  Draabe. Til endnu mindre Doser, og isærbeleshed passende til Forsendelser er Lægemidlernes Indgiøt i Strøfugler. Af saadanne rene Sukkerstrøfugler fylder man nem-

lig nogle hundrede i et Glas, helder 2—3 Draaber af den paagjældende Fortynding derpaa, og ryster samme saalænge, at alle Strøfuglerne ere ligelig befugtede.\* Af disse Strøfugler giver man da 3—4 Stkr. i en Dosis, enten tørre eller i en Thestefuld Vand. Denne Indgivtsmaaade egner sig, foruden med Hensyn til meget smaa Doser, tillige særdeles godt for smaa Børn, hvem Draaber eller Pulver ofte er vanskeligt at bibringe. I enkelte Tilfælde, især ved meget sensible Personer, eller ved Besvimelser og Krampetilstælde, hvor det ikke kan lykkes at aabne Munden eller faa Patienten til at synke, anvendes Lægemidlet ved at lade lugte dertil.\*\* --

Med Hensyn til Gjentakelse af Lægemidlet er der i al Almindelighed talt derom tidligere; især deleshed skal det kun her angives, at i langvarige Sygdomme maa Indgivten af det valgte Lægemiddel kun finde Sted hver 24de eller 48de Time undertiden endnu sjeldnere, — i acute Sygdomme derimod, altsaa navnlig i Betændelsestilstælde og Febre, saavel som i livsfarlige Tilfælde meget oftere, omtrent hver 4de—3die Time, ja i særdeles hurtigt forløbende og farlige Sygdomme, som f. Ex. Cholera og Strubehoste, hver  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  Time eller endogsaa hvert 10de eller 5te Minut. I saadanne Tilfælde er det tilraadeligt, strax at blande 10 a 15 Thestefulde Vand med ligesaa mange Draaber af den paagjældende Medicin i et Glas, saaledes

---

\*) Man kan bedst helde flere Draaber paa Strøfuglerne end her angives, da Overfluddet efter nogen Tid filtreres fra.

\*\*) Eller i Ladement.

Dr. S.

Dr. S.

at man altsaa i hver Theffelfuld har en Draabe Medicin.

Ligesaa lidt lader der sig give nogen almindelig Forfkrift med Hensyn til den højere eller lavere Fortynding, som i ethvert Tilfælde bliver at vælge. Som allerede forklaret, er dette afhængigt af Sygdommens Charakter og Patientens Alder, Modtagelighed og Constitution. I Almindelighed gjælder som Regel, at for Børn og sensible Personer af Kvindeskjønnet egne sig højere, for voksne og kraftige Personer lavere Fortyndinger; ligeledes udfordre acute og farlige Sygdomme stærkere Indgiøt, medens ved chroniske Lidelser meest de svagere, altsaa højere Fortyndinger finde Anvendelse. For at have et omtrentligt Holdpunkt, følge de i denne Bog overhovedet anbefalede og omtalte Lægemidler med den i de fleste Tilfælde passende Fortynding; dog maa disse Indgiøtsbestemmelser ikke være ubelukkende Rettesnor, men i mange Tilfælde kunne ogsaa andre Fortyndinger være hensigtsmæssige. Her skal endnu engang den Grundsætning indskræpes, at det rigtige Middelvalg stedse bliver Hovedsagen, idet det rigtigt valgte Lægemiddel ubetinget vil vise sin Virksomhed, selv i de forskellige Indgiøters Styrke, kun maa det altid erindres, at en Indgiøt af en Medicin aldrig maa være saa massiv, at der indtræder heftige Første- eller Bivirkninger, og aldrig saa lille og svag, at slet ingen Virkning bliver mulig eller sandsynlig.

1) Acidum carbolicum, (Carbolsyre) 1. Fortynding.

2) Acidum hydrocyanicum, (Blaasyre) 6. Fortynding.



- 3) Acidum muriaticum, (Saltsyre) 6. Fortynding.
- 4) Acidum nitricum, (Salpetersyre) 6. Fortynding.
- 5) Acidum phosphoricum, (Phosphorsyre) 3. Fortynding.
- 6) Acidum sulphuricum, (Svovlsyre) 2. Fortynding.
- 7) Aconitum, (Stormhat) 3. Fortynding.
- 8) Apis, (Bigest) 6. Fortynding.
- 9) Antimonium crudum, (Svovlantimon) 3. Rivning.
- 10) Antimonium tartaricum (Brækvinsten, Tartarus emeticus) 3. Rivning.
- 11) Argentum nitr. (Sølvsalpeter) 3. Rivning.
- 12) Arnica, reen Tinctur til ubvoortes Brug, og 3. Fortynding indvoortes.
- 13) Arsenicum, 6. Fortynding.
- 14) Aurum muriaticum, (Chlorgulb) 3. Rivning.
- 15) Baryta muriatica, (Chlor-Lungspat) 3. Rivning.
- 16) Belladonna, (Galnebær) 3. og 9. Fortynding.
- 17) Bismuthum. (Bismuth) 1. Rivning.
- 18) Borax, 6. Fortynding.
- 19) Bromium, 3. Fortynding.
- 20) Bryonia, (Galdebær) 3. Fortynding.
- 21) Cactus grandiflorus, 3. Fortynding.
- 22) Calcareo acetica (eddisesur Kalk) 2. Rivning.
- 23) Calcareo carbonica, (fulsur Kalk) 3. Rivning og 30 Fortynding.
- 24) Camphora, som reen Spiritus.
- 25) Cannabis, (Hamp) 3. Fortynding.
- 26) Cantharis, (spansk Flue) 6. Fortynding.

- 27) Capsicum, (spanff Peber) 6. Fortynding.
- 28) Carbo anim. (Dyreful) 3. Rivning.
- 29) Carbo vegetabilis, (Træful) 3. Rivning.
- 30) Causticum, (Utsæst af brændt Kalk) 3. Fortynding.
- 31) Chamomilla, 3. Fortynding.
- 32) Chelidonium, (Svaleurt) 3. Fortynding.
- 33) China, 3. Fortynding.
- 34) Chininum arsenicosum, 2. Rivning.
- 35) Cicutæ virosa, (Bandgifttyde) 3. Fortynding.
- 36) Cina, 1. Fortynding.
- 37) Clematis, 6. Fortynding.
- 38) Cocculus, 6. Fortynding.
- 39) Coffea, 3. Fortynding.
- 40) Colchicum, (Lilbløse) 6. Fortynding.
- 41) Colocynthis, 6. Fortynding.
- 42) Conium, (Skarntyde) 6. Fortynding.
- 43) Crocus, (Safran) 6. Fortynding.
- 44) Cuprum aceticum, (eddisesurt Kobber) 3. Rivning.
- 45) Digitalis, (Fingerbøl) 3. Fortynding.
- 46) Drosera, (Solbug) 6. Fortynding.
- 47) Dulcamara, (bittersød Natfkygge) 6. Fortynding.
- 48) Euphrasia, (Djentrøst) 3. Fortynding.
- 49) Euphorbium, (Bortemælf) 6. Fortynding.
- 50) Ferrum muriaticum, (Chlorjern) 1. Fortynding.
- 51) Filix mas, (Mangelsø) 1. Fortynding.
- 52) Gelseminum, 3. Fortynding.
- 53) Glonoin, 6. Fortynding.
- 54) Graphites, (Blyant) 3. Rivning.
- 55) Helleborus, (fort Ryserod) 6. Fortynding.

- 56) Hepar sulphuris. (Svovllever) 2. Rivning.
- 57) Hyoscyamus, (Bulmeurt) 2. Fortynding.
- 58) Jalappa, 3. Fortynding.
- 59) Ignatia, (Ignazbønner) 6. Fortynding.
- 60) Jod, 3. Fortynding.
- 61) Ipecacuanha, (Bræfrob) 3. Fortynding.
- 62) Kali bichromicum, 3. Fortynding.
- 63) Kali hydrojod, 1. Rivning.
- 64) Kali carbonicum, (fulsur Kali) 6. Fortynding.
- 65) Kreosot, 6. Fortynding.
- 66) Lachesis, 6. Fortynding.
- 67) Laurocerasus, (Laurbærkirsebær) 3. Fortynding.
- 68) Lycopodium, (Ulveseb) 3. Rivning.
- 69) Manganum acet. (eddisesur Brunsten) 3. Rivning.
- 70) Magnesia carbonica, (fulsur Bitterjord) 3. Rivning.
- 71) Mercurius solubilis Hahnemanni, 3. Rivning.
- 72) Mercurius sublimatus, 3. Rivning.
- 73) Mezereum, (Pebertræ) 6. Fortynding.
- 74) Moschus, 2. Fortynding.
- 75) Natrum muriaticum, (Kogsalt) 9. Fortynding.
- 76) Nitrum, (Salpeter) 3. Rivning.
- 77) Nux moschata, (Russtatnøb) 6. Fortynding.
- 78) Nux vomica, (Bræfnøb) 3. Fortynding.
- 79) Opium, 3. Fortynding.
- 80) Petroleum, (Steenolie) 6. Fortynding.
- 81) Petroselinum, (Petersillie) 3. Fortynding.
- 82) Phosphorus, 6. Fortynding.
- 83) Platina, 3. Rivning.
- 84) Plumbum aceticum, (eddisesurt Bly) 3. Rivning.
- 85) Pulsatilla, 3. Fortynding.

- 86) Ratanhia, 1. Fortynding.
- 87) Rheum, (Rhabarber) 2. Fortynding.
- 88) Rhododendron, (fiberist Senerose) 3. Fortynding.
- 89) Rhus toxicodendron, (Gift Sumak) 3. Fortynding.
- 90) Ruta (Rude) 3. Fortynding.
- 91) Sabina (Sevenbom) 6. Fortynding.
- 92) Sambucus nigra, (Hylb) 3. Fortynding.
- 93) Secale cornutum, (Meelbrøje) 3. Fortynding.
- 94) Sepia, 6. Fortynding.
- 95) Silicea, (Kiseljord) 3. Rivning.
- 96) Spigelia, 6. Fortynding.
- 97) Spongia, (Svamp) 1. Fortynding.
- 98) Stannum, (Tin) 3. Rivning.
- 99) Staphysagria, (Stephanskorn, Ribberspore) 6. Fortynding.
- 100) Stramonium, (Pigæble) 6. Fortynding.
- 101) Sulphur, (Svovl) Tinctur og 3. Rivning.
- 102) Tabacum, 6. Fortynding.
- 103) Thuja, (Livstræ) 3. Fortynding.
- 104) Valeriana, (Valdrian) 6. Fortynding.
- 105) Veratrum album. (hvid Ryserod) 3. Fortynding.
- 106) Viola tricolor, (Stedmoderblomst) 6. Fortynding.
- 107) Zincum metallicum, (Zink) 3. Rivning.

### § 3.

## Den homøopathiske Diæt.

Nødvendigheden af en særegen Diæt ved Brugen af homøopathiske Lægemidler, som først blev opstillet

af Hahnemann med stor Omhu og Sagkundskab, og siden i mange Punkter er bekræftet ved mangeaarige Erfaringer, ligger klart og tydeligt i det Princip, at ved den særdeles og ejendommelige Virkning, som ethvert homøopathisk Lægemiddel frembringer, og ved disses Indgiot i saa smaa Dele, maa enhver medicinist, og enhver anden Potens, som paa nogensomhelst Maade indvirker afficerende og forstyrrende paa Lægemet, paa det omhyggeligste undgaaes. Hahnemanns Forrifter kunde derfor ikke alene indskrænke sig til, strængt at forbyde Brugen af ethvertsomhelst andet saakaldet Lægemiddel i den Tid, da et homøopathisk Lægemiddel anvendtes, men de maatte tillige udstrækkes til et temmelig stort Antal af Substantser, som hidtil ikke henregnedes til de egentlige Lægemidler, men til Næringsmidler og Nydelsler, idet en omhyggelig Prøve snart udviiste, at de indeholdt virkelige mediciniske Kræfter. Deraf kom det da, at Hahnemann og hans Disciple maatte forbyde mange Ting, som i det daglige Liv betragtedes som temmeligt ligegyldigt og ustyldigt, og at de for Røsthebens Skyld lode trykke særlige Fortegnelser over tilladte og utilladte Nydelsler (de saakaldte Diætesbler). Mangfoldige Erfaringer have imidlertid viist, at ved visse Sygdomme, navnlig de Chroniske, og ved visse Lægemidler, navnlig de mineraliske, forstyrres ikke Virkningen ved en mindre streng Diæt, om den end ogsaa forhales; for meget forvænte og sensible Individer vil det derfor være rigtigt at tillade enkelte Undtagelser, isærdeleshed med Hensyn til Kaffe og Vin. Med Hensyn til Kaffe skal endnu bemærkes, at man betydelig kan formindste, ja i enkelte Tilfælde aldeles ufsabelig-

gjøre dens bedøvende Virkninger, naar man, efterat Paagjørelsen har fundet Sted, giver den et lille Opfod.

I Almindelighed kan man i Henseende til Reguleringen af den homøopathiske Diæt holde fast ved, at foruden alle Lægemidler maa kryddrede, sure, spiritusøse og meget fede Substantier undgaaes. I de fleste Tilfælde vil denne Grundregel være tilstrækkelig, men for dem, som fordrer en speciel Behandling, følger her et Uddrag af ovennævnte Diætforskrifter.

### Forbudne Nødde.

Ris af Svin, Vinter, Gæs, saltet Ris, Pølse, Al, Lax, marinerede Silb, Hummer og Krebs, haardkogte Æg, Salat, Asparges, Sennep, Peberrod, Petersillie, Løg, Selleri, Rødbitter, Karfe, Kommen, Merian, Salvie, Dill, Fennikel, Enebær, Champignons, Hyben, Pebermynte, Pastinakrod, Kalmusrod, Gichorie, kryddrede Supper, saaledes ogsaa gammel Ost, Kaneel, Safran, Ingefær, Peber, Mustatnød, Vanille, Laurbærblade, Citron, bitter Mandler, Kelliker og alle andre Krydderier, kryddret Chokolade, Vin, Rom, Cognak, Arrak, Brændevin, Lixører, Biskop, Cardinal, Punsch, alle Slags Mineralvande (med Undtagelse af maafsee Seltersvand og kulsyreholdige Vande), Eddike, Kaffe, alle Sorter The (maafsee med Undtagelse af ikke for stærk kinesisk The), Limonade og Øl med bedøvende Tilføjninger. Ligeledes maa undgaaes: Landpulvere og Landvand med medicinsk og kryddrede Tilføjninger, Parfumerier og Pomader, Røgelse, Urter og vellugtende Snuustobakker.

Alle ikke her anførte Rjødsorter, Gemyse, Frugter og Drifke ere tilladte undtagen i de enkelte Tilfælde, hvori en særegen Sygdomstilstand ikke tilsteder visse Nydelser, som f. Ex. af alle Frugtarter ved Diarrhoe og lignende Sygdomstilfælde. Ligeledes er frist, reent Kildevand altid tilladt som Drik saavel i Chroniske som i andre Sygdomme, og kunde i det højeste synes forbudt i Tilfælde af en særdeles Antipathi eller af Mavens og Tarmkanalens overordentlige Svækkelse. Som den hensigtsmæssigste Erstatning for Kaffe have viist sig Mælk, Cacao eller brændt Korn, saasom Byg, alt efter de forstjellige Tilbøjeligheder.

Ogsaa med Hensyn til den almindelige Leve-  
maade maa der tages visse Hensyn og Forstrifter, som rigtignok ikke ubelukkende staa i Forbindelse med Brugen af homöopathiske Lægemidler, men som overhovedet stedse maa være gjældende i Tilfælde af Sygdom og ved alle Helbredelsesmethoder. Saaledes maa naturligvis uren Luft, stærk Stuevarme, overdreven Natte- og Middagssovn, Nattesvir, megen Stillesiddende, overdreven Landsanstrengelse, Rjøn-  
udsvevelser etc., saavidt muligt undgaaes ved enhver Sygdom. Ligeledes maa der altid, hvor Sygdomstilstanden tillader det, altsaa især i Chroniske Sygdomme, sørges for jævn Bevægelse i frist Luft, medens det i alle feberagtige Sygdomstilfælde som oftest vil være nødvendigt at holde Stuen eller Sengen. Afvigelser fra disse almindelige Forstrifter kunne selvfølgelig ofte forekomme i Forhold til Sygdommes Optræden og den Syges Konstitution, ligesom der med Hensyn til en Feberpatients Ønsker stedse maa tages Bestemmelse i ethvert forekommende Tilfælde.

## Anden Deel.

### De enkelte Sygdommes Behandling.

#### § 1.

#### Hovedets Sygdomme.

##### 1. Hovedpine.

Denne Lidelse er aabenbart en af de hyppigste og meest udbredte Besværligheder, allerede af den Grund, at næsten alle acute og endogsaa mange kroniske Sygdomme i større eller mindre Grad ere ledsagebe af samme. Imidlertid kan her naturligviis kun være Tale om den Hovedpine, som optræder som selvstændig Sygdom eller ialtfald som Hovedsymptom for et forøvrigt mindre fremtrædende Sygdomsanlæg, idet Behandlingen af den rent symptomatiske Hovedpine i Følge med andre Sygdomme ganske maa rette sig efter vedkommende Sygdoms Karakter og Egenbommelighed.

Denne Lidelses Helbredelse vilde forøvrigt ved Anvendelse af homøopathiske Lægemidler fremføre endnu hurtigere og mere glimrende Resultater, dersom ikke især for Lægmand, Valget af det rette



Middel blev besværliggjort ved de mangfoldige og skiftende Symptomer, saavel som ved de forskjelligartede Aarsager, som have kunnet foranledige den. Derfor er det hensigtsmæssigst, her isærdeleshed at tage Hensyn til sidstnævnte, og ibetmindste med Hensyn til de almindeligste af disse at anføre det Nødvendigste til Lættelse i Valget af Midlet. Men ogsaa herved maa det strengt fastholdes, at de foranledigende Aarsager kun i meget enkelte Tilfælde alene ere tilstrækkelige til at kunne finde det rette Middel, og at foruden disse steds de tilstedeværende Symptomer i ethvert enkelt Tilfælde og blandt disse atter de mest karakteristiske maa ansees som gode Holdepunkter ved Valget af Midlet.

Hidrører Hovedpinen fra mekaniske Aarsager saasom Fald, Stød, Rystelser etc., saa optræder denne som oftest umiddelbart efter den ydre Foranledning og kjendes let og som oftest ved den samme ledsagende Omtaagethed, ved Tungthed, Svimmelhed, i stærkere Tilfælde ved Opkastning, Forstyrrelse af Synet, Bedøvelse etc. — Hovedmiblet er i saadanne Tilfælde næsten altid Arnica, som ogsaa er at anvende ubvendigt som Omslag paa det paagjældende Sted (omtrent 20—40 Draaber i en Overkop koldt Vand), men ved Bestadigelser af den ydre Hud maa Opløsningen være svagere (omtrent 10—15 Draaber Tinktur. Svære Tilfælde forebre ogsaa Aconit og Belladonna; i chroniske Tilfælde, hvor der er hengaaet længere Tid siden den mekaniske Bestadigelse, ere ogsaa Arg. nitr., Cicuta og Calcareo nyttige.

Hovedpine som Følge af overbreven Aandsanstængelse, Stillesiddende og Rattetvængen er næsten altid ledsaget af mangfoldige For-

døjlesesforstyrrelser og hypochondriske Besværligheder, og fordre hovedsagelig Nuxvomica og Sulphur.

Hovedpine efter Fraadseri og overstadig Rydelse af stærke Drikke fordre meest Carbo vegetabilis, Nux vomica og Arsenicum.

Hovedpine, foraarsaget af Blodstrømning, stammer hyppigt fra chroniske Lidelser i Lungerne eller Hjertet eller andre Forstyrrelser i Blodomløbet, og karakteriseres isærdeleshed ved Hede og Rødme i Ansigtet, Banken i Aarene i Hovedet og Halsen, Svimmelhed, Forøgelse af Smerterne ved Bevægelse og ved at bukke sig, Hjertebanken. Hovedmidlerne derimod ere Aconit, Belladonna, Bryonia, Arnica, Nux vomica, Gelseminum og Glonoin.

Hovedpine fra Blodfattigdom (Blegfot) viser ofte lignende Symptomer som nys anført, kun er der som oftest en almindelig Følelse af Kulde, kolde Lemmer og en bleg Hudfarve tilfede. Sikkert erkjendes den af de Kjendetegn, som ere angivne ved Blegfot. De virksomste Midler derimod ere i dette Tilfælde Pulsatilla, Natrum muriat., Phosphor, Calcareo og Ferrum.

Katharralsk Hovedpine kjendes let ved Tilstedeværelsen af en Snue, saavel som af den Omstændighed, at det nederste Parti af Panden og Øjnene er angreben. Herimod passe isærdeleshed Aconit, Belladonna, Mercur, Nux vomica og Euphrasia.

Den gastriske Hovedpine som Følge af Maveoverlæselse er sædvanlig ledsaget af Ildebefindende, Opkastning, Uregelmæssigheder ved Aabning og derimod anvendes isærdeleshed Antimo-

nium crudum, Ipecacuanha, Nux vomica, Pulsatilla og Veratrum.

Den nervøse, meest halvsidige Hovedpine (Migræne) forekommer ofte i regelmæssige Mellemrum med borende, halvsidig Smerte, som af et indboret Søm, eller ialtsald paa et begrændset Sted, med Ildebefindende, Opkastning, Kulde og Blegheb i Huden, vandagtig Urin, stor Æmfindtlighed for enhver Lyd, Lys, Bevægelse og Berøring, og hovedsagelig hos Koner og Piger. Hovedmidlerne derimod ere Argent. nitr., Belladonna, Calcareæ, Coffea, Colocynthis, Ipecacuanha, Merc. sublim., Nux vomica, Platina, Sanguinaria, Sepia og Spigelia. Særdeles virksom af disse er, saavel til at mildne og forkorte saavel de enkelte Anfald, som ogsaa til at hæve Dispositionen til disse Lidelser, Belladonna, som passer til de fleste Anfald af den almindelige Migræne, Calcareæ og Sepia, medens Coffea (men meest kun i Form af en stærk Baa-gyndning) og Ipecacuanha kun virke beroligende, hvilket imidlertid ved disse Lidelser allerede maa være meget ønskeligt. Denne beroligende Virkning aftager med hver Gang og udebliver meget hyppigt. Dette er ogsaa den eneste Virkning af Paulinia, som i den nyeste Tid er rost saa stærkt. Nærbeslægtet med Migræne er den hysteriske Hovedpine, hvilken som oftest overfalder sensible Kvinder og ofte er ledsaget af en Mængde andre virkelige eller indbildte Klager; herimod passer foruden ovennævnte Midler isærdeleshed Aurum, Coccus, Ignatia og Valeriana.

Den rheumatiske Hovedpine indtræder ved den mindste Forkjølelse, forandrer ofte sit Sæde,

er hyppigt ledsaget af Tandpine af en rivende, trækende Art, og indfinder sig sædvanligt om Natten og i Sengenvarmen. Meest passende herimod er Aconit, Chamomilla, Mercur, Nux vomica, Pulsatilla, Spigelia.

Gigt-Hovedpine, som i det Hele kun forekommer sjældent og kun hos Personer, som overhovedet lide af Gigt med Knuder, forbrer hovedsagelig Bryonia, Calcarea, Colocynthis, Ignatia, Nitri acidum, Sepia, Aconit.

Smob syphilitisk Hovedpine ere de bedste Lægemidler Jod, Mercur, Nitri acidum, Mezerium, Aurum og Lachesis.

Med Hensyn til de enkelte Symptomer gjælde følgende Hovedbestemmelser:

Ved stærk Dmtaagethed, Tunghed, Svimmelhed, Følelse af Fremtrængen i Panden, isærdeleshed ved at bukke sig, ved en Følelse af Nysten eller en Bevægelse af Hjernen ved at bevæge sig, af Kulde eller ved Feberhebe, rødt eller opustet Ansigt og røde Øjne, stærk, fuld, hurtig Puls, betydelig Ophidselse og Uro; ved Forværelse af Smærterne ved Bevægelse, Tale og Støj: Aconit.

Ved Dmtaagethed, breiende Svimmelhed ved at reise sig op, Hede i Hovedet med Kulde i det øvrige Legeme, Trykken i Panden eller Sammenpressen, Stiffen, Smerte i Tindingerne som af et Søm, med Næseblod, matte Øjne, galdeagtig Dp-lastning: Arnica.

Ved halvsididige, periodiske Hovedsmerter, som forsøges i Stuen, men formindstes i det Frie, ved bankende Smerte og ydre Ømsindtlighed i Hovedbunden: Arsenicum.

Ved Tunghed, Svimmelhed, trykkende Smerte og en Følelse som om Hovedet skulde sprænges ad, ved stikkende Smerter og en Følelse som om Hjernen pulserede, ved Forværrelse ved enhver Bevægelse, Tale og Støi, ved klart Lys, saavelsom om Aftenen og om Natten, ved Rødme i Ansigtet og i Øjnene, Pulseren i Tindingerne, Hede og Blodstrømning til Hovedet, Ømfindtlighed og Smerte i Maven, Qualme og Opkastning: *Belladonna*.

Ved halvsidige, trykkende, hamrende, trækkende Hovedsmerter med Ildebefindende, Mavesyre, Halsbrynde, Opkastning, ved Tunghed i Hovedet med Tunghed i Dielaagene, Kulde som Is i og paa Hovedet, Smertefølelse i Hovedbunden, Hovedpinens Begyndelse om Morgen: *Calcareæ*.

Ved rivende, frampagtige eller halvsidige Smerter, som strækker sig til Kinderne og Tænderne, især efter Forkjølelse og undertrykt Sved, med Rødme i den ene Kind og Blegghed i den anden, ved heftig Sved i Hovedet, Blodstigning til Hovedet, isærdeleshed hos sensible, utaalmelige og uregeerlige Personer: *Chamomilla*.

Ved Hovedpine, som om Hjernen var ødelagt og ituflaaet, eller ved halvsidig Smerte som af et Søm, ved overdreven Ømfindtlighed imod Støi, ved stor Virrelighed, Grædefærdighed, Angst, overdreven Munterhed og Søvnløshed, især ogsaa ved Sindsbevægelser og aandelig Anstrængelse: *Coffea*.

Ved overordentlig rivende, halvsidige Smerter i periodiske Anfald med Qualme og Opkastning, især om Eftermiddagen, trykkende Smerter i Panden, som forværres ved at bukke sig og ved at ligge paa Ryggen, ved Lys, vandagtig Urin og ildelugtende Sved: *Colocynthis*.

Ved trykkende og bankende Hovedpine med Svimmelhed, Blodstigning, Hebe, Pulseren, som forværres ved Bevægelse, ved at bukke sig og ved at ryste paa Hovedet, ved en Følelse af, som om Hjernen udvide sig og var i en bølgeformig Bevægelse med fuld og heftig, ogsaa uregelmæssig Puls: Glonoin.

Ved trykkende Smerte over Næseroden med Jbebefindende, som aftager naar Hovedet højes forover, med en Følelse, som om Hovedet pressedes istykker, Banker eller Smerte som af et Søm med Jbebefindende, Taage for Øinene, Lysky, blegt Ansigt, megen og vandagtig Urin, stor Angst, nedtrykt Humeur, især ogsaa efter Skræk og Værgelse: Ignatia.

Ved Anfald af Hovedpine, som ogsaa ofte optræde halvsidig eller paa et meget begrænset Parti med Jbebefindende og Opkastning, gastriske Besværligheder, Stikken og Riven, især i Panden, som forværres ved Bevægelse og Berøring, eller ved en Følelse af Knusning i Hjernen og alle Hovedets Knokler: Ipecacuanha.

Ved periodiske, halvsidige Hovedsmerter, især belestthed tidlig paa Morgen eller efter Maaltiderne, og som forværres ved Bevægelse, aandelig Anstrengelse, ved Nydelse af Vin og Kaffe, ved en trykkende Tungthed, Blodstigninger, Følelse af Knusning i Hjernen eller som af et Søm i Tindingen, Buldren og Rysten i Hjernen ved hvert Skridt, som forsøges ved Eftertanke og Bevægelse af Øinene, i Forbindelse med Jbebefindende, Opkastning og Forstoppelse: Nux vomica.

Ved krampagtige, trækkende eller rykvis riven og trykkende Smerter med Blodstigning, Tungthed i

Hovedet, Banken, Presusen, Svimmelhed, blegt Ansigt, Grædefærdighed, Ildebefindende, aldeles ingen Tørst, Hjertebanken, Kuldstjærhed, Kulde i Lemmerne, ved Forværrelse om Aftenen og Natten og Vedring i fri Luft: Pulsatilla.

Ved langvarige og hyppige Anfald af Hovedpine med stikkende, borende, udadpressende, bankende, halvsidige Smerter med Ildebefindende og Oplastning, Blodstigning, Omfindtlighed i Øinene for Lys og Banstelighed ved at aabne dem, Forværrelse ved Bevægelse og ved at ryste paa Hovedet, ved Hovedpine om Morgenens, naar man vaagner op, ved chroniske Forstyrrelser i Fordøjelsen, Hævelse og Omfindtlighed omkring Leveren, guulagtig Hudfarve, Leverpletter: Sopia.

Ved periodiske Anfald, som endogsaa vise sig som en regelmæssig tilbagevendende Typus, borende eller rivende Smerte, som forværres stærkt ved den mindste Bevægelse, Tale, Aabning og Støj, som er halvsidig og forbunden med Smerter i Øinene og blegt Ansigt: Spigelia.

## 2. Svimmelhed.

Ogsaa ved denne Lidelser maa der tages omhyggeligt Hensyn til de tilstedeværende Årsager og hvad der kan have foranlediget den, saameget mere, som den sjelden forekommer som eneste Sygdomssymptom, men som oftest viser sig afhængig af eller i Forbindelse med andre Besværligheder.

Den hyppigste Anledning til Svimmelhed er en stærk Blodstigning til Hovedet, eller rigtigere udtrykt, en forhindret og besværliggjort Tilbageflyden af Blodet fra Hjernen og Hovedets Arter, en Om-

stændighed, som ofte foranlediges eller ialtfald for-  
søges ved chroniske Sygdomme i Hjertet, i Lungerne  
og Underlivets Organer eller ved Svulster i Halsen.  
I disse Tilfælde ville Aconit, Arnica, Belladonna,  
Bryonia, Gelseminum, Nux vomica, Phosphor og  
Sepia være de meest passende Lægemidler. Lige-  
ledes kan Svimmelhed være foranlediget af Blod-  
fattigdom, i saa Tilfælde hjælpe: Pulsatilla,  
Ferrum, China, Natrum muriaticum, Baryta, Gra-  
phit, Silicea. Hidsrer den fra Overlæsselse af  
Maven, saa passe Aconit, Antimonium crudum,  
Nux vomica og Pulsatilla; opstaaer den efter over-  
dreven Nydelse af Viin og Spiritus: Nux  
vomica, Opium og Coffea; efter heftige Sindss-  
bevægelser, saasom Skræk, Frygt, Angst, Glæde:  
Coffea, Chamomilla, Ignatia, Nux vomica; af me-  
chaniske Marsager, saasom Fald, Stød, Rystelse:  
Arnica; efterat have gynet, kjørt eller sejlet:  
Cocculus eller Hepar sulphuris.

Efter de enkelte Symptomer gjelde følgende  
Regler: Aconit ved Svimmelhed, som især frem-  
kommer ved at rejse sig op fra en liggende Stilling  
og ved at bukke sig, med en drejende Fornemmelse  
og Fortumling, især i den varme Stue, og med  
Ilebebefindende.

Belladonna ved Svimmelhed med Flimren  
for Øinene, Bedøvelse, Angst, Ansigtsrødme, især  
ved at bevæge og bukke sig.

Cocculus ved Svimmelhed med drejende og be-  
ruset Fornemmelse, især efter Maaltiderne og efter aan-  
delig Anstrengelse, med Fornemmelse af Tomhed i Hjer-  
nen og Ilebebefindende, efterat have gynet, kjørt, sejlet.

Nux vomica ved Svimmelhed kort efter  
Maaltidet, eller efterat have anstrengt Hovedet, eller



tibligt om Morgenens efterat have gaaet i det Frie, eller ogsaa i Sengen i Ryglejet, med Drefusen, Udspilning af Naven og Underlivet, Binde og Forstoppelse.

Phosphor ved Svimmelhed især tibligt om Morgenens og om Aftenen i Sengen, efter Maaltidet og i en fiddende Stilling, med Blodstigning til Hovedet, Ildebefindende og en trykkende Hovedpine.

Opium ved Svimmelhed og Bedøvelse som efter en Kuus, især ved at sidde overende i Sengen, med Sovesøge, røde, glindsende Øjne, udvidebe Pupiller, Taage for Øjnene, blegt Ansigt.

Pulsatilla ved Svimmelhed især ved at see opad, ved at bukke sig og især om Aftenen i Sengen, med Tungheb i Hovedet, Drefusen, blegt Ansigt, Kuldefornemmelse, Ildebefindende og Opkastning.

Rhus toxicodendron ved Svimmelhed især ved at lægge sig ned i Sengen og ved at staae op af samme om Morgenens, med Dødsangst, Bakken og Rykten i Hovedet ved hvert Skridt, som om Hjernen sad løs.

Veratrum ved Svimmelhed med Ildebefindende, Opkastning, Diarrhoe, kold Svøb, indsalbent Ansigt, Angst.

Iøvrigt maa ved Dispositionen til Svimmelhed omhyggeligt undgaaes Nydelse af Kaffe, Viin, Thee, Nattevaagen, megen Tænkning og Sindsbewæggelser.\*)

Hjernebetændelse.

See under Børnesygdomme.

Udslet i Hovedet.

See under Børnesygdomme.

\*) Dog bliver Diæten ofte ganske anderledes ved Svimmelhed stammende fra Blodfattigdom. Dr. S.

### 3. Ansigtssmerter.

Herved forstaaes periodisk optrædende, halv-  
sidige Smerter i Ansigtet, som begynde paa en-  
kelte bestemte Steder, som svare til Begyndelsen  
af visse Ansigtsnerver, og som med disse udbrede  
sig over det halve Ansigt og Hoved. De opstaa  
forbetmeste pludselig, vedvare fra nogle Minuter  
indtil hele Timer og Dage, og ophøre derpaa lige-  
saa pludselig, for atter at indfinde sig med ube-  
stemte Mellemrum. Smerten opnaaer sædvanlig en  
overordentlig Hæftighed og er af en brændende,  
stjærende og stikkende Art.

Undertiden er Ansigtssmerten ingen reen Hoved-  
smerte, d. e. den beroer ikke paa en oprindelig  
Sygdom i vedkommende Nervegreen, men frem-  
bringes ved det Tryk paa Nerverne, som en Svulst  
af nærliggende Been- eller Bløddele udøver paa  
Nerverne, som f. Ex. ved syphilitisk eller gigtagtig  
Beensvulst eller ved Beenedbder i Tænderne og  
sammes Følger. Hæerdeleshed staaer sidstnævnte  
Sygdom (syge Tænder) meget ofte i Forbindelse  
med heftige Ansigtssmerter.

Hovedmidler mod disse Lidelser ere Aconit,  
Belladonna, China, Colocynthis, Mercur, Meze-  
reum, Nux vomica, Pulsatilla, Spigelia, Stannum,  
Stramonium og Verbasum.

Aconit passer især ved kildrende, stikkende og  
rykkende Smerter med en Følelse af Ophoven, rødt,  
hebt Ansigt, Feberuro og Pirrelighed.

Belladonna ved Smerter isærdeleshed i Nær-  
heden af Kinene, der ere røde og vædske, ved For-  
værrelse ved Tryk og Bevægelse, ved Rødme og

Hebe i Ansigtet, Trækninger i Ansigtsmusklene og Fordrejning af Ansigtet.

China ved prikkende, krampagtig stikkende, eller skjærende, brændende Smerter med blegt Ansigt, som forværres ved Tryk og om Natten i liggende Stilling, men bedres ved at spise.

Colocynthis ved rivende, spændende, brændende, stikkende Smerter i den angrebne Side af Ansigtet, ind i Øret og i Hovedet, eller ved ædende Brænden i Kindbenene, stærkere i No end i Bevægelse, med Svulst og Rødme.

Mercur ved Smerter indtil i Tænderne og Forværrelse i Sengenvarmen og om Natten, med Spytskud, Svulst, Sved i Hovedet, især deleshed naar hule Tænder eller syphilitiske Been-svulster ere tilstede.

Mæzereum ved børende, krampagtige Smerter især i Kindbenet som ogsaa i Knoglen, der blive værre om Natten og i Varmen, især dersom Beenlidelser, Syphilis eller Misbrug af Kviksilver tidligere have fundet Sted.

Nux vomica ved rivende og slidende Smerter ind i Øret, med Kindsvulst, Ansigtserødme, Muskeltrækninger. Forværrelse ved Tænkning, Vin og Kaffe.

Pulsatilla ved krampagtig Smerte i Øret og i Øiet, forværres ved Varme, bedres i Kulden, med Ansigtsbleghed, Kulbegysning, Hjertebanken, Ildebefindende.

Spigelia ved Brænden og Spænden omkring Kindbenet og ovenover Dienhulen i regelmæssige Anfald, som opstaaer eller forværres ved at spise, med forudgaaende eller samtidig Hjertebanken.

Stramonium ved heftige Smerter med Taage for Øinene, Bedøvelse i Hovedet, Svimmelhed, kramp-

agtige Trækninger i Hovedet og Ansigtsmusklene, Fordrejning af Munden, Synkebesvær.

Verbas cum ved stiftende, bedøvende Trykken i Kindbenet, som forværres ved at trykkes og ved at bide, eller ved en Følelse som af at blive knebet med en Tang og Stiften i Tindingebenet, fremkaldt ved Gjennemtræk, med Dundren i Hovedet.

Udslet i Ansigtet.

See under Subfygdomme.

## § 2.

### Dienfygdomme.

#### 1. Dienbetændelse.

Dienbetændelserne ere af saa mangfoldig Slags, tilbeels ogsaa saa ondartede og saa farlige i deres Følger, at sammes Bedømmelse og Behandling kun i enkelte bestemte Tilfælde tør overlades til en Lægmand. Derfor skulle her kun omhandles saadanne, som enten kun medføre mindre Fare eller ialtfald ere lettere at kende og som isærbelessheds sikkert ere at helbrede ved Anvendelse af homøopatiske Lægemidler.

Ved de lettere Dienbetændelser, især ved den saakaldte betændelsesagtige Dientatharr, er fortrinsviis og næsten udelukkende den fine Sliimhinde (Bindehinden) angrebet, som bedækker saavel Øiestenen som Størstedelen af Øielaagenes indvendige Sider. Derfor synes det ogsaa hensigtsmæssigt, her samtidigt at omtale Betændelsen af Øiet og af Øielaagene, saameget mere som Bindehinde-Betændelse som oftest omfatter begge Organer. Uagtet nu de her meddelte Helbredelsesanvisninger naturligviis ikke alene gjælde Bindehinde-Betændelse, men

ogſaa alle øvrige Dienbetændelſer, maaskee med Undtagelſe af ſyphilitiſke, gonorréiſke og gigtſke, ſaa maa jeg dog iſær advare enhver Iſke-Læge, ſelv at behandle en Dienbetændelſe, ved hvilken Hornhinden eller det indre Øie er angrebet. Kun hvor Lægehjælp er umulig, kan det tillades Lægmand at gjøre Brug af de her givne Anviſninger.

De vigtigſte Lægemidler ere: Aconit, Apis, Arsen, Aurum, Belladonna, Euphrasia, Hepar sulphuris, Mercur, Nux vomica, Pulsatilla, Spigelia.

Optræder en Dienbetændelſe meget pludſelig og heftig med ſtærk Smerte og maaskee endogsaa med Feber, ſaa er Anvendelſen af Aconit altid henſigtsmæſſig; iſær er dette Middel ogſaa meget virkſomt paa et ſenere Stadium, naar, ſom det ved rheumatiſke Dienbetændelſer ofte er Tilfældet, der om Aftenen indfinder ſig en utaalelig Smerte i hele Øieſtenen eller ovenover Øiet, eller naar denne forſøges i Løbet af Natten.

Apis er ofte meget nyttigt i meget forældede eller hyppigt tilbagevendende Tilfælde ved Hornhinde-Betændelſe, ved ophovnede, betændte Øielaa og Øielaaſrande eller deigagtig Svulſt af de øvre og nedre Øielaa.

Arsenicum paſſer iſærdeleshed ved Chroniſke, haardnakkede Betændelſer, hvor Øielaaene ere ſtærkt ophovnede og røde paa den indvendige Glade, med en heftig, brændende Smerte, med Glands af Hornhinden, almindelig Afmagring og Sygelighed.

Aurum er iſærdeleshed et Hovedmiddel ved ſcrophuløſe (kjerdelagtige) Dienbetændelſer hos Børn, men egner ſig heller ikke ſjældent for Vorne, naar Betændelſer, Dpfloſethed og Bullenſkab i Hornhinden optræde i Forbindelſe med Betændelſe i

**Dielaagsrandene og Dphovnen af Overlæben og Næſen.**

**Belladonna** er iſærdeles ſhed at anbefale, naar det Hvide i Diet er ſtærkt rødt og gjennemtruffet af ſtore Åarer, ved ſtærk Lyſſky, Udflob af brændende Taarer eller en ubehagelig Tørhed, ved Forøgelfe af Smerten ved at bevæge Øinene, ved en roſenagtig Svulſt af Dielaagene, heftig Hovedpine, Svimmelhed, Formørkelse af Synet, Glimren for Øinene eller ſorte flyvende Pletter.

**Euphrasia** er Hovedmidlet, naar Betændelſen er fremkaldt eller ledſaget af Snue, med rigelig Sliimaffondring eller Taareflob om Natten, ogſaa naar der viſer ſig ſmaa Blærer i Randen af Hornhinden.

Ved Ømhed og Svulſt af Dielaagets Rande med tyk, materieagtig Sliim og Klæbrighed om Natten, ved Bylder og Pletter paa det hvide Parti og paa Hornhinden med Udflet omkring Øinene, ved Omkrængning af Dielaagene paſſe fortrinlig *Hepar sulphuris* og *Mercur*, hvilket ſidſte Middel overhovedet er ſærdeles virkſomt imod Sygdomme i Hornhinden. \*)

**Nux vomica**, naar iſær de indre Dienſtrogere betændte, ved Fornemmelfe ſom af Sand eller Brænden, ved heftigt Taareflob, ſtærk Lyſſky, iſærdeles ſhed om Morgenene, Snue med Hovedpine, megen Pirrelighed og Forſtoppelfe.

**Pulsatilla** paſſer ved bleg Svulſt af Die-

\*) Saavel imod almindelig Dienbetændelſe, ſom imod den Form, der ſtammer fra Kjørtelſyge, anbefales *Ipecacuanha* i lave Forrøvninger. Jeg har ofte i heftige Tilfælde anvendt det med godt Reſultat.

laagene eller rundt om Vinene, rigtig Laare- og Sliimaffsonbring, naar Vinene klæbe sammen, heftige Smerter i Vinene, Forværrelse af Tilstanden om Aftenen og om Natten.

Spigelia ved utaaelige Smerter i Vinene dybt ind i Gulerne, især ved Bevægelse med en Fornemmelse som om Diestenene vare for store, ved brændende, borende, stikkende, skjærende Smerter, som om der var fremmede Legemer i samme, stærk Laaresflob, ved Vinenes matte Udseende, svagt Syn, Synssvækkelse ved Anstrengelse, Lysstyk, Laage for Vinene.

Ved næsten alle disse Dienbetændelser er det forøvrigt nødvendigt at beskytte det smertefulde og lysstyk Øie imod klart Lys og Lufttræk. Dette skeer bedst derved, at man binder et Stykke grønt eller mørkeblaat Papir om Panden, som dækker for Vinene. At tilbinde Vinene med et Klæbe, kan ikke tilraades formedelst den let derved foranledigede Ophedning og Gnidning. Vinene renses bedst med lunkent, ikke koldt, Vand.

Er Betændelsen opstaaet ved Indtrængen af fremmede Legemer (saasom Støv, Splinter, Insekter etc.) saa er, næstefter Bortfjernelsen af Gjenstanden, de hensigtsmæssigste Lægemidler Aconit og Arnica; ligeledes er Arnica godt ved mekaniske Beskadigelser af Øiet, saasom Stød, Tryk, Operationer etc. og ved den af et Blodkars Sprængning foranledigede Blodubtræbelse i det Hvide af Øiet.

Er Betændelsen foranlediget ved overvættes Anstrengelse af Øiet, ved anstrengt Stirren, ved Nattearbejde etc., saa ere isærdeleshed Belladonna,

Cannabis, Euphrasia, Nux vomica og Ruta at anbefale; ere acute Hudsygdomme, ſaaſom Mæſlinger, Skarlagensfeber, Kopper, gaaede forud for ſamme, ſaa paſſe Belladonna, Mercur og Sulphur.

Imod hyppigt og overvejende Taareflod maa iſærbeleſhed anvendes Euphrasia, Crocus, Digitalis, Graphit, Phosphor eller Spigelia, imod de ſaakaldte „rindende Øjne“: Euphrasia, Mercur, Pulsatilla og Rhus toxicodendron, imod Taarefiſtel og Forſtoppelse i Taarecanalen: Natrum mur., Silicea (rigtignok ville de fleſte Tilfælde nødvendig-gjøre en operativ Indgriben for at frembringe Helbredelse), imod Sammeſe i Dienlaagene: Belladonna, Plumbum, Sepia, Spigelia, Veratrum og Zincum, imod Skelen: Alumina, Belladonna, China, Hyoscyamus og Stramonium.

## 2. Dienſvagbed.

Herved forſtaaes hverken den ſædvanlige Nær- eller Fjernſynethed, da begge diſſe Tilſtande langtſra altid ere Følger af en ſvag Synskraft, og om endog for endeel kunne være af ſygelig Oprindelse, dog neppe kunne være Gjenſtand for Behandling ved Lægemedler. Der kan ſaaledes her kun være Tale om den Slags Dienſvagbed, ſom beſtaaer i en hurtig Træthed eller Smerte i Øinene, ſom opſtaaer ved Overanſtrængelse, ſom ogſaa ved nogle andre Tilfælde, hvori Synskraften formindſkes.

De vigtigſte Lægemedler for Øine, ſom ikke taale mindre Anſtrængelser, ſaaſom Læsning, Sy-



ning, uden at der indtræder Smertes, Taareaffon-  
bring eller beslige, ere Ruta, Euphrasia og  
Cannabis, og er det endogsaa undertiden af god  
Virkning, foruden den indvortes Brug af disse  
Midler, at anvende dem udvortes, idet man flere  
Gange om Dagen fugter Vinene med Vand med  
en Tilfætning af disse Midler (omtrent 5 à 6  
Draaber af Tinkturen i et Vinglas Vand).

Foruden dette kunne endnu følgende specielle  
Angivelser anføres:

Bed Sortnen for Vinene: Belladonna,  
China, Conium, Hyoscyamus, Pulsatilla, Stramonium.

Bed Sammenflyden af Bogstaverne:  
Belladonna, Graphit, Hyoscyamus, Stramonium.

Bed Funflen for Vinene: Asa foet., Baryt,  
Belladonna, Calcareæ, Conium, Digitalis, Jod, Nux  
vomica, Spigelia.

Bed mørke Pletter for Vinene: China,  
Calcareæ, Kali carb., Mercur, Phosphor, Thuja.

Bed flyvende Puncter (mouches volantes):  
Agaricus, Belladonna, Mercur, Hyoscyamus, Lac-  
tuca vir.

Bed Flimren for Vinene: Belladonna,  
Carbo veg., Causticum, Conium, Digitalis, Hepar  
sulph., Jod, Ledum, Petroleum, Tartarus, emet.,  
Thuja.

Bed Taage eller Flor for Vinene:  
Gummi Ammoniacum, Baryt, Calcareæ, Belladonna,  
China, Hep. sulph., Mercur, Opium, Phosphor,  
Plumbum, Ruta, Sulphur, Tart. emet., Thuja.

Bed Farvesyn: Euphorbium, Stramonium,  
Aurum, Belladonna, Spigelia, Veratrum.

Bed Dobbeltsyn: Aurum, Belladonna, Di-

gitalis, Hyosc., Jod, Petroleum, Secale corn., Sepia, Stramon., Veratrum.

Ved at see Grønt: China, Digitalis, Mercur.

Ved at see Gult: Alumnia., Arsenic., Canthar., China, Digit., Sulphur.

Ved at see Rødt: Conium, Digitalis, Hyoscyamus.

Ved at Gjenstandene forstørres: Euphorb., Hyosc., Laurocerasus, Niccol, Staphysagria.

Ved at see Gjenstandene smaa: Hyoscyam., Stramon.

Ved at see Gjenstandene halvt: Aurum, Lobelia, Lycop., Muriat. acid., Natrum mur., Sepia.

Ved at see Gjenstandene omvendt: Bellad., Kali carb., Stramon.

Ved at see Gjenstandene fjernt: Sulphur, Theridion.

Ved Nær- og Fjernsynethed er det imidlertid isærbelesshed Brillerne, som maa anbefales. Førstnævnte opstaaer sædvanlig i Ungdommen og ved gjentagende og ubelukkende at see nærvæd, saasom ved at læse, sye og beslige, og fordrer Formindstelsesglas, Fjernsynethed er især en Besværighed i Alderdommen og fordrer Forstørrelsesglas. Brilleglas maae altid vælges nøiagtigt passende for Øinene og være af reent, feilfrit Glas.

## § 3.

**Øresygdomme.**1. Betændelse i Ørefjertlerne  
(Faarefyge).

Denne med Rødme og Smerte forbundne Svulst af Spytkjertlen, der ligger under og foran Øret, forekommer ikke sjældent hos Børn, undertiden endogsaa epidemisk; Smerten trække sig ved samme i heftige Tilfælde ned i Halsen og op i Øret, og er hyppigt ledsaget af Feber, Hovedpine og Tung-  
hed i Hovedet. Imidlertid fordeles Betændelsen sig næsten altid og kun sjældent indtræder Bøldenstab; men ret ofte forsvinder Svulsten ved Øret pludseligt og opstaaer paa aldeles lignende Maade i Testiklen eller de store Skamlæber hos Kvinder.

Næsten i alle Tilfælde er Mercur det specifikke Lægemiddel og er tilstrækkeligt til i faa Dage at tilvejebringe fuldstændig Helbredelse; kun hvor Tilstanden trues af betydelig Hjerneaffection, Svimmelhed, Bedøvelse, Blindelse og en Forplantning til Hjernen, maa der strax anvendes Belladonna. Ved Forplantning til Testiklen er Pulsatilla Hovedmidlet. Skulde der blive en Haardhed og ringe Svulst tilbage i Ørefjertlen, saa passe Baryt og Aurum, og i meget sjældne Tilfælde af Bøldenstab Calcareæ, Hepar sulph. og Silicea.

## 2. Ørebetændelse.

Denne Betændelse optræder næsten udelukkende i Øregangen og er som oftest ledsaget af meget heftige Smertes; Øregangen er da heet, rød og

ofte aldeles tilstoppet. Hovedmidlet herimod er i Begyndelsen isærdeleshed Pulsatilla, kun naar Betændelsen strækker sig længere ind og Hjernen afficeres derved, maa der bruges Belladonna. Saasnart Betændelsen ikke lader sig fordele, naar der opstaaer Boldenskab, som fordetmeste tilkjendegiver sig ved en blød Bylb, saa er Mercur det bedste Middel, som meget hurtig bringer Bylden til at aabne eller fordele sig; samtidig maa Dret flittig indsprøjtes (2 à 4 Gange daglig), for at rense samme for Blod og Materie.

Skulde derimod Betændelsen udgaae fra Venene eller efterhaanden angribe Drets benebe Dele og der saaledes opstaaer Veenedder, saa er næstester Mercur endnu Silicea et Hovedmiddel; dog turde denne Lidelser paa Grund af dens mulige Følger ikke egne sig til at bedømmes og behandles af en Lægmand.

### 3. Drepine.

Herved forstaaes heftige Smerter i den indre Dregang, uden at nogen Betændelse er synlig. Smerterne opstaa oftest af en Forkjølelse, og ligne Tandpine. Hovedmidlerne derimod ere Belladonna, Chamomilla, Mercur, Nux vomica og Pulsatilla.

Belladonna passer isærdeleshed ved Smerter, som gaa ned i Svælget og op i Hovedet, som forværres ved Bevægelse, med Sugen og Brusen i Dret, Modtagelighed for hver Lyd, rødt og heftigt Ansigt, Blodstigning til Hovedet.

Chamomilla ved utaalelige, stikkende Smerter

som af en Riv, Tørhed i Øret og en Følelse, som om samme var tilstoppet.

Mercur ved rivende, stikkende Smerter, som strække sig til Kinderne og i Lænderne, Forværrelse af Smerterne om Natten og i Sengenvarmen, med Fugtighed og Vædse i Øret og Sved i Hovedet uden Lættelse.

Nux vomica ved rivende, stikkende, stødende Smerter, isærbelesshed heftige tidligt om Morgenens og om Natten, med Fornemmelse af en stærk Klang og en stærk Lyd af egne Ord eller Knagen ved at tygge, især hos hidfige, utaalmobige Personer.

Pulsatilla ved krampagtige, rivende Smerter og Fornemmelser, som om Noget trængte ud af Øret, ved Hede og Rødme af det ydre Øre og en Affection af hele den paagjældende Side af Hovedet, ved Forværrelse om Aftenen og Natten, isærbelesshed hos Kvinder og fuldstjære, blodfattige Personer.

Man maa vogte sig strængt for ydre, især skarpe Midler, fordi saadanne let kunne foranledige ulige skadeligere Virkninger, ja endogsaa fuldstændig Døvhed; dog kan man imod haardt, indstrumpet Ørevor eller ved en betydelig Tørhed i Øregangen anvende nogle Draaber lunken Balmue- eller Mandelolie, som efter nogle Timers Forløb forsigtigt atter afstræses, eller ved meget heftige Smerter lade nogenlunde varmt Vand eller Mælk dampe ind i Øret gennem en Tragt.

#### 4. Øreflod.

Denne besværlige, meget ofte haardnakkede Lidelse forekommer isærbelesshed hos fjertelsvage

Børn og som Følge af en Ørebetændelse. I sidste Tilfælde er som oftest Mercur det hensigtsmæssigste Lægemiddel, i første Tilfælde, hvor tillige endnu andre Lidelser, saasom Udslet i Hovedet og i Ansigtet, Kjertelhævelser og deslige, ere tilfæde, opnaaes det bedste Resultat med Sulphur og Hepar sulph.

Fremkommer Ondet som en Følge af Starlagensfeber, Mæslinger eller Kopper, saa maae fremfor alt anvendes Belladonna eller Pulsatilla.

Bestaaer Floppet kun af en overflødig Afsondring af Ørevog, saa passer fortrinsviis Conium; er det derimod blodigt: Mercur og Pulsatilla; ved tyndtflydende, ilbelugtende Materieflob, Bestaabigelse af Trommehinden og Veenebber: Mercur, Silicea og Aurum.

Endvidere maa man daglig holde Øret reent ved Indsprøitning af lunken Mælk eller lunkent Vand, og beskytte det mod ydre Bestaabigelser ved en let Prop af Bomuld eller Charpi; alle skarpe og sammensnærpnde Indsprøitninger maa strengt undgaaes.

Imod de undertiden opstaaende Følger af de ved Uforsigtighed eller af sig selv ophørte Udslob, som meest viser sig ved Tunghørhed eller betænkkelige Hjerne symptomer, anvendes Belladonna og Dulcamara og varme Vanddampe i Øret. Ogsaa forplanter sig undertiden Boldenskab i Ørets benede Dele til Hjernen, og forarsager der Bestaabigelser af dens haarde og bløde Dele med lignende Symptomer som ved Hjernebetændelse. Derfor maa man aldrig forsømme et længere vedvarende Øreslob, isærdeleshed naar det er stinkende og raadvent, da

saadant i de fleste Tilfælde lader formode tilstedeværende Beenebber.

Imod altfor rigeligt Ørevor hjælpe hyppigt Conium og Kali carbonicum, imod tørt og for tykt Ørevor Lachesis.

### 5. Sufen for Ørene og Tunghørhed.

Begge disse Under optræde hyppigt samtidig med Ørebetændelse og Øreslud, og blive da ogsaa som oftest helbrede ved Anvendelsen af de ved disse opgivne Lægemidler. Endnu hyppigere ere de dog kun Følgen af en mechanisk Tilstopning af Øregangen ved forhærdet Ørevor eller andre Legemer. Derfor er det stedse nødvendigt, nøie at undersøge Øret, idet den Syge sætter sig saaledes, at Sollyset falder ind i Øregangen, eller idet man anvender et Ørespeil og kunstigt Lys. Rensningen af Øregangen finder da bedst Sted ved Anvendelsen af en ikke skarp Øreskee eller ved en Haarnaal, som er omviklet med fiint Lærred; dog maa dette skee med stor Forsigtighed og der maa aldrig derved foraarsages nogen Smerte. Ere Forhærdelserne for faste, saa maa samme først blødgjøres ved Indsprøjtning af Mandelolie eller af hede Damppe af Vand eller Mælk, eller ved Indsprøjtning af lunkent Vand. Viser det sig, at Trommehinden er istykker eller bestadiget, saa opgive man alle videre mechaniske Forsøg og vogte sig især for alle Indsprøjtninger.

Derfor derimod ingen mechaniske eller organiske Aarsager til denne Ørelidelse ere at opdage, saa maa man søge andre Aarsager dertil, for ved Middelvalget at tage de størst mulige Hensyn til

samme. Hidrører saaledes f. Ex. Ondet fra et uforsigtigt undertrykt Dresflob, saa passer fortrinnsviis Hepar sulph., Mercur eller Lachesis; er det opstaaet som Følge af Mæslinger: Pulsatilla, efter Skarlagensfeber: Belladonna, efter Kopper: Mercur og Sulphur, efter Nervesfeber: Phosphor, Causticum eller Cocculus, efter et fordreuet Hududslet: Sulphur eller Mercur. Saa fremt Lidelsen betinges af Blodstigning, som lader sig erkjende af de øvrige Symptomer, der ledsage Congestionen til Hovedet, saasom dens midlertidige Optræden eller Forværrelse ved legemlig Anstrængelse og de sædvanlig samtidig tilstedeværende Lidelser i Hjertet eller Lungerne, saa fortjener isærdeleshed Belladonna, Bryonia, Phosphor, Pulsatilla og Spigelia at komme i Betragtning; ved Blodfattigdom og Blegfot: Pulsatilla og Ferrum, ved stor Tørhed i Dregangen og fuldstændig Mangel paa Drevor: Carbo vegetabilis eller Lachesis.

Med Hensyn til de enkelte Symptomer gjælde især følgende Anviisninger:

Ved heftig Susen for begge Øren, især ved at bukke sig og ved Bevægelse, ved Svimmelhed, Hovedpine, Flimren for Øjnene, Ansigtssrødme, ved Tunghørhed afveglende med forhøiet Modtagelighed for Støi anbefales Belladonna.

Ved Fornemmelse af Tilstopning i Ørene med Susen og Klingen, ved forhøiet Gjenlyd af Toner og Ord, ved en Fornemmelse, som om der blæste en kold Vind ind i Øret, Dresflob og tvingende Smerte i Øret: Causticum.

Ved meget blodigt Drevor, Bruslen, isærdeleshed i en liggende Stilling og om Natten, ved Fremfald for Ørene ved Snøften og Nysen, Tunghør-



hed eller overdreven Omfindtlighed i Hørelsen, med Angst for enhver Støi og Affsty for Larm: *Conium*.

Ved Banken, Syngen, Brusen, Rullen, Knagen, Knalben, Bladsten i og bag Øret, ved en Fornemmelse, som om der løb Vand i Øret eller som om der ved Opstød trængte Luft fra Halsen ind i Øret, ved Tunghørhed, som bedres ved Rjørsel: *Graphit*.

Ved Brummen, Trommen, Kvibderen for Ørene, Tunghørhed og en Følelse af Tilstopning, ved Tørhed i Øret, ved ringe Mængde tørt, haardt og blegt Ørevor, Hudløshed og Udslet paa Ørene: *Lachesis*.

Ved stikkende Smerte dybt inde i Øret, som fremkommer ved at tale, lee og gaa stærkt, ved Fornemmelse af Tilstopning og Tunghørhed, som ofte ophører ved at snøfte eller som bedres eller forværres ved Vejrförändring, ved Brusen i bukket Stilling, eller Knalben ved at snøfte og synke: *Mangan*.

Ved Hudløshed i den indre Øregang, Udsled af Sliim, Materie eller Blob, Udslet paa Ørene og i Hovedbunden, Kjertelsvulst, Brusen, især ved at ligge til Sengs, pulserende Støi, forhøiet Gjenklang af alle Toner i Øret, en Fornemmelse af Tilstopning i Øret, som hæves ved at synke og snøfte: *Mercur*.

Ved Udslet paa Ørene, Hudløshed og Bædsten bag samme, Susen, Knagen, Klukken med Fremfald for Øret, betydelig Tunghørhed og Tørhed i Øret: *Petroleum*.

Ved Banken, Pulseren, Susen, som ofte optræder pludseligt, eller som forværres ved at gaa,

ved at bukke sig, efter at have spist eller i liggende Stilling, med Blodstigning til og Summen i Hovedet, stærkt Efterklang af Tale og Ord, Tunghørhed især for Tale, Uengstelse for Støi: Phosphor.

Ved Gliimflod, Omfindtlighed i den indre Dregang, ved Fremfald for Drene med Susen, Brusen, Klang, Qviddren eller Knagen ved at bevæge Hovedet, især hos blegfottige Kvinder og ved Uregelmæssigheder af Perioden: Pulsatilla.

Ved Materieflob eller flydende Drevor, Svulst i det ydre eller det indre Dre, Brusen, Banken, Kluffen, især i liggende Stilling, Tilstopning, som undertiden hæves med et Knald, Tunghørhed eller stærkt Omfindtlighed i Hørelsen: Silicea.

Ved stærkt Aløe, Materieflob, Udset med Susen, Klang, Brummen, Rimen, Tunghørhed, især efter acute Hududset, Inat, fordrevet Dresflod: Sulphur.

Et Hovedmiddel mod Tunghørhed, især naar samme er forbundet med Svækkelse eller Lammelse af Drenerverne og med afvejlende Fornemmelse af Kulde og Hede i Dret, er Veratrum, som ofte har bragt Hjælp i de meest langvarige og haardnakkede Tilfælde. Især anbefales dets Anvendelse med Mandelolie udvortes.

#### § 4.

### Lygdomme i Næsen.

#### 1. Snue.

En almindelig Snue hos et isvrigt sundt Menneske, især i Løbet af Vinteren og Foraaret,

udkræver som oftest slet ingen Hjælp af Lægemidler, og forløber i Løbet af 6 til 9 Dage uden væsentlig Besvær. Kun i det Tilfælde, at den optræder meget heftig, eller foraarsager besværlige Bisymp-tomer, er det hensigtsmæssigt at anvende Læge-midler. De tvende Hovedmidler mod en alminde-lig Snue, især paa en Tid, hvor mange Personer samtidig lide deraf, ere Mercur og Aconit. Viser den sig med megen Nysen, flyder der meget Vand ud af Næsen, er denne noget tyk og øm, synes Næseflimen at være ildelugtende, og er der kun lidt Tunghed og Smerte i Hovedet tilstede, saa hjælper Mercur hurtigt.

Mærker man derimod afvejlende Kulde og Hebe, med Disposition til Rattespæd, Rildren i Halsen med let Hoste eller Hæshed, stærk Hovedpine i Panden og almindeligt Ildebefindende, saa er Aconit at foretrække.

Ved Snue med forstoppet Næse, megen Tørhed i Munden, Ansigtserødhede, brændende Hebe i Rinderne om Aftenen, Alse i Næsen, eller ved Næseforstop-pelse om Natten og Flod af Næsen om Dagen, Hebe i Hovedet, almindelig Ømhed i Lemmerne, Brantenhed og Uergerlighed: *Nux vomica*.

Er Slimen ikke ildelugtende, men skarp og bi-dende med stærk Brænden og Hudløshed i Næse-borene, stor Uro, Uengstlighed og Søvnløshed, gjør Varme og Bevægelse godt, saa hjælper Arse-nicum. Ved den værste Snue, hvor der er Vand-affondring i Mængde, hvor Næse og Læber ere stærkt hudløse og ophovent, er Lachesis det bedste Middel.

Snue hos Børn med inflammerede Næsebor, revnede, betændte, smertende Læber, en bleg og en

rød Rind, Kulbegysninger, Tørst, Søvnløshed og Tunghed i Hovedet, læges med Chamomilla.

Ved Næsetilstopning hos Pattebørn, som vanskeliggjør Diegivning, og som nødsager dem til at holde Munden aaben naar de sove, hjælper Nux vomica, tillige kan man i saa Tilfælde indgvide Næsen udvendig og indvendig med en Smule Mandelolie eller Fedt. Er Næsen desuden forstoppet med en tyk, seig Sliim og farer Barnet pludselig op af Søvne, som om det skulde gvaæles: Sambucus.

Angribes Næsen mindre af Snuen, men forstyrrer den samtidsigt Appetiten og Lugten, og er Slimen tyk, grønnagtig eller guul og stinkende med stærk belagt Tunge, saa maa der bruges Pulsatilla, er der meget hvidt Sliim i Næsen, og ere Rinene angrebne og vædskende: Euphrasia.

Imod Følgerne af en tilbagetraadt Snue hjælper bedst, naar Hovedet er angrebet: Aconit og Pulsatilla, opstaaer derimod Kortaaendethed, Asthma eller Smerter i Brystet: Arsenic, Ipecac. eller Bryonia, alt efter de enkelte Symptomer.

Hovedmidlerne mod Chronisk Snue, som næsten altid er Følgen af en scrophuløs eller tuberculøs Constitution ere Calcareæ, Silicea, Sulphur, Jod, Pulsatilla og Aurum. Udstrækker samme sig især til de bagerste Abninger i Næsen, henimod Svælget, saa at der mere opstaaer Hårten, og Slimen trækkes bagud til Munden, saa er Sulphur at anbefale.

Ved dybere Betændelse med Svulst af Slimhinden i Næsen med Afgang af faste, rørformige og blodige Masser, passer Silicea, ved ilbelugtende Sliimudflod med Tab af Lugt og Smag Pulsatilla.

Har Betændelsen udbredt sig til Knoklerne med stinkende Boldenstøb (Ozæna) saa maa Aurum, Mercur og Silicea anvendes. .

## 2. Svulst og Udslet i Næsen.

For scrophuløse Børn med chronisk Forstoppelsesnue faaer Næsen ikke sjældent et ophovnet, oppustet Udseende uden særdeles Røbme eller Smerte. Herimod ere for det meste at anvende de samme Midler, som ere angivne mod den chroniske Snue, isærdeleshed Calcareæ, Hepar s., Mercur og Sulphur. Sætter der sig samtidig Skorper og Rande indeni Næsen og udvendig ved Næseboerne, saa passe ogsaa Antim. crudum, Aurum, Thuja og Borax, ved Udslet paa Næsetippen: Carbo veget., Nitri acidum og Silicea.

Ved Svulst af Næsen som Følge af et Fald eller Stød maa først anvendes Arnica, ved rød, smertefuld Svulst Belladonna, Bryonia og Mercur.

Ved rød Næsetip eller røde Pletter paa Næsen passe især Carbo veg., Acid. nitri, Acid. phosph. og Rhus toxicod., ved kobberfarvet Næse som Følge af Drif Arsen, Carbo veg., Belladonna, Rhus toxicod. og Petroleum.

## 3. Næsetilstopning og Polyp.

Ved Næsetilstopning som Følge af Slimhindens Opsvulmen, især hos scrophuløse Børn, ere de bedste Lægemidler Calcareæ, Pulsatilla og Silicea; det anbefales ogsaa hver Morgen at opsnuse koldt Vand i Næsen.

Næsepolypper forsvinde ikke sjældent fuldstændigt og for bestandigt efter Brug af *Calcareæ* eller *Sepia*, kun maa disse Midler anvendes i længere Tid; i Tilfælde af at dette ikke skulde lykkes, kan man forsøge *Pulsatilla*, *Hepar s.*, *Silicea*, *Kali bichromicum* og *Teucrium*.\*)

#### 4. Næseblod.

Imod mildt Næseblod, særlig i acute Sygdomme, er i Almindelighed intet Lægemiddel nødvendigt, kun naar det er meget heftigt, eller ofte vender tilbage, maa der gribes ind derimod.

Hidrører det fra en mechanisk Årsag, saa er *Arnica* at foretrække fremfor alle andre Lægemidler, foraarstages det derimod ved almindelig Ophidselse af Blodcirculationen eller af Congestioner, saa er *Bryonia* Hovedmidlet; opstaaer det som Følge af Kaffe- eller Viindriksen: *Belladonna* og *Nux vomica*; efter Ophidselse eller Brede: *Aconit*; som Følge af en Snue og heftig Nysen: *Pulsatilla* og *Conium*; hos Børn, som lide af Drumbesværigheder: *China* og *Mercur*; hos Fruentimmer, som lide af udebleven eller svag Menstruation: *Pulsatilla* og *Belladonna*.

Ved meget stærkt Næseblod, hvor man maa frygte Forblødning, maa der anvendes *China*, *Ipecacuanha*, *Sepia* og *Mercur*; hvor Blodet er meget sort, *Crocus* eller *Kreosot*; hos meget svage Personer især *China* og *Secale cornutum*.

\*) *Teucrium* kan man ogsaa anvende som Pulver, hvoraf der opsnuses lidt i Næsen. Ofte fordrer især de faste Polypper chirurgisk Behandling. Dr. S.

Mod meget hyppigt tilbagevendende Næseblødninger ved den ringeste Foranledning er isærdeleshed Carbo veget., Kreosot, Phosph. og Sulph. at anbefale.

Kun ved meget stærke og længe vedvarende Næseblødninger, hvor pirkelig flabelige Følger kunne berygtes af Blodtabet, eller hvor endogsaa en virkelig Forblødning kan berygtes, ere ydre sammentrækkende Midler tilladte, saasom Jis, Chlorjern, Alun etc., men i saadanne Tilfælde maa man hellere overlade Behandlingen til en Læge eller en Chirurg.

## § 5.

### Sygdomme i Munden.

#### 1. Mundbetændelse.

Ved denne Sygdom fremkomme paa Tandkjødet og paa Mundens Slimhinde smaa Knuder, som smerte heftigt og forarsage en ubehagelig Lugt og betydelig Spytaffondring; samtidigt bliver Tandkjødet svampet, ophovnet, forandrer Farve, træder tilbage fra Tænderne og bløder let. Som oftest ere ogsaa gastriske Symptomer og Diarrhoe eller Ophovnen af de i Nærheden værende Spytkjertler, saavelsom Feberbevægelser tilstede derved.

Hovedmidlet derimod er i de fleste Tilfælde Mercur i oftere gjentagne Indgiver; kun hos saadanne Personer, hos hvem dette Middel allerede i andre Sygdomme er blevet misbrugt, eller hos hvilke det maaske endogsaa er Narrsag til Sygdommen, maa det undgaaes og istedet derfor maa anvendes Acid. nitricum. Er den ubehagelige

Lugt stærk og raadden, saa anbefales nogle Indgiver Kali chloricum.

I lettere Tilfælde, hvor der mindre er Knuder tilstede end smaa Blærer og Pletter, og hvor ingen Gastricisme og Diarrhoe finder Sted, har som oftest Borax en meget gunstig Virkning.

Ved blegt, gabenbe, let blødende Tandkjød med Knuder eller smertelige Hævelser og dersom Tænderne løsnes og blive sorte, hjælper Staphysagria hurtigst, og danner sig paa Tungen større eller byberegaende Bylder, som ere meget smertefulde og som vanskeliggjøre Bevægeligheden: Acidum muriaticum. Ogsaa Carbo vegetabilis er af god Virkning ved slem Lugt og let Blødning, især efter Misbrug af Merkur.

## 2. Lungebetændelse.

Om ogsaa meget sjældent, saa opstaaer dog undertiden i en Deel af Tungen en Betændelse, som endogsaa kan blive til Voldenskab. De bedste Midler herimod ere som oftest Aconit, Cantharis og Mercur; kun hvor en mechanisk Virkning er tilstede, som Knusning eller Bestaabigelse ved Tænderne, et Insektstik eller et ved at spise foranlediget Saar, maa der først og fremmest anvendes Arnica. Udgaaer Betændelsen oprindeligt fra Gummernerne, saa ere Belladonna og Lachesis at foretrække.

Ved Ophvoenen af Tungen er isærbeleghed at anvende Arsen, Jod, Conium og Aconit, er den vanskelig at bevæge og lammet: Acid. muriaticum og Causticum, ved Bylder: Mercur, Acid. mur. og nitricum, ved Hudløshed og en bræn-



nende Fornemmelse: Aurum, Lachesis og Pulsatilla.

### 3. Ildelugtende Mande.

I de fleste Tilfælde er denne forarsaget af de forraadnende Substantier og Rester af Mad, som findes i hule Tænder eller mellem Tænderne; man skal derfor sørge for Mundhulens Renselse ved at børste Tænderne flittigt og udfylle Munden hyppigt, og de tilstedeværende Gulninger i Tænderne maa udfylbes med en ikke metallist Substant (Blombering). Bedst egner sig til Børstning og Udfylning Tandpulver, som ikke er af medicinist Oprindelse og fortyndet Viinaand eller Eau de Cologne. Er Tandkjødet maaskee angrebet og ømt, saa kan man til Udfylningen anvende en let Opløsning af Kali chloricum (1—15).

I de saa Tilfælde, hvor denne Besværlighed ikke hidrører fra Tænderne, men fra et Maveonde, ere som oftest endnu andre Fordøjelsesbesværligheder tilstede, hvorfor de mod Mavesygdomme angivne Lægemidler ogsaa hensigtsmæssigt anvendes herimod. Navnlig passer hyppigt Pulsatilla og Nux vomica. især naar Lugten navnlig bemærkes om Morgen. I langvarige Tilfælde ere ogsaa Aurum og Sepia af megen Nytte.

Skulde der blive ildelugtende Mundlugt tilbage efter Bylde i Svælget eller Næsen, saa maa der anvendes Mercur, Aurum og Silicea.

### 4. Spytflod.

Hidrører samme fra en Maveaffection, ved hvilken der naturligvis steds ere andre Fordøjelses-

besværligheder tilstede, saa passe især Antimon. crudum, Baryt, Belladonna, Colchicum, Euphorbium, Mercur og Nux vomica, og man maa tage Hensyn til de ved det paagjældende Maveonde anførte Lægemidler.

Fremkommer Spytflob af Sygdom i Mundens Slimhinde, fra Tænderne eller fra Spytfjertlerne, saa ere Mercur, Acid. nitricum og Lachesis de bedste Lægemidler, er den derimod. Følge af Merkurmisbrug, saa passer bedst Hepar sulph., Jod og Acid nitricum.

### 5. Forandring i Smagen og Tungebelægning.

Begge Tilstande ere næsten altid kun Følgesymptomer for Mavesygdomme, og derfor maa de for disse angivne Lægemidler eftersees; imidlertid skulle ogsaa her angives nogle af de meest passende Lægemidler for nogle særdeles karakteristiske Symptomer i de Tilfælde, hvori de oprindelige Mavesymptomer ere for ubetydelige til efter dem alene at ubfinde det rigtige Lægemiddel.

Bitter Smag alene: Bryonia, China, Chelidonium, Silicea, Sulphur;

bitter Smag ved Spiserne: Bryonia, China, Pulsat, Rhus toxicod.;

raabden Smag: Arnica, Cham., Mercur, Pulsat., Hep. sulph., Sulphur;

suur Smag alene: Baryt, Calcareae, Coccus, Nux vom., Acid. phosph.;

suur Smag ved Spiserne: Belladonna, Calcareae, Nux vom., Pulsatilla;

slimet (flau) Smag: Bryonia, Mercur, Pulsat., Staphysagria, China, Ipecacuanha;

- sødlig Smag: Bryonia, Cuprum, Mercur, Pulsat.;  
 skarp (bidebde) Smag: Laurocer., Rhus toxicodendron, Veratrum;  
 saltagtig Smag: Arsen., Carbo vegetab., Cuprum, Mercur, Zincum;  
 metallisk Smag: Calcareo, Coccul., Lachesis, Mercur, Senega;  
 jordagtig Smag: Hepar sulph., Nux mosch., Pulsat.;  
 blodagtig Smag: Alumen, Ferrum, Ipecacuanha;  
 harst Smag: Asa, Euphorbium, Pulsatilla;  
 ved Spisernes Smagløshed: Arsen, Mercur, Nux vom., Pulsat., Staphysagria;  
 ved fuldkommen Tab af Smagen: Anacard., Bellad., Natr. mur., Silicea, Veratrum;  
 ved bruunt Lag paa Tungen: Carbo veg., Nux vom., Taraxac., Verbasc.;  
 ved guult Lag paa Tungen: Arnica, Bryonia, China, Colch., Nux vom., Veratrum;  
 ved grønagtigt Lag paa Tungen: Magnes. carb., Rhodod.;  
 ved hvidt Lag paa Tungen: Antimon. crud. og tart., Arsen, Calcareo, China, Mercur, Nux vom., Pulsatilla, Spigelia;  
 ved sortagtigt Lag paa Tungen: Arsen, China, Opium, Phosphor, Rh. tox.;  
 ved meget rød Tunge: Antim. tart., Arsen, Bellad., Rh. tox., Veratr.;  
 ved meget tør Tunge: Acon., Arsen., Bellad., Bryonia, Phosphor, Rh. tox.;  
 ved blaalig Tunge: Arsen, Colchicum, Acid. mur., Sabadilla;

- ved haard, ubøielig Tunge: Arsen, Mercur,  
Carbo veg., Colch., Conium, Natr mur.;
- ved meget fugtig Tunge: Aethusa, Antim. tart.,  
Bellad., Colchicum, Cuprum;
- ved for store Borter paa Tungen: Antim. tart.,  
Argent., Bellad., China, Crocus, Plumbum.

## 6. Tandpine.

Denne opstaaer ingeniunde alene fra hule, carisse Tænder, og selv da er vedvarende Helbredelse endnu mulig og sandsynlig, uden at den smertende, hule Tand behøver at træffes ud. Ogsaa lærer den daglige Erfaring, at Tænder i aareviis kunne være hule, og endelig falde ud, uden nogenfinde at have forarsaget Smerte, medens der kan opstaae en heftig Smerte i Tænder, som aldeles ikke ere hule. Derfor maa man være overordentlig forsigtig med at lade Tænder trække ud; saadant er kun ubetinget nødvendigt ved Tandfistler og hos Børn i visse Tilfælde i Tandskifteperioden, for nemlig at forebygge, at den nye Tand paa Grund af Hindringer ved dens Frembryden ikke kommer til at staa skjævt eller kommer til at staae ved Siden af den første Tand. Homöopathien har i næsten alle Tilfælde af Tandpine sikker og hurtigt virkende Lægemidler, og har derved netop forskaffet sig et stort Ry ved Helbredelsen af denne ligesaa hyppige som besværlige Sygdom. Men Tandsmærterne ere af højst mangfoldig og forskjellig Slags baade med Hensyn til selve Smærternes Forskjellighed og de samme ledsagende Omstændigheder saavel som sammes Oprindelse. De angrebne Dele

af Tænderne frembyde mange Forstjelligheder, og derfor er det ikke muligt at tage Hensyn til alle Tilfældigheder og Muligheder, hvorfor der her kun omtales de Lægemidler, som passe til de almindeligste Tilfælde og som formestest deres særdeles og allerede ved gjentagne Erfaringer beviste Lægekraft mod Tandpine tillade bestemte Angivelser. Det kommer ogsaa ved Valget af det homøopathiske Lægemiddel isærdeleshed an paa de specielle Symptomer, ofte paa Omstændigheder og Bisymp-tomer, som synes uvæsentlige, for at finde det rette Middel, og der udfordres ikke sjældent stor Flid og Skarpsindighed for at opdage det Middel, der passer i det enkelte Tilfælde og som har de karakteristiske Kjendetegn. Derfor skal der her først og fremmest gives bestemte Angivelser for Hovedmidlerne og sluttelig de Symptomer og Bestemmelser sammenstilles, som hyppigst pleie at være ledende ved Valget af Midlet. \*)

**Aconit:** ved overordentlig heftig Smerte, som bringer Patienten i den største Bevægelse, med Graad og Ryksten, især naar Smerten er bankende med Ryksten og Stød, Blodstigning til Hovedet, Hebe i Ansigtet, Rødme i Kinderne og Feber. Hos meget sensible, nervøse Personer kan under slige Omstændigheder Coffea være af endnu større Nytte.

**Arnica:** ved Smerter eller Svulst ifølge

---

\*) Det skal bemærkes, at i Leipzig næsten to Trediedele af Tandpinetilsælde er af den Slags, at Mercur passer for samme; deraf kommer det, at dette Middel der har et stort Renomé, og ofte anvendes stasjonært, bliver solgt i de homøopathiske Apotheker som almindeligt Pulver mod Tandpine.

en Tandoperation; fremdeles ved haard, rød Svulst af Kinden efterat Tandsmerterne ere hævede.

*Belladonna*: ved stikkende, rivende, trækkende, bankende Smerte i Tænderne, med rød, opsvulmet, let blødende Tandkjød, forværret ved Lægemsbevægelse, ved at tygge og spise, saavel om Aftenen som om Natten; ved Tørhed i Munden og Halsen med stærk Tørst, hedt, rød Ansigt, Banker i Hovedet og Rødme i Øinene.

*Chamomilla*: ved utaalelige Smerter i hele den ene Side, uden at nogen bestemt Tand er angreben, ved Hede og Rødme i den ene Kind, medens den anden er bleg; ved Forværrelse om Natten og i Sengenvarme, ved Nydelse af Varmt eller Kaffe, ved stor Virrelighed og Grædefærdighed, Angst, Uro og Svækkelse.

*Mercur*: ved Smerte i hule Tænder, naar denne strækker sig til Øret og Øiet i Forbindelse med smertefuldt, ophovnet, boldent Tandkjød og Svulst i Kinderne; ved Tilbøielighed til Dannelsen af Tandbylder; løse Tænder, Spytflod, en Fornemmelse som om Tænderne vare for lange, naar Smerten indfinder sig og bliver værre om Natten, især i Sengenvarmen eller ved Nydelsen af kolde eller varme Spiser og Drikke, ved Ophovnen af Halskjertlerne og Nattesved.

*Mezereum*: ved heftige, brændende, rykkende, rivende eller borende Smerter, især i hule Tænder, som strække sig ind i Kindbenene og i Tindingerne, især om Natten og om Aftenen, naar Tænderne hurtig blive hule og hurtig smuldre hen, ved Smaalærer paa Tandkjød og Tunge.

*Nux vomica*: ved Smerter, som om Tandene blev revet ud, ved enkelte heftige Stik, som ryste

hele Legemet, ved Indaanding af Luft, ved Smerte i en heel Side, som om Tænderne vare løse eller for lange, ved Forværrelse i Sengen, ved at tygge, ved at aabne Munden i kold, frisk Luft, ved kolde Drikke, efter Anstrengelse af Hovedet, ved Bedring i Varme, især hos Personer af livligt, ærgerligt Temperament, som drikke megen Kaffe og Viin, og som føre en stillesiddende Tilværelse.

Phosphor: ved Smerte især om Natten i liggende Stilling, ved bankende Smerte, stærkere i kold Luft, naar den berører Tandens, borende Smerte, forværret ved Koldt, Varmt og ved at tygge, i Forbindelse med Hudløshed og Svulst af Tandkjødet og tilsyneladende Løshed af Tænderne, overhovedet ved Symptomer paa Betændelse i Kjæbebenenes Beenhinde.

Pulsatilla: ved rivende, træffende, bankende, ryttende Smerter, som om Nerver spændtes og pludselig løsnedes, med Smerter i Øret og Hovedpine i den ene Side af Hovedet; ved Opstaaen eller Forværrelse af Smerterne om Aftenen og om Natten, ved Senge- eller Stuevarme, ved at spise og drikke Varmt; Bedring ved koldt Vand og sval, frisk Luft; Ansigtshlegthed, almindelig Kuldfærdighed, især hos blide, rolige, blodfattige Personer.

Staphysagria: ved Smerter i Tandkjødet og hule Tænder især i Rødderne; naar Tænderne blive sorte og smuldre hen, naar Tandkjødet bliver blegt, hvidt, hovent og boldent, let blødende, naar det løsner sig fra Tænderne eller faaer Knuder, Blærer og Udværter; ved Forværrelse af Smerterne ved at tygge, ved at spise og drikke Koldt, ved kold Luft.

*Spigelia*: ved trækkende, bankende Rykken, især i hule Tænder, umiddelbart efter at have spist, eller i Sengen om Natten, forværret ved koldt Vand eller kold Luft; med Kulde, Uro, Hjertebanken, Urin-trængen, Smerter i Diet, opsvulmet Ansigt og gulagtig Farve om Dinene.

*China*: ved Smerter, som opstaa om Natten, efter Spiisning, eller ved den letteste Berøring, eller som forværres i fri Luft og ved Trækwind, og som formilbes eller ophøre, naar Tænderne sluttet tæt sammen; ved Diegivning; ved Blodstigning til Hovedet med Opsvulmen af Bloaarerne i Panden og paa Hænderne.

*Antimonium crudum*: især ved Smerte i hule Tænder, rivende, gravende, robende Trækninger op i Hovedet, især om Aftenen i Sengen; naar Smerterne forværres efter enhver Spiisning og efter koldt Vand, men formindskes i fri Luft.

*Magnesia carbonica*: ved Smerter, der ere utaalelige om Natten, forværrede ved Kulde og ved Spiisning; med ophovnet Tandkjød og Ansigt; især ogsaa hos Frugtsommelige.

*Rhus toxicod.*: ved stødagtige, stærke Trækninger, som om Tandben blev revet ud; ved Bank og Riven i begge Rækker ind i Kjæbebenene og Lindingerne; ved en smertefuld Følelse som om Tænderne vare løse eller for lange, og som om Luften trængte ind i samme, med ophovnet Tandkjød; ved Forværrelse i fri Luft og om Natten; ved Bedring af udvortes Varme; ved Løsningen og ilde Lugt af hule Tænder.

*Silicea*: ved Smerter, som mere vise sig i Kjæbebenene end i Tænderne, med Svulst i Benet og Forværrelse om Natten.



Iffe sjældent indtræder med Tandpinen en Hævelse af den paagjældende Kind og Smerten taber da for det meste i Hestighed; Hævelsen taber sig efterhaanden, ofte uden at der anvendes Lægemidler. Men undertiden udvifler sig deraf en Betændelse i det Indre af det Tandkjød, som omgiver den syge Tand (saakaldet Tandbyld, Parulis). Denne Betændelse trækker til, aabner sig, efterat den har foranlediget heftige, meest trykkende og bankende Smertes, i Løbet af 2—5 Dage, og afsondrer en meget ilbelugtende Materie, hvorefter Smerten strax ophører og den lille Absces som oftest meget hurtig læges. Imod den heftige Smerte og for at fremskynde Modningen af denne Byld er næsten altid Mercur det bedste Middel i Forening med varme Grødomslag og Gurglen med varm Mælk. Naar Smerten er meget stærk, og naar Materien sidder dybt i Kjødet, saa er det ogsaa tilraadeligt, at aabne Bylden med en Kniv. Iffe sjældent indfinder disse Tandbylder sig paany ved den mindste Forkjølelse, naar samme, som det som oftest er Tilfældet, forarsages af en beskadiget Tand. I saa Tilfælde skal man anvende Silicea; men ofte er der intet andet at gjøre end at borttage den beskadigede Tand.

Er det beskadigede Sted paa Tanden dybt nede ved Roden, saa kan der ogsaa danne sig en saakaldt Tandfistel med vedblivende Boldsfab. Naar dette er ved en af Tænderne forneden i Munden, saa gaaer Materien, naar den intet Afløb finder, nedad og gjennembryder det nedre Kjæbeben paa et eller andet Sted. I saa Fald maa Tanden bortfjernes saa snart som muligt. Danner Fistlen sig ved en af Tænderne foroven i Munden, saa baner

Materien sig efter Tynghdens Love steds sit Afsløb, og forarsager saaledes ikke saa væsentlige Forstyrrelser; dette kan vedvare i aarevis, uden at læges. Især hos scrophuløse og svækkede Personer kunne slige Tandfistler optræde meget ondartede, og kunne da foranledige en Affektion af Beensubstantien (Ophovnen og Beenedder). Aurum, Calcareæ, Hep. sulph., Jod. Mercur, Phosphor og Silicea ere de vigtigste Midler mod slige Tandfistler, dog er det ikke tilraadeligt at foretage nogen Behandling uden Tandlægens Mellemkomst, som i de fleste Tilfælde vil være nødsaget til at bortfjerne den Tand, som giver Anledning til Sygdommen.

Ved ophovnet og smertefuldt Tandfjød: Belladonna, Magnes., Mercur, Nux vom., Pulsat., Rhus tox., Staphys., Hyoscyamus.

Ved Svulst i Kinden: Bellad., Mercur, Pulsat., Nux vom., Chamomilla, Arnica, Staphys., Bryon, Arsen.

Naar Tænderne ere løse: Mercur, Bryon., Nux vom., Arsen, Rhus, Hyoscyam.

Naar Tænderne synes for lange: Acid. nitri, Alum., Arn., Bellad., Berb., Bryon., Chamom., Hyoscyam., Rhus, Sepia, Sulph.

Naar Tænderne synes stumpe: Ac. nitr., Ac. phosph., Berb., Merc., Nux vom., Puls., Staph., Sulph.

Ved Smerter i hule Tænder: Antimon. crudum, China, Magnes., Mercur, Mezer., Puls., Staph., Nux vom., Cham., Coff., Sil., Sulph., Calcar. carb.

- Ved Smerter i en heel Tandkræfte: Cham.,  
 Merc., Rhus tox., Staph., Bellad., Puls.,  
 Nux vom.
- Ved Smerter til ind i Øinene: Chamom., Clem.,  
 Pulsat., Spig., Calc. c.
- Ved Smerter ud i Ansigtet: Merc., Mezer., Nux  
 vom., Rhus tox., Hyosc., Sulph., Bryon., Sil.
- Ved Smerter ud i Ørene: Merc., Puls., Cham.,  
 Bryon., Rhus, Sulph., Ars.
- Ved Smerter op i Hovedet: Cham., Mercur.,  
 Nux vom., Hyosc., Staph., Bellad., Rhus  
 tox., Ant. crud.
- Ved Smerter som Følge af Gjennemblødning:  
 Rhus tox., Nux mosch., Rhod., Borax,  
 Natr. c.
- Ved Blodstigning til Hovedet: Acon., Bell., China,  
 Puls., Hyosc., Calc. carb., Bry., Stram.
- Ved Spytflod: Merc., Cham., Bellad., Rhus  
 tox., Sep.
- Ved Fornærrelse tidlig om Morgen: Bry., Nux  
 vom., Chi., Hyosc., Staph., Ignat.
- Ved Fornærrelse om Aftenen: Bellad., Merc.,  
 Puls., Ant. crud., Rhus tox., Sulph.
- Ved Fornærrelse om Natten: Bellad., Coff., Mag-  
 nes., Merc., Mezer., Puls., Cham., Bryon.,  
 Rh. tox., Sil., Sulph., Staph.
- Ved Fornærrelse i Sengenarmen: Cham., Merc.,  
 Puls., Spig., Phosph., Magn. carb.
- Ved Fornærrelse i Barme overhovedet: Cham.,  
 Hep. sulph., Puls., Magn. carb., Rhod.
- Ved Fornærrelse i kold Luft: Bellad., Calc. car-  
 bon., Chi., Hyosc., Merc., Nitr., Nux vom.,  
 Sep., Sil., Staph., Sulph.
- Ved Fornærrelse i Lufttræf: Ant. crud., Bellad.,

- Bryon., Chi., Hyosc., Merc., Nux vom., Puls., Sep., Sil., Spig., Staph., Sulph.
- Bed Forværrelse ved at driffe Rødt: Bryon., Chamom., Magnes., Merc., Nux vom., Rh. tox., Sil., Spig.
- Bed Forværrelse ved at nyde Barmt: Bryon., Calc. c., Chamom., Merc., Puls., Sil., Sulph., Rhod.
- Bed Forværrelse ved overhovedet at nyde Noget: Bell., Bryon., Caust., Cham., Magnes., Merc., Nux vom., Puls., Sep., Sil., Posph., Magnes. c. og m.
- Bed Forværrelse ved at tøgne og ved at bide: Cham., Coff., Bellad., Merc., Bry., Nux vom., Puls., Hyosc., Rh. tox., Hep., Chi., Sulph.
- Bed Forværrelse ved aandelige Arbejder: Bellad., Nux vom., Ignatia.
- Bed Forværrelse ved Nydelse af Kaffe og Vin: Bell., Cham., Ignat., Merc., Nux vom.
- Bed Forværrelse ved Benægelse: Bellad., Bry., Chi., Nux vom., Spig., Phosph.
- Bed Forværrelse ved at sidde og ligge: Ign., Puls., Rh. toxicod.
- Bed Forværrelse ved Tobaksrøgning: Bry., Chi., Ign., Spig., Sab., Clem.
- Bed Forværrelse ved at stange Tænderne: Puls.
- Bed Forværrelse ved Berøring: Bellad., Bry., Merc., Arn., Ign., Chi., Staph., Ars.
- Bed Forværrelse ved at sugge paa Tænderne: Ammon., Bellad., Carb. veg., Nux mosch. og vom., Zinc., Nitr. ac., Kali c.
- Bed Bedring i kold Luft: Puls., Sep., Bryon., Sabad.

- Bed Bedring ved at driffe Koldt: Bry., Clem., Puls., Bellad.
- Bed Bedring i Varme: Nux vom., Rh. tox., Mercur, Ars., Sulph., Kali c., Nux mosch.
- Bed Bedring ved at driffe eller spise Varmt: Lyc., Nux mosch., Magn. mur., Rhus tox., Phosph., Nitr. acid., Sil., Sulph.
- Bed Bedring ved at spise: Rhod., Cham., Sil., Ambr., Ammon. c.
- Bed Bedring ved at tygge: Coff., Chi., Ars., Senegal, Bryon.
- Bed Bedring ved Tryk: Bellad. Chi., Puls., Rh. tox., Mercur.
- Bed Bedring ved at stifte Tænderne til Blods: Bell., Sassap., Ammon.
- Bed Bedring ved at ligge ned: Bry., Ign., Merc., Nux vom., Spig.
- Bed Bedring ved at gaae: Puls., Rh. tox., Nux vom., Bov., Hep., Stann.
- Bed Bedring i Ro: Bry., Ars., Spig., Staph.
- Bed Bedring ved at sidde op i Sengen: Mercur, Natr. c., Spig.
- Bed Bedring i Sengenvarme: Ammon., Bry., Lyc., Nux vom.
- Bed Bedring ved Tobaksrygning: Borax, Mercur, Natr. c., Spig.
- Bed Bedring i Stuen: Nux vom., Phosph., Staph.
- Bed Bedring ved at børste Tænderne: Phosph., Sep.
- Bed Bedring ved at sove: Nux vom., Puls.
- Mod Tandpine paa den Tid, da Reglerne indtræde, er især at anbefale: Cham., Calc. c., Carb. veg., Phosph., Puls., Sep.;

Under Svangerskabet: Bell., Nux vom., Puls.,  
Magn. c., Hyosc., Rhus tox., Staph.;

Under Diegivning: Chi., Calc. c., Merc., Nux.  
vom., Sep., Sulph., Acon., Bell., Ars.

Det er naturlignvis overordentligt vigtigt, at Tænderne for at vedligeholde samme og for at forhindre Tandpine, omhyggeligt pleies og holdes rene, uagtet det desværre er sikkert, at samme ved visse Sygdomme, især ved Mave- og Fordøielseslidelser, altfor tidligt fordærves. Hovedsagen er, saa hurtig som muligt at befri Tænderne fra de Rester, som blive tilbage efter Spiisningen; dette opnaaer man bedst derved, at man allerede vænner Børnene til, foruden den regelmæssige Børsten hver Morgen eller hellere hver Aften, at udfylle Munden med lunkent Vand efter hvert Maaltid. Selve Børstningen finder bedst Sted med en blød Børste eller med et grovt Linnedstykke, hvorved man istedetfor Tandpulver og Tandpasta bruger fortyndet Viinaand og kun fra Tid til anden Pulver og Pasta. Ligesaa vigtigt er det imidlertid, at man aldrig nyder for skarpe, for hede eller for kolde Spiser eller Drikke, og især ikke nyder samme hurtig efter hverandre. Ogsaa kan hyppig Nydelse af Sukker og Rager under visse Omstændigheder virke skadeligt. Ligeledes maa Stiften i Tænderne med skarpe eller Metalinstrumenter aldeles undgaaes. En eller flere Gange om Aaret bør ethvert Barns Tænder ogsaa undersøges af en dygtig Tandlæge, som rigtignok maa unblabe den som oftest ganske overflødige Filen og Bryden, men derimod som oftest vil have nyt at gjøre med at fjerne den sig samlende Biinsten og udbedre andre Smaastader.

## § 6.

**Sygdomme i Halsen.****1. Halsbetændelse (Inflammation af Mandlerne).**

Denne bestaaer i Ophoven af forskjellige Dele af den bløde Gane, især af Mandlerne (Tonsillerne) og Drørlen, med heftige Smærter og Besvær med at synke. Det er derfor nødvendigt, naar Synkningen volder Smerte i Halsen, at undersøge Halsen og Ganen, idet man maa aabne Munden stærkt og trykke Tungen ned med Hæftet af en Stæe. Som oftest er ifkun den ene Side angrebet, dog forekommer der ogsaa Tilfælde, hvori begge Mandlerne ere betydeligt ophorne. Hovedpiemet ved Behandlingen er at fordele Betændelsen og at forhindre Boldning (Abscessdannelse); er imidlertid denne allerede begyndt, saa er Opgaven den, at fremskynde den og hurtigst muligt at bringe den til at aabne sig.

Er Rødmen og Svulsten kun ubetydelig og Smerten mere en ubehagelig Fornemmelse, som om Roget sad fast i Halsen, hvad man gjerne vilde bortfjerne ved at rømme sig, i Forbindelse med Tørhed og med en ringe Hævelse af Kjertlerne i Underkæben, saa er Chamomilla tilstrækkeligt til at hæve Ondet.

Er derimod Rødmen, Svulsten og Smerten heftig og Synkningen vanskelig, med en Slags Sammensnøren af Halsen ved at drikke, er der Svulst i Halsen, Hæde, Tørhed og en stadig Trang til at

synke tilstebe, saa maa man strax anvende *Belladonna* i gjentagne Indgioter. \*)

Ved stærkt Spytsamling i Munden, som ogsaa sager til ofte at spytte ud, stor Vanskelighed ved at synke og heftige Smerter, som strækker sig op i Øret, i Forbindelse med ubehagelig Smag i Munden, ved stærkt Ophoven af Mandlerne, som endogsaa udstrækker sig til den bagerste Deel af Tungen og Tandkjødet, er *Mercur* det Midde, som hjælper bedst. Overhovedet er dette Midde at anvende, naar der viser sig Boldslib, og Svulsten bliver ujevn og knudret og af lysrød, gulagtig Farve, ogsaa i Tilfælde af, at der allerede er fremkommet Materie, og hvor der har dannet sig Bylder og vædskende Steder.

*Lachesis* frembringer undertiden hurtig Lettelse, hvor *Mercur* synes at passe, især naar Gummien og Drølen er stærkt ophovnet, hvor Trangen til at synke er meget stærk, hvor der er meget Snyt i Munden og Slim i Halsen, hvor der med at briske følger en Fornemmelse af Krampe i Halsen, hvor der indtræder Forværrelse efter at have sovet, efter den mindste Berørelse og efter det mindste Tryk, i Forbindelse med Stakaandethed og Sammensnøring.

*Nux vomica* passer ved Betændelse i mindre Grad, hvor Svulsten ikke er af Betydenhed, ved Fornemmelse af Kløe og Gubløshed ved at synke og at indaande frisk Luft, ved en Fornemmelse af en Svulst, som om Svælget var forsnævret,

---

\*) I den næste Tid anbefale engelske Homöopathen *Baryta carb.* mod acut Mandelbetændelse. Jeg har helbredet to Tilfælde meget hurtigt hermed. Dr. S.



eller der sad en Pløt i Halsen, en Pirren til at hoste og Forstoppelse.

I Tilfælde, hvor der er heftig Feber og stor almindelig Uro tilstede, er det nyttigt først at anvende nogle Indgivter Aconit.

Indskrænket Betændelsen sig saagodtsom udelukkende til Drølen, saa hjælper en gjentagen Gurglen med Sublimatopløsning ( $\frac{1}{4}$  Gram af 1 Decimal-Rivning i 4 Spisestefulde Vand) næsten siebliffelig.

Tilbøjelighed til at faae denne Sygdom igjen efter Forskjølelse hæves bedst ved en sjelden Indgiwt af Hepar. sulph. eller Baryta carb., saameget mere naar Mandlerne ere forblevne ophovnede og haarde.

Med Hensyn til Diphtheritis see under Børnesygdomme.

## 2. Krop (Svulst af Luftrørskjertlen).

Denne er en Ophovnen og Forstørrelse af den ved Strubehovedet liggende Skjoldkjertel, en Lidelse, som hos os ikkun fremkommer enkeltvis og da isærdeleshed hos scrophuløse Individer, men som i nogle Bjergegne f. Ex. i „Salzkammergut“, i nogle Dele af Schweiz og Piemont optræder endemisk, ofte antager frygtelig Styrke og sædvanlig er forbunden med Cretinismus. Den hos os forekommende Krop er sjelden ledsaget af betydelige Forstyrrelser med Undtagelse af at den ved Tryk paa Strubehovedet og Luftrøret vanskeliggjør Andedrættet, naar den bliver stor, og endogsaa kan give Anledning til asthmatiske Tilfælde. Som oftest fordrer man den bortffjernet hovedsagelig kun fordi den vanslyner.

Hovedmidlerne til dens Helbredelse ere Spongia og Jod; især frembringer den i nogen Tid

fortsatte Anvendelse af Spongia i mange Tilfælde Hævelsens Formindskelse og vedblivende Forsvinden; ved meget betydelige Kroptilfælde er det ogsaa hensigtsmæssigt, tillige at anvende et af disse Midler udvendigt, omtrent 5—10 Draaber af den rene Tinctur blandet med 4 Gram Fedt, og hver Aften at indgnide Svulsten med et Quantum saa stort som en Art.

Derfor betydelige Aandedrætsbesværligheder ere tilfælde, især Kortaandedhed, Hæshed, Kildren i Strubehovedet, Katarrh, saa frembringer efter nogle Indgioter Hepar sulphuris betydelig Bedring. I enkelte meget haardnakkede Tilfælde ville undertiden ogsaa Brom, Calcareo og Siliceo være at anbefale.

Stærke og fortsatte Indgioter af Iod og Iod-Ialium maae strengt undgaaes, da de ved indvendig Brug ikke sjældent medføre flemme og selv farlige Følger; navnlig maa Alle, som lide paa Lungerne, vogte sig for uforsigtig Brug af dette Middel, saa meget mere, som Tuberculosen i Lungerne ikke sjældent synes at indskrænke sig til Dannelsen af en Krop, men ved sammes Fordrivelse synes at blive særdeles heftig.

### 3. Hoste (acut og chronisk Katarrh).

Denne er ofte kun et Symptom paa forskellige acute og chroniske Sygdomme i Lungerne og Luftrørgrenene; dog kan her nærmest kun være Tale om den Slags Hoste, der optræder som en simpel Katarrh, oftest i Forbindelse med Snue, som selvstændigt Sygdomstilfælde, meest ifølge Forkjølelse og især i Løbet af Foraaret og Efteraaret.

De almindelige Lægemidler imod denne i og for sig ikke betydelige Sygdom, som imidlertid ved Efterladenhed let kan faae de værste Følger, ere følgende:

Indtræder Katarrhen med Kuldefornemmelser og Tegn paa Feber, med Smerter i Hals og Hoved, især hos Børn, saa er det altid hensigtsmæssigt, først at give nogle Indgiuter Aconit; ellers er *Nux vomica* sædvanlig det meest passende Midbel i Begyndelsen, især naar Hosten er tør og opstaaer som Følge af en raa, kradsende Fornemmelse i Halsen eller Krillen i Gummerne, naar den angriber stærkt, som om Hovedet og Maven skulde springe, og er værst tidlig om Morgen.

*Chamomilla* passer ved lignende tør Hoste, som forværres om Natten, som opstaaer endogsaa i Søvne, ved en Krillen i Halsen og som forværres ved at tale.

*Belladonna* mod tør, krampagtig, gjænde Hoste, som ryster hele Legemet, med vedvarende Krillen i Luftrøret, Smerte i Gummerne ved at synke, en Fornemmelse, som om Hovedet sprængtes, rødt Ansigt, Tørst og besværet Mandedræt.

*Bryonia* mod tør Hoste, som opstaaer af Krillen i Halsen, især efter at have spist, som forøges indtil Brækningsbeflemmelse og ved at komme ind i en varm Stue, med Sting i Siden; eller ogsaa tør Hoste med guulagtigt Opspyt og Smerter i Hoved, Hals og Bryst ved ethvert Hosteanfald.

*Ipecacuanha* isærdeleshed hos Børn imod Righoste, i Forbindelse med at Ansigtet bliver rødt og blaat, og Mandeløshed eller Brækningsbesværligheder og stærk Opkastning af Slim; ogsaa mod

ganste tør Krillehøste med Vanden i Hovedet og i Hjertefulen og Trang til Vandladning.

*Tartarus emeticus* ved Høste med Sliimrallen, Hudløshed i Halsen og Brystet og Andedråtsbesvær før Høsten, som bedres efter at have spyttet Sliim.

*Hyoscyamus*, Hovedmidlet mod tør Høste, som bliver værre om Natten og i liggende Stilling og som standser naar man sidder op, med Krillen i Luftrøret.

*Mercur* ved rystende Høste, især om Natten og om Aftenen forinden man falder i Søvn, undertiden med Næseblod, flydende Snue, Hæshed, Rallen i Brystet, en sprængende Følelse i Hovedet eller Diarrhoe, med Tilbøjelighed til Svøb uden Lættelse.

*Pulsatilla* mod Høste med Dypspytning af megen hvibligguul Sliim, som kommer let op, men som er af bitter, modbydelig Lugt, med kvælende og frabsende Fornemmelse i Halsen, som især er slem om Aftenen i Sengen.

*Euphrasia* mod Høste med stærk Snue, som angriber Næsen, om Dagen med besværlig Dypspytning; Høsten gaaer over om Natten, men forværres om Morgenens med stærkt Dypspyt.

Enhver langvarig og ved mindste Fortjællelse tilbagevendende Høste (chronisk Katarrh) er næsten altid forarsaget ved en som oftest organisk Sygdom i et Brystorgan; i de fleste Tilfælde forarsages den af Tuberculose eller Emphysem i Lungerne. Den er da paa Grund af Hovedondets Uhelbredelighed ikke til at helbrede radicalt; imidlertid virke dog endogsaa i slige fortviede Tilfælde de passende homøopathiske Lægemidler endnu meget

gunstig paa Hostens Formildelse og momentane Helbredelse. Rigtignok maa man i saadanne Tilfælde stedsse nøie kjende Lungelidelsen og omhyggelig tage Hensyn til samme ved Valget af Midlet, og kun Lægen vil derfor være istand til at gennemføre en hensigtsmæssig Behandling. Derfor kunne her kun gives nogle almindelige og særdeles firkte Bestemmelser og Hentydninger.

Sulphur passer mod Hæshed med ureen, svag Stemme, Ophobning af Sliim i Luftrørgrenene, Følelse af Hudløshed i Brystet, Forværelse i kold og fugtig Luft, ved anstrængende Hoste med Opspyt af tyk, hvidlig eller guulagtig Sliim om Dagen, tør Hoste og Aandedrætsbesvær om Natten; isærbeleshed hos scrophuløse og tuberculøse Personer med Anlæg til Svindsot.

Phosphor mod lignende Disposition med stærk Hoste, Omfindtlighed og Stikken i Strubehovedet, Hæshed, Kortaandethed, Blodstigning til Brystet og Hovedet, forstærket Trang til at hoste ved at tale, lee og bevæge sig i det Frie.

Kali carbonicum mod Hæshed og en Fornemmelse i Halsen, som om der sad Noget fast i samme, tør, krillende og qvælende Hoste, især om Natten og om Morgenens med Opspyt, som vanskeligt løser sig og hvorefter man føler sig stærkt udmattet, eller med Hoste med meget materieagtigt Opspyt, med Aandedrætsbesvær og Brystmerter.

Calcareo mod tør, heftig Krillehoste, som om der var Støv i Brystet, især om Aftenen i Sengen og om Natten i Søvne, eller mod Opspytning af tyk, guulagtig og stinkende Sliim med Råhlen, Ræthed, Afmagring og tynd Nabning.

Stannum mod rigeligt, grønt eller guul-

agtigt Opspyt af sødagtig eller saltagtig Smag, især tidlig om Morgen og om Aftenen i Sengen.

Acidum phosphoricum mod Høste, som tidlig om Morgen foranleider Opspytning af en guulagtig eller materieagtig Sliim med urteagtig Smag og Lugt; Høsten om Dagen for det meste tør, Tilbøielighed til Sved og Diarrhoe.

Carbo vegetabilis mod haardnakket Hæshed og grov Stemme, især Morgen og Aften, mod krampagtig Høste, som forværres ved at tale og i slet Veir, eller ogsaa mod Høste med grønagtigt, modbydeligt Opspyt og Krillen og Brænden i Strubehovedet.

Arsenic ved tør, anstrængende Høste, som især er slem om Aftenen, efter at man har lagt sig, eller i Løbet af Natten, ved at drikke, saavel som i kold Luft, i Forbindelse med Trangbrysthed, Kvælningssanfald ved at ligge ned, som derfor nødsager til at sidde i opret Stilling eller til at ligge høit, i Forbindelse med betydelig Mathed og Svækkelse.

Foruden disse ere ogsaa ofte de mod den acute, simple Høste omtalte Midler hensigtsvarende, især Bryonia, Mercur og Tartarus emeticus.

3 Almindelighed ere ved Behandling af Høste endnu følgende Angivelser at fremhæve:

Mod tør Høste paafe isærbeleashed: Aconit, Bellad., Hyosc., Ipecac., Kali carb., Nux vom., Phosph., Spongia.

Mod krampagtig Høste: Bellad., Cupr., Drosera, Hyosc., Ipecac.

- Mod Høste med Dpfæstning: Bryon., Ferr., Ipecac., Puls., Tart. emet., Veratrum.
- Mod Iøð Høste: Arsen., Bry., Calcar., Phosph., Puls., Stann., Tart. emet., Ac. phosph.
- Mod Høste med flimet Dpsspytning: Ars., Bry., Calc., Phosph., Puls., Stann., Tart. emet.
- Mod Høste med blodig Dpsspytning: Acon., Arn., Bryon., Ferr., Nitr. acid., Phosph., Sulph.
- Mod Høste med materieagtig Dpsspytning: Calc., Carb. veg., China, Kali c., Phosph., Sulph., Ars., Phosph. ac.
- Mod Høste med ilbelugtenbe Dpsspytning: Calc., Carb. veg., Posph. ac., Stann., Arsen.
- Mod Høste med vandagtig Dpsspytning: Cham., China, Ferr., Merc., Stann., Sulph.
- Mod Høste med seig Dpsspytning: Ars., Bellad., Carb. veg., Jod., Merc., Senega.
- Mod Høste med grønagtig Dpsspytning: Ars., Carb. veg., Lyc., Puls., Stannum.
- Mod Høste med graa Dpsspytning: Ars., Lyc., Nux vom., Sep.
- Mod Høste med saltagtig Dpsspytning: Ars., Lyc., Natr. carb., Phosph., Pulsat., Sep., Stannum.
- Mod Høste med bitter Dpsspytning: Ars., Nux vom., Puls.
- Mod Høste med sødlig Dpsspytning: Calc. carb., Phosph., Stann.
- Mod Høste med raadden, mobbydelig Dpsspytning: Ars., Carb. veg., Merc., Phosph., Puls., Stann., Sulph.
- Mod Høste med suur Dpsspytning: Calc. carb., Nux vom., Phosph.

Mod Hoste om Aftenen: Arsen., Calc. carb., Drosera, Hep., Merc., Puls., Stannum.

Mod Hoste om Natten: Acon., Ars., Bellad., Calc. carb., Cham., Hyosc., Kali carb., Merc., Nux vom., Pulsatilla, Spong.

Mod Hoste tidlig om Morgen: Ars., Bry., China, Jod, Nux vom., Puls., Stann., Sulph.

Mod Hoste, som opstaaer ved Bevægelse: Ars., Bry., Drosera, Ferr., Nux vom., Phosph., Stann.

Mod Hoste, som opstaaer ved at tale: China, Nux vom., Phosph., Stann.

Mod Hoste, som opstaaer i det Frie: Ars., Phosph., Sulph., Sulph. ac.

Mod Hoste, som opstaaer ved at spise: Ars., Bry., Calc. carb., China, Hep., Nux vom., Puls., Sulph.

Mod Hoste, som opstaaer ved at ligge: Arsen., Hyosc., Puls., Sulph.

Mod gjænde Hoste: Bellad., Drosera, Hep., Jod, Spong.

Mod tvælende Hoste: Arsen., Cupr., Ipecac., Opium, Tart. emetr., Veratr.

Mod Krillehoste: Acon., Ars., Calc. carb., Cham., Jod., Ipecac., Nux vom., Phosph.

Mod hæs Hoste: Acon., Carb. veg., Hep., Merc., Spong.

Mod pibende Hoste: China, Drosera, Hep., Spong.

Mod skrigen Hoste: Acon., Ars., Merc., Nux vom., Sulph.



## 4. Katarrhalsk Feber (La Grippe).

Man betegner ved dette Navn en epidemisk optrædende acut Katarrh i Luftveiene (Katarrhalseber), som sædvanligt viser sig om Vinteren og Foraaret, som ofte udbreder sig over hele Provindser, ja over et heelt Land, er forbunden med en uforholdsmæssig Grad af almindelig Svækkelse og Pirrelighed af Nervesystemet, og som tillige ved Efterladenhed i Behandlingen eller ved uhenftgsmæssig Behandling efterlader Anlæg til Lungetuberculose eller Udtæring. Hovedmidlerne ere i Almindelighed: Mercur, Caust., Jod, Acon., Belladonna, Nux vomica, Phosphor. Med Hensyn til de enkelte Symptomer maae man see efter, hvad der er sagt om Behandling af Hoste.

## 5. Hæshed og Stemmemangel.

Den Hæshed, som indtræder under en almindelig Snue eller Hoste, hæves bedst og hurtigst ved Mercur, Chamomilla, Pulsatilla eller Nux vomica. Mercur passer især mod hæd, ureen Stemme med Brænden og Krillen i Strubehovedet, med Tilbøielighed til Sved, uden at den derved forbedres, medens ethvert koldt Lufttræk frembringer Forværrelse. Chamomilla ved Hæshed med Snue og seig Sliim i Halsen, Tørhed, Brænden og Tørst, med krillende Pirring til Hoste, Kulbegysninger om Aftenen, fortrædelig, stille Sindsstemning. Nux vomica mod raa, dyb, tør Hoste, med Tørhed, Spænden og Smerte i Halsen, Kulde og Varme, vranten, trættefjær Sindsstemning. Pulsatilla ved Stiften og Hudløshed i Halsen,

Smerte ved at synke, Snue og Hoste med megen gul eller grøn Sliim, Kuldefornemmelser uden Tørst. I Tilfælde, hvor der er stor Ømfindtlighed tilstede i Forbindelse med Feberuro, er det rigtigst, først at anvende nogle Indgiver Aconit.

Vigtigere og vanskeligere er Behandlingen af kronisk Hæshed og Stemmemangel, fordi denne næsten altid hidrører fra eller vedligeholdes af betænkelige Sygdomstilstande i Lungerne og Luftrørsforgreningerne; overhovedet kan man antage, at enhver Hæshed, som varer over 14 Dage, er et betydeligere og dybere liggende Sygdomstilfælde, som fortjener saavel Patientens som Lægens omhyggelige Opmærksomhed. Herved ere Jod, Mangan, Mercur, Hep. sulph., Phosphor, Spongia, Sulphur, Carbo veg., Causticum og Brom Hovedmidlerne. Er der desuden tydelige Tegn paa en Betændelse i Strubehovedets Sliimhinde saa maa disse først hæves ved Anvendelse af Aconit, Bellad., Phosphor, Hepar; ere derefter Smerterne mildere, men samler der sig megen Sliim, og er Stemmen vedvarende belagt, saa er Mangan det bedste Middel, men vare de heftige Smerter ved, bruges Jod. Sigelebes er ogsaa ved langvarig Hæshed efter La grippe, hvor Sygdommen er blevet skjodesløst behandlet eller mange Slags Midler ere blevne anvendte uden Held, Jod eller Spongia næsten altid af god Virkning. Den Hæshed, som ikke sjelden bliver tilstede efter Ræslinger eller Strubehoste, hæves bedst ved Phosphor, især hos svagelige Personer og pirrelige Kvinder.

Ved langvarig Hæshed i Forbindelse med stærk Disposition til Sved og stærk Spytaffondring, hos scrophuløse eller syphilitiske Personer passer

Mercur bedst. Sulphur og Hepar sulph. anbefales mod stor Ømfindtlighed for kold Luft, stærk tør Hoste med Sliimrallen, kvælende Fornemmelse eller Opkastning af Sliim, ængstelig, pibende Nandedræt, især efter Misbrug af Mercur. Causticum maa anvendes imod vedvarende Disposition til Hæshed, som undertiden udarter til fuldstændig Stemmemangel; Fornemmelse som om der sad Noget i Halsen, der skulde kastes op, med tør Hoste, Rrillen og Hudløshed i Halsen og i Brystet, stor Disposition til Forkjølelse. Carbo veget. mod langvarig Hæshed, som bliver værre om Aftenen og om Morgen, saavelsom ved at tale, med tør, skurrende Hoste, Rradsen og Ømhed i Halsen og i Brystet, eller mod hvidfarvet, materieagtig Opspytning. \*) Brom mod stadig Hæshed med Brænden og Røhed i Halsen, en Fornemmelse af Sammentrækning eller Kulde i Luftrøret og megen Ømfindtlighed mod kold Luft.

## 6. Blodspytning, Blodhoste.

Herved forstaaer man den Opspytning af Blod eller blodig Sliim fra Lungerne, som fremkommer ved Hoste eller Rømning. Dette er ligeledes kun et Symptom eller Følgen af en anden Sygdom, og næsten altid af en organisk Lungesygdom, navnlig af en Lungetuberculose, hvorfor det til dens radicale Helbredelse er uundgaaeligt nødvendigt at komme til fuldkommen Erkjendelse af og tage det nødvendige Hensyn til dens Oprindelse. Dgsaa maa herved nøie lægges Mærke til, om det opspyttede Blod virkelig kommer frem i Munden

\*) Bedst i 6te eller 12te Fortyndning.

Dr. S.

som Følge af Hosten eller Næmninger, og at samme ikke trænger frem fra Tandkjødet, eller endogsaar ved Opkastning kommer fra Maven.

Med Hensyn til den blodige Opspytning, som hyppig fremkommer ved Lungebetændelser, maa man see efter, hvad der er sagt med Hensyn til Behandlingen af denne Sygdom.

I de fleste Tilfælde forekommer Blodspytning hos Personer, som lide meget af Hoste, og forarsages da, som sagt, oftest af Tuberkler paa Lungen. De sædvanlige Lægemidler herimod ere Arnica, Belladonna, China, Ferrum, Nitri acidum, Phosphor og Pulsatilla.

Arnica anvendes mod Opspytning af reent Blod, isærdeleshed som Følge af legemlig Anstrengeelse eller af en mekanisk Bestandigelse, med besværligt Aandedræt, Stiften og Ømhed i Ribbenene ved at hoste og ved Bevægelse, Kraftløshed og Besvimelse.

Belladonna mod heftig, krillende og krampagtig Hoste, stærk Blodstigning til Hovedet og Brystet, Hjertebanken, Hovedpine, Ansigtserødme, Tørst, Tørhed, isærdeleshed ogsaa som Følge af undertrykt Maanedss- eller Hæmorrhoidal-Flod.

China mod Blodspytning med heftig Hoste og Kulbegysninger afvejlende med Hæde, stor Svækkelse, gjentagende Svøb, Nysten, Glimren for Vinene; især efter stærke Blodtab med Besvimelser, Blegthed og Kulde, Træksninger i Hænderne og Ansigtsmuslerne.

Ferrum mod let Opspytning af reent, lyserødt Blod, med ubetydelig Hoste, Smerte mellem Skulderbladene, Kortaandethed især om Natten og i Ro; stor Spagthed, hos magre Personer med bleg, guulagtig Hudfarve og efter betydeligt Blodtab.

**Nitri acidum** mod Opspytning af sort, sammenløbet Blod, ved tør, anstrængende Hoste især om Natten, Trangbrystethed, Blodstigning til Brystet og Hjertebanken.

**Phosphor** mod gammel, tør Hoste med Stiften i Halsen og saaret Fornemmelse i Brystet, med hebe Opstigninger til Halsen, Hjertebanken; ogsaa mod seigt, grønagtigt Opspyt af Slim med Blod, heftige, stikkende Smerter i Siderne, især ved Bevægelse og Hoste.

**Pulsatilla** mod rigeligt Opspyt af sort, sammenløbet Blod i Forbindelse med Angst og Gysninger, stor Svaghed, især hos flegmatiske, godmodige Personer og efter Undertrykkelse af Maanedsfloppet.

Ved meget betydelige Blodtab, saakaldte Blodstyrtninger, hvorved tør befrygtes øieblikkelig Fare for Forblødning eller Kvælning, er det hensigtsmæssigt først at give en Indgiwt Aconit og hurtigt derefter nogle Indgiwter Ipecacuanha.

Indfinder Blodhoste sig i Følge et Fald eller mechanisk Beskadigelse, medens Lungen og hele Legemet igrigt er sundt, saa maa Arnica foretrækkes for alle andre Midler. \*)

## § 7.

### Brystsygdomme.

#### 1. Lungebetændelse.

Den begynder hyppig med en stærk Kulde, som hurtigt afløses af Hede; trykkende og stikkende

\*) I den nyere Tid ere Hamamelis og Millefolium anbefalede.  
Dr. S.

Smertter især ved Andebræt og Hoste, snart i hele Brystet, snart kun paa den ene Side, besværligt, hurtigt Andebræt, Hoste, som i Begyndelsen for det meste er tør, senere i Forbindelse med slimet, rustfarvet eller blodigt Opspyt, hurtig, stærk Puls, Svimmelhed eller Hovedpine, Tørst, rød Urin, Trang til Rygleie og megen Mæthed, ere som oftest de Symptomer, som karakterisere den. Dog er det en Kjendsgjerning, at alle disse Symptomer ved mange Lungebetændelser kunne forefindes i meget ringe Grad, og endog saa ganske kunne mangle, og at derfor kun en Undersøgelse af Brystet (Percussion og Auscultation) kan give en sikker Diagnose. (Sikre Tegn paa en begyndende Lungebetændelse ere derefter: ringe Bevægelse af Brystkassen over det betændte Sted, en kort, dæmpet og trommeagtig Bankelyd og skjærpet, vesiculært Andebræt med Knittren.

Der gives, navnlig i Leipzig, ikke sjældent Tilfælde, i hvilke Aconit i Begyndelsen er det hensigtsmæssigste Lægemiddel og det er ofte istand til at mildne hele Sygdommen i dens Hestighed eller endog saa ganske at hæve den. Dette Middel kan altid anbefales, naar følgende Symptomer ialtfald for største Delen ere tilstede: stærk Feberhede efter forudgaaende Kulde med brændende heed, tør Hud, hurtig, haard Puls med stærk, ofte blaalig Ansigtserbme, hurtigt, besværligt og ufuldkomment Andebræt med Uro, Angstselighed og Hjertebanken, Stikken i Brystet ved at trække Veiret dybt og ved Bevægelse, eller en Følelse af et stærkt Tryk og Tungthed paa Brystet; tør, anstrængende Hoste, med ubetydeligt, seigt, slimet eller blodstribet og rustfarvet Opspyt, stadigt Rygleie, Tungthed og Smerte i Hovedet,

stærk Tørst, ubetydelig, rød Urin; Forværrelse af Symptomerne om Aftenen. Den 2den eller 3die Fortynding, 1 Draabe i Vand hver 3die—4de Time vil herved være den hensigtsmæssigste Indgiot; dog vise ogsaa høiere Fortyndinger deres helbredende Virkninger især hos Børn og i mindre heftige Tilfælde.

Derimod i Tilfælde af virkelig croupøse Betændelser, som rigtignok i de sidste 20 Aar her ere fremtraadte temmelig sjældent, ere Jod og Kali hydrojodicum Hovedmidlerne. Trangbrystetheden, Beklemmelsen, Høsten, den rustfarvede Opspytning, og fremfor Alt de physiske Kjendetegn, som jeg rigtignok ikke her kan angive, saavel som Manglen paa alle Symptomer, som vise sig ved en Affection af Luftsprængrenene eller Lungehinden, ere Hovedtegnene for Jod.

Ved alle Lungebetændelser af ringe Grad og uden stærk Udbredelse, ved hvilke Lungehinden er stærkt angreben, viser Bryonia sig at være nyttigst; betegnende for samme ere isærbelesshed meget stærke, stikkende Smerter i Brystet, som fremkomme og forstærkes ved enhver Bevægelse; fremdeles Tegn paa en stor Pirrelighed i Hjernehinderne (saakaldte nervøse Symptomer) som stor Tunghed i Hovedet, Uro, lette Bildelser og bedøvet Tilstand. For det meste vil det være paa Tide at anvende Bryonia, naar de stærke Febertilfælde ere milde ved Aconit; dog kan den ogsaa anvendes strax, naar den almindelige Uro i Blodkarrene ikke er betydelig, og de angivne Bryonia-Symptomer ere stærkt fremtrædende.

Ere Symptomerne for Hjerneophibelse meget heftige, forbundne med heftig Uro, Raseri, vold-

somme Dilirier eller fuldstændig Sovesygge, med rødt, opsvulmet Ansigt, røde og stirrende Øine, brændende tør Hæde og stærk Tørst, saa fortjener Belladonna Fortrinet, isærbelesshed naar disse Symptomer fremtræde i de første Dage i Sygdommen.

Tartarus emet. maa anvendes i de Lungebetændelser, hvori stikkende Smerter vel ere tilstede, men dog Beklemthed og Andedrætsbesvær ere fremherskende, i hvilke der endvidere indtræder en Lettelse i Brystbeklemmelserne, naar der fremkaldes betydelig Opspytning af den med Sliimralen forbundne Hoste, medens Opspytningen ikke indeholder Blod eller i alt Fald kun lidt, men derimod slimebe, skummende Masser. Ogsaa taler for samme heftig Brænden og Følelse af Hudløshed i den øverste Deel af Brystet, saavel som Oppustethed og Ømsindlighed i Mavepartiet, og mørkebrun, rødlig, uklar Urin. Et udmærket Middel er endvidere Brækviinsteen, naar der i Forbindelse med Lungebetændelsen viser sig Svulst i de Partier af Lungen, som ere fri for Betændelsen og man frygter for at der kan indtræde Lungelamhed. Denne yderst farlige Tilstand karakteriserer sig derved, at Luftrørgrenene ere opfyldte med en stor Mængde Vædske, som i høi Grad besværer Andedrættet og er forbundet med Angst for at kvæles, med høi Kallen, Snorken og blaalig Farve i Ansigtet.

Indtræde i det 2det eller 3die Stadium de saakaldte nervøse Symptomer, saasom Knugspillen, Vildelser, uvilkaarlige Udtømmelser, hurtig Svækkelse, kold klæbrig Sved, svag, hurtig Puls, indfaldent Ansigt, tørre Læber og Tunge uden Tørst etc., saa maa der gives Phosphor. Tillige er denne ogsaa særdeles passende i katarrahalske, ty-



phøse, tuberculøse og hypostatistiske Lungebetændelser. Opspyt, som indeholder meget rustfarvet, flydende og sammenløbet Blod, kan ligeledes være et Symptom for Phosphor, naar isørigt andre passende Symptomer ere tilstede.

Hovedmidlerne til ved Opsugning at bortfjerne det i Lungerne udsvedte Betændelsesproduct, og at forhindre dets Forhærdelse og Fortættelse, ere Sulphur og Jod. Indtræder derfor, efterat det første Sygdomsangreb er hævet, paany en Forværrelse af Feberen og af de øvrige Besværligheder, og viser Undersøgelsen en betydelig Udsvedning, saa vil der ved Anvendelse af Jod mod en croupøs Betændelse, og af Sulphur især hos scrophuløse og tuberculøse Personer kunne opnaaes en overordentlig Virkning.

Imod Betændelser, som opstaae af mechaniske Bestadigelser, Saar eller legemlig Anstrængelse, er Arnica særdeles virksomt som første Middel, især naar Opspytningen indeholder meget Blod.

Varme og fugtige Omslag af Havregrød eller Hørfrømeel paa det paagjældende Sted er isørigt i denne Sygdom især i dens andet Stadium, et værdifuldt Understøttelsesmiddel for de homøopathiske Lægemedler.

Af hvad her er anført, fremgaaer imidlertid tydeligt, at en Lægmand hverken er istand til at bedømme eller behandle denne Sygdom, og at han altsaa kun tør vove at handle efter de her givne Kjendetegn, indtil en Læge kan staffles tilveie, eller maafsee i meget lette Tilfælde.

## 2. Lungehindebetændelse.

Som allerede bemærket, er næsten ved enhver Lungebetændelse ogsaa en Deel af Lungehinden

(Pleura) angrebet, hvorved alene de stikkende Smerter ved Lungebetændelsen forårsages. Undertiden er dog Pleura det eneste Sæde for Betændelsen eller i alt Fald har Lungesubstantien meget liben Andeel deri, og om denne Sygdom er her alene Taler. Lungehindebetændelsen adskiller sig fra Lungebetændelsen derved, at de stikkende og trykkende Smerter ere langt heftigere og vanskeliggjøre enhver Bevægelse og Aandedrættet i en betydelig Grad; Hosten udebliver ofte aldeles eller er i alt Fald ubetydelig og tør, og mangler tillige det eiendommelige, rustfarvede eller blodige Opspyt. Den sikke Diagnose er rigtignok ligesom ved Lungebetændelsen kun mulig ved Undersøgelse af Brystet.

Er Lungehindebetændelsen endnu i dens første Stadium, d. v. s. er der endnu ingen Udsvedning, saa ere Aconit og Bryonia de fortrinligste Midler, som ikke sjældent ere istand til at fordele Betændelsen uden at det kommer til nogen Udsfillesproces. Aconit er først at anvende, naar Febersymptomerne, Kortaandetheden og Uengsteligheden ere meget fremtrædende; Bryonia, naar disse Besværligheder rigtignok ere formindskede ved Aconit, men de stikkende Smerter endnu vedblive. Ere Febersymptomerne fra først af ikke heftige, saa er det hensigtsmæssigt, strax at give Bryonia uden foregaaende Anvendelse af Aconit. I Tilfælde af saakaldet „tør“ Lungehindebetændelse, hvor der undertiden er stærk Smerte, Feber og Aandedrætsbesværligheder tilstede, men ingen Udsvedning, lyffes det næsten altid ved disse tvende Midler at frembringe en paafaldende hurtig Bedring og fuldstændig Helbredelse.

I de ulige vanskeligere og altid betænkelige Til-

fælde, i hvilke der indtræder Udsvedning i Lungehinden, er Tartarus omet. uopholdelig at anvende (rigtignok kan denne Tilstand kun opdages ved en omhyggelig Undersøgelse). Ved dette Middel, anvendt i rette Tid, bedres næsten altid den ved Udsvedningen fremkaldte Trangbrystethed og Smertefuldhed og selve Udsvedningen begrænses og ophæves; kun vogte man sig ved Indtrædelsen af en slig Bedring for, hurtig at ophøre med dette Middel, da der ikke sjældent indtræder Fornæelse af Udsvedningen. \*)

Stee Udgydelserne i Lungehinden i meget stor Mængde (som undertiden allerede viser sig ved Fremtræden af Rummene mellem Ribbenene), eller aftager Udsvedningen slet ikke eller maaske kun i en ringe Grad, (hvilket isærdeleshed finder Sted ved tyk, ikke vandagtig Udsvedning) saa ere Hovedmidlerne Sulphur og Hepar sulphuris. Smerten og Feberen ere i dette Tilfælde som oftest forsvundne; men Aandedrætsbesværlighederne ere ofte meget betydelige, med tør Hoste, Umulighed i at ligge paa den sunde Side, Hjertebanken, ophørnede Fødder, og ikke sjældent optræde endogsaa saakaldte nervøse Symptomer. Herimod er Sulphur at anbefale fremfor alle andre Midler; det befordrer Opsugningen af Udsvedningen i Reglen meget hurtigt, uden at der fremkommer de ellers meget betænkelige Eftersygdomme, saasom Sammenvogninger af Lungehindens to Blade, Forkrumning og Indsynkning af Brystkassen etc.

Er Betændelsen en Følge af mechaniske Beska-

---

\*) Cantharis virker meget godt, naar der er Udsvedning. Det anbefales af franske og engelske homøopathiske Læger.  
Dr. S.

digelser, saa er i Begyndelsen *Arnica* det meest passende Middel; ligeledes naar Sygdommens Sæde kun er i Bryst- og Ribbensmusklerne, ved det saakaldte falske Sidesling, som kjendes deels paa Smertens hurtige Stedforandring, deels paa den ringe Feber, men hovedsageligen paa, at Tryk mod det smertefulde Sted forarsager eller forøger Smerten. I saa Tilfælde hjælper ogsaa undertiden *Squilla* hurtigt for det heftige Sting ved at hoste og ved Bevægelse; det er et hensigtsmæssigt Middel i denne Sygdoms mere chroniske Former og ved Complication med Battersot, Svindsot etc.

### 3. Hjertebetændelse.

Denne forekommer næsten aldrig alene, men opstaaer ofte som Følge af en Lunge- eller Lungehindebetændelse (og da som oftest som Betændelse i Hjertesækken, eller ogsaa ved Gigtfeber). Den lader sig kun erkjende ved Undersøgelse af Brystet, særlig ikke af en Lægmand. I nogle Tilfælde viser den sig ogsaa temmelig tydelig ved forhøiet Feberbevægelse, uregelmæssigt Hjerteslag, Hjertebanken, Angst og smertelige Fornemmelser ved Hjertet. Næsten i alle Tilfælde vil *Aconit* være det Middel, som bedst passer til Tilstanden, medens senere *Spigelia*, *Colchicum*, *Belladonna*, *Veratrum*, *Pulsatilla* etc. kunne komme til Anvendelse. Dog er det umuligt her at give udførlige Regler for Helbredelsen, hverken for denne Sygdom eller for de langt vigtigere Sygdomme, som ere en Følge af samme, saasom de organiske Hjerte- og Hjerteklappesygdomme, fordi de maa forblive uforstaaelige uden Undersøgelse af Brystet.

Det samme er Tilfældet med de vandagtige Udsvedninger i Legemets forskjellige Huler og Organer, den saakaldte Battersot, som for det meste kun er en Følge af de organiske Sygdomme i Hjertet, Lungerne, Leveren, Nyrerne og Livmoderen. Angaaende dens homøopathiske Behandling kan man see, hvad der i Artiklerne Asthma og Hjertebanken er sagt derom.

Kun dette skal endnu her siges til disse Tilfælde, at ved alle Hjerte- eller Hjertesætsbetændelser, som opstaae af Gigtfeber, er næsten altid Spigelia Lægemidlet, især naar det anvendes i Begyndelsen.

#### 4. Hjertebanken.

I de fleste Tilfælde er denne kun et Symptom paa en anden Sygdom, især paa organiske Hjertesygdomme; det vil ikke være umuligt, aldeles at helbrede samme, og Behandlingen maa ingenlunde indskrænke sig til dette Symptom alene, men den til Grund liggende Sygdom maa fuldstændigt erkjendes og tages i Betragtning. Dog lyffes det ikke sjældent, saavel i kroniske Tilfælde, som ogsaa i Tilfælde, der kun hidrøre fra forbigaaende Uarsager, ved det rigtige homøopathiske Lægemiddel at opnaa væsenlig Bedring og i sidstnævnte Tilfælde endogsaa fuldkommen Helbredelse.

Opstaaer heftig, ængstende Hjertebanken som Følge af stærk Uergrelse, saa er en Indgiwt Aconit og efter en Times Forløb gjentagne Indgiwter Chamomilla det hensigtsmæssigste Middel; af Stræk: Opium eller Coffea; af Frygt eller Angst: Veratrum; af Fortrydelse, Mishag og Kræn-

teffe: Ignatia; af pludselig Glæde; Aconit eller Coffea. Er den hyppige Rydelse af Kaffe eller andre hidfende eller spiritusøse Drikke Aarsagen, saa anvendes altid først Nux vomica. Ved almindelig Fuldbloedighed og et ungdommeligt, kraftigt Legeme frembringer først Aconit den hurtigste Bedring og efter nogle Dages Forløb Nux vomica. Forekommer Hjertebanken hos svagelige, blegfottige Fruentimmer, med almindelig Svækkelse og Kuldefornemmelser, saa er Ferrum og Pulsatilla Hovedmidlerne; hos nervesvage, hysteriske Fruentimmer: Asa, 6. Fort., Chamomilla, Nux vomica eller Platina; er den en Følge af en svær Sygdom, af Blodtab, Diegioning eller beslige, saa ere China, Ferrum eller Acidum phosph. meest passende.

Belladonna anvendes, naar Hjertebanken gjenlyder i Hovedet, ved Banken i Halsen og Hovedet, Ansigtssvulme, Svimmelhed, Sortnen for Dinene, og Forværrelse ved Bevægelse.

Arsenic ved Anfald om Natten, med utaalelig Angst og Kortaandethed, naar man er nødt til at sidde opreist og brye sig forover.

Spigelia især ved organiske Hjertelidelser og Gigtfeber, bølgeformede, sittrende, stormende Hjerteslag, Snurren, Stikken og en Fornemmelse, som om der laa noget Tungt ved Hjertet.

Natrum muriaticum ved uregelmæssig, udsættende Hjerte- og Pulsflag, flagrende Bevægelser i Hjertet, som forøges ved den mindste Bevægelse, især efter Middagsmaaltidet, og som formilbes ved et Tryk med Haanden.

Digitalis ved stærkt, næsten hørligt Hjerteslag med Angst og frampagtig Smerte i Bryst-

benet og undertiden meget trægt og langsomt Pulsflag.

*Veratrum* ved natlige Anfald med Dødsangst, kold Sved, Kulde i Lemmerne, bedre i liggende Stilling end i Bevægelse, afbrydende Puls.

I nyere Tid har man næsten i alle Tilfælde af Hjertebanken som Følge af organiske Hjertesygdomme indtrængende anbefalet *Cactus grandiflorus*, *Veratr. virid.* og *Naja tripudians*.

### 5. Kortaandethed, Asthma, Brystkrampe.

Disse Besværligheder, som sædvanlig fremkomme i periodiske Anfald, ere kun Symptomer paa organiske Sygdomme, meest i Lungerne (Emphysem) eller i Hertet (Klappeseil og „for stort Hjerter“). Af denne Grund vil en Lægmand kun være istand til at slaa ind paa reen symptomatisk og for det meste utilstrækkelig Behandling af denne Lidelse. De sædvanligste Midler derimod ere *Arsen*, *Ipecacuanha*, *Belladonna*, *Veratrum*, *Coffea*, *Nux vomica* og *Pulsatilla*.

*Arsen* er et Hovedmiddel i de fleste Tilfælde af kronisk Asthma, især i Kvælningsstilfælde om Natten med Dødsangst, Sammensnøring af Brystet og Halsen, voldsom Hjertebanken, Nødvendighed af at sidde opreist og at bryde Overtroppen forover, Bedring ved Indtrædelse af Hoste og Opspytning, ved Tilbøjelighed til Ophoven af Fødderne, ved betydelig Svaghed.

*Ipecacuanha* passer fortrinligt ved pludselige Anfald om Natten af Brystkrampe med Sammensnøren af Strubehovedet, Rallen af Sliimmasser i Brystet, Krampehoste, mørkerødt, ophedet

Ansiget afveglende med Blegghed og Kulde, hurtigt sultende Andedbræt, Stivhed i hele Legemet.

Belladonna ved Andenød og Beklemmelse, som især forarsages og forværres ved Bevægelse, med stadig Uro, Sammensnøren og Smerte i Strubehovedet, Banken i Brystet, kort og hurtigt, eller snart hurtigt, snart dybt Andedbræt, tør Krampehoste.

Veratrum ved Fornemmelse af Kvælning med Ildebefindende, Opkastning, Dødsangst, kold Sved, Kulde i hele Legemet, huul Hoste, — Lindring ved at ligge stille.

Coffea ved meget pirrelige Personer efter Sindsbewægelse med kort, besværligt Andedbræt, Angst, Uro, Hæde, Sved og Tilbøielighed til Graad. (Ofte afveglende med Aconit).

Nuxvomica ved ængstende, frampagtig Brystbeklemmelse især om Natten, tidligt eller efter Maaltider, med utaalelig Oppustethed og Fornemmelse af Overfyldning i Maven, Opstød, Hjertebanken, kort Hoste, Lettelse ved at ligge paa Ryggen.

Pulsatilla ved Andenød, som efter Svøld damp, Kvælningssangst især om Natten og om Aftenen ved at ligge i horizontal Stilling, ved Hjertebanken, Svimmelhed og rigelig Sliimopspytning.

Foruden disse Midler maa endnu i Særbeleshed nævnes Ammon. carb., Lachesis, Lau-rocerasus, Sambucus, Stramonium, Tart. emet. og Cuprum. Som et virksomt Palliativ (beroligende Middel) viser sig i disse Tilfælde ikke sjældent en stærk Kaffe decoct, især hos Patienter, som ikke daglig drikke Kaffe.

Mod Asthma foranlediget af Blodstigning



hjælpe: Acon., Bellad., Nux vom., Phosphor, Sulphur.

af Undertrykkelse af Maanedsfloppet: Bellad., Coccul., Pulsat.

af Vinde: Cham., China, Nux vom., Phosphor, Veratrum.

af Sliimophobning i Lufterrørgrenene: Ars., Bry., Cupr., Ferr., Phosph., Puls., Tart. emet.

mod Asthma ifølge meget indaandret Støv: Ars., Hep. s., Ipecacuanha, Silicea.

mod Asthma i Følge Sindsbervælgelse: Acon., Chamom., Coff., Ignat., Nux vom., Veratrum.

Med Hensyn til denne Sygdom for Børn, sammenligner man, hvad der er sagt angaaende Brystkrampe hos Børn.

## 6. Svindsfot, Tæring (Lungetæring).

Med dette Navn betegner man sædvanligt den Sygdomstilstand, som betinges af Tuberkler i Lungen, og nærmest kun dens senere Stadier eller Lungetuberkulose's Afslutning. Men denne Lungernes abnorme Tilstand kan aabenbart kun kjendes af en Læge, som er nøie fortrolig med Legemets physiske Undersøgelse, og følgerig kan en nogenlunde heldig Behandling af denne farlige Sygdom, alene foretages af en saadan. Derfor er det umuligt, enten i deres Almindelighed eller kun tildeels at tage de Lægemidler i Betragtning, som Homöopathien kjender mod denne Lidelse, som ofte optræder under mangfoldige Skikkelser, og der kan kun henvises til de Kjendetegn, som ere givne i Capitelne

om Chronist Catarrh, Hæshed og Blodstyrtning. I al Almindelighed kun følgende Bemærkninger som Holdpunfter.

Hovedmidlerne ere Calcarea, Bryonia, China, Ferrum, Jod, Kali carb., Mercur, Phosphor, Pulsatilla, Stannum og Sulphur. Indtræder Sygdommen som Følge af Lungebetændelse, hvorved som oftest et meget hurtigt Forløb finder Sted (galopperende Svindsot), saa ere som oftest Phosphor og Sulphur de meest passende Midler; opstaaer den som Følge af stærkt Blodtab, eller efter en længe fortsat Diegivning, efter Betændelser eller Udsvævelser, saa ere især Ferrum, Calcarea og China at anvende.

Ved meget betydelige Affsondringer af Sliim og Materie passe ofte Mercur, Stannum eller Kali carb., ved hyppig Blodopspytning Arnica, Belladonna, Ferrum, Kreosot, Phosphor, Ac. nitri, ved mattende Sved eller Diarhoeer Arsen. Calcarea, Mercur, Ferrum.

Ved de hyppigt optrædende, periodiske Feberanfald (heftist eller Snigfeber), passe ofte bedst Arsen, Bryonia, Calcarea, China, Ferrum eller Sulphur.

## 7. Betændelse i Brysttkjertelen.

Fremkommer denne ikke i Løbet af Marselsengen, men er den, som det sædvanligt er Tilfældet, foranlediget af et Tryk eller en anden mekanist Marsag, saa er Arnica og senere Conium, eller ved betydelig, rosenagtig Rødme, Belladonna, de bedste Lægemedler, og som oftest bevirke de i Løbet af kort Tid Betændelsens fuldstændige Forbeling.

Den Betændelse, der indtræder efter Fødselen under Diegivningen eller umiddelbart derefter, er altid mere betændelig og udfordrer en anden Be-

handling. Forholdsviis fjelden er en overordentlig stærk Tilstrømning af Mælk til Brysterne, enten ved at vænne Barnet fra, eller ved at Moderen af en eller anden Grund ikke selv kan amme sit Barn, Aarsag til Betændelsen; i saa Tilfælde er i Begyndelsen Bryonia det bedste Middel, især naar Brysterne ere haarde, spændte og smertefulde. Viser der sig paa Brystet allerede en rosenagtig, fra eet Punkt udstraalende Rødme, og en rivende Smerte, som trækker sig ud i Armhulingen og Armene, saa maa der anvendes Belladonna. Danner der sig i det haarde og røde Bryst et eller flere bløde, vippende Steder, som true med at bryde op, saa bevirker undertiden Phosphor Materiens Opsugning og Opbrydningen forhindres, eller idetmindste indskrænkes Boldenskabets Udbredelse. Er der allerede gaaet Hul, eller har der allerede dannet sig flere fistelagtige Materiegange med haarde, fremtrædende Rande, saa ere Hepar sulphuris og Mercur de hensigtsmæssigste Lægemidler; i særdeles haardnakkede Tilfælde vil ogsaa Silicæa gjøre god Tjeneste. Indtræde under Forholdningen Kulbegysninger, heftige Svedanfald, paafaldbende Udmattelse i hele Legemet og overordentlig Pirrelighed, saa maa der anvendes nogle Indgioter China. Med varme Grødomslag, som i disse Tidelser sædvanligt spille en stor Rolle, maa man være meget forsigtig; de ere kun da hensigtsmæssige, naar Forholdningen ikke længere kan forhindres og aldeles sikkert forestaaer. Indtil den Tid kunde snarere Koldtvandsomslag være at anbefale.

Bliver der, efterat Diegivningen er ophørt, eller efterat Betændelsen er hævet, haarde og smertefulde Steder tilbage i Brystet, saa fortjene Conium,

Carbo anim. og Silicea meest at tages i Betragtning.

Et meget ubehageligt Onde, som trods betydelig tilsyneladende Ubetydelighed dog i mange Tilfælde gjør det umuligt at fortsætte Diegningen, er Brystvorternes Hudløshed. En hyppig Badstning med fortyndet Arnica-Tinctur (1 paa 6—8 Dele Vand) forhindrer altid at dette overordentlig smertefulde Onde tager Overhaand, kun maa man iagttage, at Borten hvergang omhyggelig afvaskes, forinden Barnet lægges til. Ogsaa anbefales indvendig Anvendelse af Arnica, Bellad., Graph., Rh. t. og Sulphur. Undertiden lykkes det ogsaa ved Anvendelse af Gummi Sugevorter at opnaae deres Helbredelse, uden at berøre Barnet Brystet\*).

### § 8.

## Mavesygdomme.

### 1. Mavekatarrh (Mave- eller Fordøielse-svækkelse).

Som oftest en Følge af fortsatte Forsyndelser mod Diæten, Overfyldning med tungt fordøielige Spiser eller Brugen af angribende og skadelig Medicin, men heller ikke sjældent paa Grund af organiske Hjerte-, Lunge- eller Leversygdomme, udvikler der sig i Mavens Slimhinde en chronisk Katarrh, som ledsages af en mangelfuld Fordøielse sædvanlige

\*) Gode Resultater har jeg seet efter Anvendelsen af en Blanding af Arnica-Tinctur med Glycerin eller i mere haardnakkede Tilfælde af Jod-Tinctur med Glycerin. Det er først anbefalet af franske homøopathiske Læger.  
Dr. S.

Besværligheder, saasom Appetitløshed, Opstød, Oppustethed, Ildebefindende, Brynde, Opkastning, Mavesmerter. At denne Sygdom maae være meget udbredt, fremgaaer af det nylig anførte, ligesom at der til dens Helbredelse ved homöopathiske Lægemidler udfordres en hensigtsmæssig Diæt og en omhyggelig Afholdenhed fra alle Nydelse, som kunne virke skadelig paa Maven.

De vigtigste Lægemidler ere i disse Tilfælde følgende: *Nux vomica*, *Phosphor*, *Pulsatilla*, *Bryonia*, *Hepar sulphuris*, *Calcaraea*, *Tartarus emeticus*, *China*, *Ipecacuanha*, *Chamomilla*, *Acid. sulph.*

*Nux vomica* for Biin- og Kaffebrillere, for Stillesiddende, for Hæmorrhoidallidende, isærdeleshed ved stærk Oppustethed og Oppændthed af Maven efter ubetydelig Nydelse af Mad, Opstød, Halsbrynde, belagt Tunge, sur eller bitter Smag i Munden, trang, haard Aabning, gjentagende Mavesmerter, Tunghed og Smerter i Hovedet, Svimmelhed, Besværligheder efter Arbejde med Hovedet, vrangent, fivagtigt Humør.

*Phosphor* ved Besvær efter ethvert Maaltid, Oppustethed, Hebe, Congestioner til Hovedet, Hjertebanken, tomme, halve Opstød, Opftigninger, Halsbrynde, Brantenhed, Ildebefindende, Mavesyre, Mavepine.

*Pulsatilla* især efterat have fordærvet Maven ved Nydelse af fede eller oppustende Spiser, ved stærkt belagt Tunge, slimet eller bitter Smag i Munden, Opstød af Galde eller Mavesyre, Modbydelighed ved alle især varme Spiser, tynd Aabning, Kulbegysninger, ingen Tørst.

*Bryonia* ved Trykken og Ømsindtlighed i Mavegruben, Kulde, Tørst, Tørhed i Munden og i

Halsen, gulagtig belagt Tunge eller smaa Blærer paa samme, Forstoppelse.

Hepar sulphuris ved hyppig Mavesor-dærvælse trods regelmæssig Diæt, ubehagelige eller raadbentsmagende Opstød, Ildebefindende især tidligt om Morgen, Opkastning af Sliim, Galde eller Syre, Sliim i Munden og Halsen, Lyst til sure og krydrede Spiser.

Calcareo især imod Syre i Munden og Maven, Halsbrynde, Vandsamling i Munden, Modbydelighed for Kjød og kogte Spiser, glubende Sult, Oppustethed og Ømsindtlighed i Maven.

Tartarus emeticus imod tomme og ubehagelige Opstød, Opstød af sur eller skarp Væbste, Sliim, Ildebefindende, Kvalme, Opkastning af Sliim og Spiser, flyttende Tryk, skjærende Mavesmerter, Diarrhoe.

China ved en idelig Følelse af Mattelse, Tryk i Maven af alle Spiser, Opstød og Opkastning af usfordøiede Spiser, stærk Følelse af Oppustethed, Lyst til Surt og Kraftigt, Ubegagelighed, Følelse af Overmættelse, Søvnhed, Fortrædelighed, Lyst til at lægge sig efter ethvert Maaltid, mørk, uklar Urin, urolig Nattesøvn, gulagtig, bleg Ansigtssfarve.

Ipecacuanha ved Modbydelighed for alle Spiser og for Tobaksrygning, hyppig Opkastning med skjærende Mavesmerter og Diarrhoe, og med reen Tunge trods Ildebefindende og Opkastning.

Chamomilla ved vedvarende bitter Smag i Munden, Opstød som af Galle, Opkastning af grøn, bitter Sliim, Hede og Hovedpine, rødt Ansigt, brændende Øine, urolig Søvn, stor Birrelighed.

Acid. sulphuricum ved sure, skarpe Opstød, Halsbrynde, Opkastning af Vand, Vand i

Munden, Oppustethed, stærkt Sult med Besværligheder strax efter Spiisningen.

## 2. Overlæsselse af Maven.

Fornyes eller forværres Besværlighederne ved en allerede tilstedeværende Fordøielsessvaghed, saa ville de i forrige Kapitel anførte Midler som oftest være tilstrækkelige til en hurtig Helbredelse af Ondet; men for de Sygdomstilfælde og Besværligheder, som ved en ellers normal Fordøjelse kan opstaae ved en Overfylden af Maven eller ved at nyde fladelig Spise og Drikke, gjælde endnu de her anførte Bestemmelser.

Finder en virkelig Overfyldning af Maven Sted ved en overbreven Nydelse af Spise eller Drikke, som just ikke ellers ere fladelige, saa er nogle Mundfulde af sort Kaffe det meest passende Middel; er der endnu efter nogle Timers Forløb Besvær tilstede, saa maa der bruges Ipecacuanha. Efter en Ruus og uforholdsmæssig Driften (Tømmermænd) passe Nux vomica\*) og senere Carbo vegetabilis. Overlæsselse hos Børn, især med Rager, Brød, Hvedebrød og deslige ophæves bedst ved Ipecacuanha og Aconit.

Mod Mavefordærvelse ved fede Spiser (Svinekjød, Butterdeig osv.) er Pulsatilla Hovedmidlet og ved længere Vedvaren Arsen.

Mod Fordærvelse ved Sukker og Slifferier Aconit, Puls.

Ved Salt og salte Sager: Carbo veget. og i langvarige Tilfælde: Spir. nitri dulc.

Ved Suurt: Aconit eller Arsen.

\*) Her virker Nux vomica bedst i 2den eller 3die Decimal-Fortynding.

Ved oppustende Sager (Raal, Urter) : Bryonia.

Ved Frugt: Pulsatilla, China.

Ved gjærende eller mugne Sager: China.

Ved Koldt eller J̄s: Ars. eller Puls.

Ved Band: Cocculus, China eller Ferrum.

Ved Mælk: Nux. vom., Bryonia eller Calcareæ.

Ved Øl: Bellad., Arsen eller Ferrum.

Ved Brændevin: Nux. vom., Bellad., Opium.

Ved Biin: Nux. vom., Carbo veget.

Ved Kaffe: Nux. vom., Chamomilla.

Ved Thee: Coffea eller China.

Ved Tobak: Nux. vom., Cocculus, Veratrum.

Utrer Ildebefindendet sig hovedsagelig ved Opstød, saa ere Lægemidlerne især Bryonia, Hepar sulphuris, Nux vomica, Phosphor, Pulsatilla, Tartarus emeticus og Veratrum, ved bittert Opstød: Bryonia, Nux vomica og Pulsatilla, ved suurt: Phosphor, Calcareæ eller Acid. sulphuricum, ved raadbent: Hepar sulph. og Tartarus emeticus, ved ufuldstændigt: Cocculus og Phosphor, ved voldsomt: Veratrum og Platina. Komme de nydte Spiser ved Opstødet op i Munden (Opfyldning) saa passe især Bryonia, Ferrum, Ignatia, Phosphor, Sulphur eller Thuja.

Ved Halsbrønne (Mavesyre, Kløgninger) ere Hovedmidlerne Bryonia, Calcareæ, Capricum, China, Nux vomica, Phosphor og Acidum sulphuricum; indfinder den sig gjentagende under Svangerskabet, saa hjælper bedst Belladonna eller Nux vomica.

Ved Hikke ere Hovedmidlerne: Ignatia, Nux vomica og Hyoscyamus, især hos smaa Børn det førstnævnte, i Tilfælde, hvor en Smule tørt Suffer



ikke snart hjælper, eller den indfinder sig meget hyppig og regelmæssigt efterat de have druffet Mælk.

### 3. Kvalme.

Denne Lidelse er meget ofte kun et Symptom, som følger med andre Sygdomme, og kan her naturligvis kun omtales forsaavidt som den optræder enten som enestaaende selvstændig Sygdomssymptom; eller ialtfald er saa fremtrædende, at den udkræver særlig Opmærksomhed fremfor de øvrige Sygdomsbesværligheder.

Som oftest ere de meest passende Lægemidler: *Ipecacuanha*, *Nux vom.*, *Pulsatilla*, *Antimon*, *Arsen*, *Phosphor*, *Bryonia*, *Chamomilla*, *Veratrum*, *Belladonna*, *Aconit*.

Bed Glædefindende og Opkastning som Følge af Maveoverlæselse passe *Ipecacuanha* eller *Pulsatilla* bedst; efter uforholdsmæssig Driften: *Nux vomica*; efter Uergrelse: *Chamomilla*, *Bryonia* og *Nux vomica*; efter Skræk: *Aconit* og *Ignatia*. Opstaaer Opkastning som Følge af et Slag paa Hovedet, saa anvendes *Arnica*; som Følge af at fjøre eller af at gynge: *Cocculus* og *Kreosot*; som Følge af Hoste: *Antimon tart.*, *Ferrum*, *Ipecacuanha* eller *Veratrum*; naar samme er ledsaget af halvsidig Hovedpine (*Migræne*): *Belladonna* og *Nux vomica*; som Følge af Drm: *Aconit* eller *China*; under Svangerskabet: *Nux vomica*, *Ipecacuanha*, *Kreosot*, *Sepia*, *Bellad.*; hos Bættebørn: *Ipecacuanha*, *Aethusa cynapium* eller *Kreosot*; hos Drankere: *Carbo veget.*, *Arsen* eller *Lachesis*; efter Tobaksrygning: *Nux vomica* eller *Veratrum*.

Mod Opkastning af Spiser: Ipecacuanha, Antim, crud., Ferrum, Pulsatilla, Bryonia, Arsen, Veratrum.

Mod Opkastning af Galle eller grøn, bitter Bædste: Bryonia, Cham., Ipecac., Phosphor, Veratrum.

Mod Opkastning af Slim: Aconit, Belladonna, Ipecac., Pulsatilla, Antimon tart.

Mod Opkastning af Vand: Arsen, Bellad., Causticum, Ipecac., Acidum sulphuricum.

Mod Opkastning af sure Stoffer: Calcareæ, Causticum, Phosphor, Ac. sulphur.

Mod Opkastning af Blod: Arnica, Arsen, Aconit, Bellad., Bryonia, Millefol., Nux vom., Veratrum, Ipecac., Antim. tartar.

Mod Opkastning af mørke, sortagtige Stoffer: Arsen, Plumbum, Veratrum.

Fremkalbes den især ved at spise, saa tyder dette hen paa Arsen, Ferrum, Nux vomica, Pulsatilla, Veratrum, ved at drille paa Arnica, Arsen, Phosphor; er den forbunden med Diarrhoe, paa Arsen, Ipecac., Veratrum; fremkommer den om Morgenens paa fastende Hjerte, paa Kreosot, Nux vomica; men om Natten, paa Ferrum, Phosphor, Pulsatilla.

#### 4. Mavekrampe.

Med dette almindelige Udtryk betegnes meget forskellige Sygdomstilfælde i Maven, som strengt taget ikke have Andet tilfælles med hinanden, end at de fremkalde Smerter i Maven og staa mere og mindre i Forbindelse med Fordøielssbesværligheder. Mavelidelser, som forarsage Mavekrampe ere f.

Ex. chronisk Mavekatarrh, Mavesvulst, Maveforhærdelse, Mavekræft. Mavekrampe er altsaa egentlig kun et Symptom for forskjellige Sygdomme. Men da der her ikke er Tale om de nœiagtigere, undertiden ogsaa for Lægen meget vanskelige Sygdomsdiagnoser, og da det ofte lykkes at finde de passende homœopathiske Lægemidler, uden nœiagtig at erkjende den Sygdom, af hvilken de foranlediges, saa skulle her nævnes alle hine forskjellige Mavesygdomme og de vigtigste Lægemidler for samme efter deres forskjellige Symptomer.

Fremfor alle maa her nævnes *Nux vomica*; dette finder især dets Anvendelse mod Mavekrampe, som for det meste indtræder nogen Tid efter Spisningen med trykkende, sammentrækkende og rivende Smerte, med Oppustethed, Trykken som af et Baand, Opstød, Sult, Bandsamling i Munden, Halsbrynde, Opstød, Haarblivethed, hypochondrisk, pirreligt Lune, Tunghed og Smerte i Hovedet, almindelig Omfindtlighed; særdeles at anbefale er det fremdeles for Kaffe- og Viindrikkere, Stillesiddende, som lide af Hæmorrhoider, som arbeide stærkt med Hovedet, som ryge stærk Tobak, som ogsaa overhovedet i de fleste Tilfælde af Mavekrampe. Nær beslægtet med dette Hovedmiddel er *Bryonia*, *Chamomilla*, *Cocculus*.

*Bryonia* er at foretrække mod et Tryk i Maven som af en Steen, umiddelbart efter Maaltidet, som forværres ved Bevægelse, og bedres ved Opstød og ved at ligge, ved bitter Smag i Munden, Kvalme og Forstoppelse; *Chamomilla* mod lignende Smerter, som mildnes ved at krybe sammen, som især om Natten forværres, med Angst, Uro og Aandedrætsbesvær, naar der mindre er Forstoppelse end Tegn til Diarrhøe; *Cocculus* mod trækkende,

Klamrende Smerter i Maven og Underlivet, Jædebefindende med Tilbøjelighed til Afmagt og Svimmelhed, med stor Forsagthed og daarligt Humør.

Phosphor er ligeledes et Hovedmiddel mod stærke, trykkende og brændende Smerter i Maven især efter Maaltidet med stærk Oppustethed, Opstød, Jædebefindende, Brænden og Følelse af Hede i Maven, som strækker sig op i Munden eller afværgende Kuldefornemmelser og Smerte ved at synke.

Bismuthum passer isærdeleshed mod krampagtig, utaalelig Smerte og Oppustethed af Luft i Maven, stinkende Opstød, heftig Kvalme, Rumlen og Koliksmarter i Maven.

Ere Smerterne mere brændende eller sammenknurrende, med Trommesyge, Halsbrynde, stor Afstyk for alle Spiser, komme de især efter opblæsende Spiser, eller finder der tillige Blodbrækning Sted, saa passer Carbo vegetabilis.

Er Maven meget ømsindlig for Tryk, gaaer Smerten bagud ind i Ryggen, ere Forstyrrelser tilstede i Maanedøfløddet, medens samtidigt Fordøjelsen ikke er væsentlig forstyrret, saa hjælper Belladonna.

Hos unge, blegfottige Piger, saavel som overhovedet hos Personer af phlegmatisk Temperament og slapt Legeme, passer Pulsatilla, saameget mere, naar Mavesmerterne ere forbundne med Kulde, kolde Extremiteter, Mangel paa Tørst, Tilbøjelighed til Diarrhoe, Kvalme eller Opkastning af Spiser.

China er at anvende hos svækkede Personer, som have fastet stærkt op, lageret eller svedt meget, og som ofte ere blevne aareladte, eller naar Mavekrampen indtræder som Følge af langvarig og an-

strængende given Die, i Forbindelse med stor Forbøielsesvækkelse, Tryk efter ethvert Maaltid, Opblæsthed, Trommesyge, gul, gulsten Hudfarve, Bedring i Besværlighederne ved Bevægelse. Ligeledes er Arsen et Hovedmiddel mod Mavekrampe med betydelig Svækkelse og Slappelse i selve Organismen, især naar Smerten ere utaalelig brændende med uudholdelig Angst og Uro, stærk Tørhed og Tørst, Kløgninger, Kvalme, Opkastning af Altsom nydes eller ogsaa af slime, galbeagtige, ja selv brunlige og blodige Masser, Diarrhoe.

Naar der umiddelbart ved Synkning af Spiterne føles en Smerte eller en Hindring, som om samme ikke kunde komme ned gennem Spiserøret, men maatte tvinge sig ud paa de smertende Steder, (en Fornemmelse, som sædvanlig fremkommer naar Mavemunden er angrebet) saa maa der især anvendes Baryt, Ignatia og Phosphor. For mindsfes Mavesmerterne umiddelbart efter at man har spist, eller ophøre samme derefter en Tidlang ganske, saa hjælper ikke sjældent Chelidonium, 3. Fortynding.

### 5. Gulsot.

Den opstaaer derved, at Galden holdes tilbage i Lever- og Galdegangene og at den delvis optages i Blodet; den hyppigste Foranledning dertil er, at en Mavekatarrh eller en Katarrh i Tolvfingertarmen udbreder sig til Galleveiene. Hovedsymptomerne ere den gule Hudfarve, den mørke Urin og de lyse, leerfarvede Stoolutømmelser. Næsten altid er Mercur det passende Middel; er dette imidlertid allerede anvendt i større Gaver, saa maa

China anvendes. Indtræder Guulspoten som Følge af Uergrelse, saa maa Bryonia foretrækkes.

Guulspot hos Nyfsøgte er derved forskjellig, at ved samme er Urinen ganske lys, Stoludtømmelserne derimod mørke og galbefarvede. Aconit er herimod det hensigtsmæssigste Middel; kun naar slimebe, sammenløbne Diarrhoetilsælde forene sig dermed, maa ligeledes anvendes Mercur eller Chamomilla, og i meget haardnakkede Tilsælde Lachesis.

Foruden disse tvende, som oftest aldeles farefri Arter af Guulspot gives der endnu en, som hidrører fra Galdesteen i Galbeveiene, hvis Helbredelse er betinget af Galdestenenes Fjernelse, og en, som foranlediges af organiske Lever sygdomme (som guul Leveratrophie, chroniske Leverbetændelser, Leverkræft). Sidstnævnte kan overhovedet paa Grund af dens Farlighed kun kjendes og behandles af en Læge.

## § 9.

### Underlivssygdomme.

#### 1. Leverbetændelse.

Denne Betændelse indskrænker sig som oftest til Leverens Hovedtræf, en Deel af Bughinden, og characteriserer sig hovedsagelig ved Smertes, (for det meste stikkende) i den høire Side, under den høire Brystvorte indtil ned i Ribbenene fortil og bagtil (forværres ved Tryk, Aandedræt og Bevægelse), ved Ophovnen af Leverpartiet, ved Smerte

i den høre Skulder, ved guulagtig Hudfarve, ved Ildebefindende, uregelmæssig Åbning, Feber og Hovedaffection. Den kan let forvergles med Betændelse i Lunge- og Ribbenshinden, hvilken ikke sjældent udbreder sig til Leverovertrækket, saa at begge Sygdomme forekomme samtidigt.

Hovedmidlerne ere Aconit, Belladonna og Bryonia. Aconit passer især i Sygdommens Begyndelse, ved heftig Feber og kraftig Puls; Belladonna ved stærk Æmfindtlighed for Tryk, Blodstigning til Hovedet, heftig Tørst, Søvnløshed, Umulighed af at ligge paa høre Side; ved stærk Stikken eller Trykken ind i Leveren, Smerter ved enhver Bevægelse, ved Åndedræt og Hoste, ved Guulset, Ildebefindende, Forstoppelse, ved en Oppustethed og Ophoven af hele Æggen om Leveren. Ogsaa Chelidonium er i mange Tilfælde det rigtige, især hvor Bryonia synes at passe uden at virke, og navnlig hvor der ikke er Forstoppelse men Diarrhoe tilstede.

Rigtig nok forekommer ogsaa Betændelser i den indre Leversubstant, i Galdens Blære og dens Veie og i Portaarens Forgreninger; men disse ere ligesaavel som de organiske Leversygdomme (Forstørrelse, Forhærdelse, Atrophi (mangelfuld Ernæring), Kræft, Fedt- og Flæselever) ikke til at erkjende af Lægmand, og derfor er deres Behandling at fraraade.

## 2. Galdesteenskolik.

Ogsaa Diagnosen af Galdesteen er i de fleste Tilfælde umulig for en Lægmand, og denne Lidelse vilde som Følge heraf ikke have fundet nogen Omtale her, dersom der ikke oftere ved Galdestenenes

befuørlige Afgang fra Galdeveiene opstod saa heftige og smertelige Tilfælde, at hurtig Lindring og Hjælp ofte maatte synes at være paatrængende nødvendigt.

For det meste opstaaer uden foregaaende Barsel en overordentlig folikagtig Smerte, som sædvanlig udgaaer fra Leverens Bagside, men ofte udbreder sig over hele den øverste Deel af Bugen og Maven, med utaalelig Uro og Angst, Kvalme og Opkastning, ogsaa hyppig Nabning og Diarrhoe i kortere eller længere Anfald. Efter nogen Tid indtræder der ogsaa Guulset, hvorved da Diagnosen betydeligt lettes og bekræftes. Leveren er ogsaa i saa Fald meget ømfindtlig for Tryk. Belladonna i stærke og hyppige Indgiver er sædvanlig i Stand til at frembringe Formildelse i Smerterne. Varme Grødomslag understøtte ikke sjældent denne gunstige Virkning. Denne Lidelser videre Behandling, som maa gaae ud paa at afføre de allerede dannede Steen gennem Tarmkanalen og at forhindre Dannelsen af nye, kan ikke nærmere angives her, kun vil jeg her nævne, at Carlsbader Vand som oftest er et fortræffeligt Middel til at opnaa det sidstnævnte Resultat.

### 3. Sting og Svulst i Milten.

Det saakaldte Miltsting bestaaer i en meget ustyldig, som oftest meget hurtig og af sig selv forløbende, stikkende Smerte i Egnen om Milten, som for det meste opstaaer som Følge af Løben, Dandsen, Tryk af snevre Klæder, og som vel egentligt har meget lidet eller Intet at gjøre med Milten, men meest hidrører fra Maven, fra Oppustning



eller fra Muffelirritation. Skulde samme i enkelte Tilfælde optræde hyppigt eller langvarigt, saa vil Arnica eller Bryonia hensigtsmæssigst kunne anvendes derimod.

Miltsvulst forekommer temmelig regelmæssigt under Forløbet af enkelte acute Sygdomme, især ved Typhus og Koldfeber (sjældnere ved acut Tuberculose, Pyæmie, Puerperalfieber, Pneumonie, Scorbut) uden at afstedkomme særdeles Forstyrrelser og Smerter eller at forbre noget Hensyn ved Behandlingen; den taber sig som oftest af sig selv under Reconvalescensen. Kun ved heftige Koldfebre, især i sumpege Ege, hvor den saakaldte Malaria grasserer, er Miltsvulsten af væsentlig Betydning, idet den ikke sjældent vedvarer længe og da stedse giver Anledning til Feberens Gjenkomst og overhovedet er et Tegn paa, at Marsagerne til Koldfeberen ikke endnu ere fuldstændigt helbrede. Ogsaa efter svære Typhusanfald bliver undertiden i kortere eller længere Tid en Miltsvulst tilbage, som dog sædvanligt kan forblive uændet. Imod slige haardnakkede Koldfebre med Miltsvulst er ofte China eller Chininum sulph. i 1ste Forrøining Hovedmidlet; kun hvor dette Middel allerede er blevet anvendt i store Indgiver, skal man strax anvende Arsen. Ogsaa Ferrum er isærdeleshed at anbefale i Tilfælde, hvor der viser sig tydelige Tegn paa Blodmangel. (See endnu p. 214).

Selvstændig Betændelse af Milten vil sjældent forekomme uden i Tilfælde af ydre Beskadigelse og Contusioner og eger sig i saa Tilfælde vanskeligt til Bedømmelse af Lægmand.

## 4. Underlivs betændelse.

Sædvanlig er det den Hinde, som indvendig beklæder Underlivet, der angribes af Betændelse; ulige sjældnere Tarmenes Slimhinde. Sygdommen lader sig ogsaa let kjende af en Lægmand paa den overordenelig heftige, stadige Smerte, der er indskrænket til et bestemt Sted, ofte kun af liden Udstrækning, som ved enhver Bevægelse og Berørelse forsøges utaaleligt, saaledes at Andedrættet og Hosten betydeligt vanskeliggjøres og ofte selv Tryk-  
ket af Dynen ikke kan taales. Desuden ledsages den som oftest af stærk Feber, stor Uro og Angstelig-  
lighed, Oppustethed af Underlivet, Opstøb, Ilde-  
befindende, som oftest Forstoppelse. Kun ved Be-  
tændelse i Tarmenes Slimhinde er der sædvanlig  
Diarrhoe og Opkastning tilstede.

Denne Sygdom bliver hovedsagelig farlig der-  
ved, at den betydelige Udsvedning, saafremt  
Betændelsen ikke fordeles, meget hurtig træder  
ind i Underlivets Hulhed, og der kan frembringe  
Tarmslynkning ved Forvøjninger eller Sammen-  
flæben, Koldbrand ved Udmattelse eller Gjennem-  
brydning af Tarmene. Det er derfor en stor Triumph  
for Homøopathien, at den netop i disse Tilfælde  
har opnaaet overordentlig gunstige Resultater, og  
ved Erfaring har kunnet fastslaa meget bestemte  
Regler for dens Lægemidler. Men der er ej heller  
i noget Tilfælde en bestemt Optræden mere nød-  
vendig eller et Misgreb eller Tvivl saa fordærlig,  
som i denne hurtigt forløbende Sygdom.

Hovedmidlet i Sygdommens første Stadium er  
ubetinget Aconit i lav Fortynding og ofte gjen-  
taget. Saalænge den locale betændelsesagtige Til-  
stand endnu er i rask intensiv og extensiv Udvi-

ling, altsaa endnu ikke har affondret noget Betændelsesprodukt, saalænge Smerterne ere rivende, stikkende, skjærende, vedholdende, Maven yderst ømfindelig mod Tryk og Feberen har en stormende (synochal) Character, maa man vedblive dermed. Er ved Hjælp af Aconit Feberen og den stikkende, rivende Smerte mildnet eller hævet, men fremtræde sammenfængende eller udvidende Smerter i kolikagtige Anfald, saa maa Belladonna anvendes. Ogsaa strax i Begyndelsen er dette Middel at anbefale, naar disse nye betegnede Smerter optræde i Forbindelse med heftig Feber, uden at have faaet fast Plads, og snart angribe dette, snart hint Parti.

Ere Smerterne stikkende, skarpe eller sløve, især ved ydre Tryk, og Feberen mindre heftig eller mildnet ved Aconit, saa maa Bryonia anvendes; ligeledes naar Betændelsen allerede er rykket saa langt frem, at Exsudatet (især serøs, tyndtflydende) har viist sig. Tilstedeværelsen af Udsvedning viser sig sikkest ved Percussionen, (Banken) idet der da paa et bestemt Sted af Underlivet høres en tom og dump Lyd, hvor der tidligere hørtes en fuldbtonende. I saa Tilfælde maa Bryonia anvendes energisk og i længere Tid, indtil Udsvedningens Opsugning har fundet Sted, dersom ikke nye særdeles Symptomer skulde nødvendiggjøre et andet Middel\*).

Dersom der efter Brugen af Aconit og Belladonna endnu hist og her bliver skjærende Smerter tilbage, som ved Afgang af Luft eller Excrementer stærkt forværres, (overhovedet mest ved Betændelse i Tarmenes Slimhinde), med slimebe, vandagtige, ofte blodige

---

\*) Den engelske homøopathiske Læge, Hughes, anbefaler Mercur. sublimat. Urtinktur.

Diarrhoer, saa vil *Mercurius solub.* vise sig virksom; ligesaa naar der efter Sygdommens længere Bedvaren har dannet sig Udsvedning imellem Bughindens Blade, uden at der viser sig Tegn paa heftig Betændelse.

De nævnte fire Lægemidler ere i denne Sygdom de vigtigste og ville, rigtigt anvendte, være tilstrækkelige til, i de fleste Tilfælde at frembringe en sikker og hurtig Helbredelse; dog optræde ogsaa undertiden usædvanlige Tilfælde, som udfordre andre Lægemidler. I saa Tilfælde vil *Ipecacuanha* i hurtigt paa hinanden følgende Indgiver bringe stor Lættelse, naar Maven er heftig afficeret af Smerte og Ophoven af Mavepartiet, stærk Uengstelse og megen Opkastning, som ikke bringer Lindring. *Arnica* passer, naar Kræfterne aftage, naar Nabningen er blodig, naar Lemmerne blive kolde, Ansigtet meget blegt og indfaldent og man maa befrygte Koldbrand. *Cantharis* ved betændelsesagtige Tilstande i Tarmenes Slimhinde, med brændende, stikende Smarter, Urintrang og Krampe i Maven. *Hyoscyamus* ved hyppige, uvilkaarlige Diarrhoer, Bedøvelse af Hjernen eller Dilirier.

I de fleste Tilfælde er det tilraadeligt, at anvende varme Grødomslag af Havregrød eller Hørfrømeel paa de smertefulde Steder, for at mildne de heftige Smarter, kun maa man iagttage, at deres Vægt er saa ringe som muligt, paa Grund af den stærke Modtagelighed for Tryk.

### 5. Kolik, Bugvrid.

Næst de foranledigende Omstændigheder, som netop ved Koliksmarter kunne være saa mangfoldige, er det her særdeles vigtigt, nøie at iagttage de enkelte Symptomer, fordi det ofte kun paa denne

Maade er muligt at finde det passende homöopathiske Lægemiddel for de mangfoldige Slags af dette hyppigt forekommende Onde.

Hvad først og fremmest Aarsagerne angaaer og Foranledningerne hertil, saa er Følgende hovedsagelig at bemærke:

Ved Kolik: Som Følge af Forkjølelse, Gjennemblødning, Undertrykkelse af Svøb paa isærdeleshed: Chamomilla, China, Nux vomica, Pulsatilla.

Som Følge af Mavesfordærvelse og tungt fordøielige Spiser: Ipec., Nux vom., Pulsat., Bellad., Antim. crud., Bryonia, Arsen, Carbo veg., China.

Som Følge af Værgrelse og Misforståelse: Cham., Colocynth., Bryonia.

Ved Blykolik (hos Skriftstøbere, Farvesfabrikanter, Læfere): Nux vom., Op.

Ved Ormekolik: Mercur, China, Filix.

Ved Kolik med Oppustethed: Nux vom., China, Cham., Sulphur.

Ved Hæmorrhoidalcolik: Coloc., Nux vom., Pulsat., Sulphur.

Ved Menstrualcolik (forud for eller under Perioden): Bellad., Coffea, Nux vom., Pulsat., Cham., Kali carb., Sepia.

Ved Kolik hos Frugtsommelige: Bellad., Bryonia, Nux vomica, Pulsat., Sepia.

Med Hensyn til de enkelte Arter af Smerte og de samme ledsagende Symptomer gjælder Følgende:

Chamomilla: især hos Børn, ved rivende, trækkende Smerter med Angst, Uro, Frem- og Tilbageløben, ved Fornemmelser, som om der paa forskjellige Steder samlede sig Vinde, som vilde bryde

igjennem, med Oppustethed, Knurren, Rumlen, med Stoltrang eller ved korte, slimebe, vandagtige Stolgange, Mobbhydelighed, bittre Opkastninger, Følelse af Sønderflaethed over Krydset, afværgende Rødme og Blegthed i Ansigtet, blaa Ringe om Vinene.

*Colocynthis*: Hovedmiddel mod meget heftig Kolik, med utaalelige, sammensnørende, krampagtige Smerter, som komme i Anfald og ere værst paa det enkelte lille Sted omkring Navlen, med Stikken og Stjæren som med Knive, Opspændthed af Maven, eller en Følelse af Tomhed, undertiden med Krampe i Læggene, stærk Uengstelse, Uro, man kommer ud af sig selv, vælter sig omkring, trykker Maven mod Sengen, slaaer om sig, ved Diarrhoe og Opkastning efter ethvert Maaltid, efter Anfaldet bliver en Følelse tilbage, som om Alt i Maven var slaaet i Stykker og Tarmene sønderrevne og som hængende i en Traad.

*Nux vomica*: ved Tryk som af en Steen eller sammentrækkende og pressende Smerter med stor Spænding og Følelse af Fuldhed, Klædningsstykkerne blive besværlige, ved Forstoppelse eller haard Abning, Trængen paa Blæren eller Endetarmen, som om Bindene vilde ud, hvilket nødsager til at krumme sig sammen, Forværrelse ved hvert Skridt, Bedring i Ro, ved at sidde og ligge, Andedbrætsbesværlighed.

*Pulsatilla*: ved stikkende, bankende Smerter med Oppustethed og Udspiling, Rumlen og Følelse af Hede i Maven, Omhed ved Berørelse, almindelig Følelse af Kulde, kolde Fødder, Forværrelse ved at sidde og ligge, Bedring ved at gaa, ved Diarrhoe, blegt Ansigt, Sammentrympning af Legemet.

**Belladonna:** ved Kniben og Trækninger som om Larmene skulde falde ned, som forsøges ved enhver Bevægelse, ved Udspiling i Hjertefulen indtil Navlen, krampagtig Sammensnøring under Navlen og en Smerte, som om Larmene bleve grebne af Negle og revne, ved tynd, slimet Aabning, rødt, ophovnet, heft Ansigt, Hovedpine, stor Hestighed og opirret Gemt.

**Mercur:** ved dreierende, sammensnøende Smerte, Haardhed i Mave, stærk Sult, Vandopstigninger, Afstø for Sød, Kvalme, Stoltrang og slimet Stolang.

**China:** ved tremmeagtig Oppustethed af Mave, et Tryk som af noget Haardt, Kuldespølse i Mave, Sammensnøring af Larmene nede i Mave, især ved natlige Anfald.

**Colchicum:** ved Flytning af Oppustetheden, tremmeagtig Spænding, Brænden eller Fiskoldhed i Mave og Livet.

**Rhus toxicod:** ved Flytning af Oppustetheden, Gjæring i Mave, betydelig Oppustethed, en Følelse som om Larmene reves istykker eller som de bevægede sig opad mod Brystet.

**Arsenic:** ved utaalelig, brændende Smerter med stor Angst, Tørst, Opkastning og Diarrhoe efter alt hvad der nydes.

**Plumbum:** ved periodisk tilbagevendende Smerter af den heftigste Art, værst omkring Navlen, med krampagtig Sammentrækning af Bugen, haardnakket Forstoppelse, haardt, uregelmæssigt Liv med knudeagtige Oppustninger paa enkelte Steder, en Fornemmelse som om Larmene sammensnøredes, Smerter og Kramper i Lemmerne.

I de fleste Tilfælde vil Lægmænd, især hvor ikke aldeles characteristiske Tegn tale for et andet Middel, opnaae de bedste Resultater ved Anvendelsen af Belladonna.

## 6. Diarrhoe (Durfløb).

Diarrhoe ledsager meget hyppigt mange Sygdomme, saasom Nervefeber, Tarmbetændelse, Cholera og kan overhovedet optræde som enkelt Symptom næsten ved enhver Sygdom. Om denne Slags Diarrhoe kan her naturligvis ikke blive Tale, men kun om den Art, som optræder som en Sygdom for sig selv eller ialtfald som det væsentligste Sygdomssymptom, saaledes som det er Tilfældet efter bestemte Sygdomsaarsager, saasom Forkjølelse, Mavefordærvelse, Skræk osv.

Herimod vise følgende Midler sig tjenlige under de angivne Omstændigheder:

*Argentum nitrium* ved mørke, grønne eller brunfarvede tynde Udtømmelser, som indeholde smaa slimagtige eller hudagtige Stumper, og som afgaae efter mange Oppustninger, Opstød, Kolik og Mavesmerter.

*Arsenic* ved mørkfarvede, aabselagtigt lugtende Udtømmelser, som optræde især om Natten og henimod Morgen eller hver Gang man har spist eller drukket, med brændende Tørst, stor Mæthed, Opkastning, Uengstelighed og Hudesløshed i Endetarmen.

*Bryonia* ved Diarrhoer om Sommeren efter Forkjølelse med grønne, brunlige, ikke just vandagtige Udtømmelser, med heftig Trængen og Koliksmarter.



*Calcarea acetica* er Hovedmidlet mod langvarige, smerteløse Slimafgange med Afmagring Svækkelse, blegt Ansigt og stærk Appetit.

*Chamomilla* passer ganske særdeles ved galdeagtig eller slimet Diarrhoe af gullig eller grønlig Farve, som haffede Æg, med Rumlen og Oppustethed, Bugrid, Appetitløshed, belagt Tunge, Uro.

*China* mod heftige Udtømmelser, blandede med ufordøjede Stoffer, med heftige, frampagtige Smerter, Rumlen og Opstød, hjælper desuden særlig Personer, som ere udmattede ved Sygdom eller Tab af Blod og Safter.

*Colchicum* ved tynde Diarrhoer af hvid, geleeagtig Slim eller ogsaa af blodige Excrementmasser med Larmeaffrab fulgt af Pressen og Trængen i Endetarmen og Kolik og Vinde, ved undertrykt Urinafgang eller meget mørk Urin med Pressen og Brænden i Urinrøret.

*Colocynthis* ved heftige, anstrengende Udtømmelser med stærke, sammensnørende Smerter, Oppustning af Bugen, især som Følge af Uergrelse eller Brede.

*Dulcamara* ved vandagtig Abning uden videre Smerter eller andre Besværligheder, især naar de vise sig om Natten, om Sommeren og efter Forkjølelser.

*Ferrum* ved smerteløse, mattende Diarrhoer af vandagtige Stoffer, som ofte ere blandede med ufordøjede Spiser og meest fremkomme efter at have nydt meget.

*Ipecacuanha* anvendes mod guulagtige Diarrhoer med Ildebefindende og Opkastning, Spytsamlinger i Munden, Svækkelse, Lyst til at ligge,

Svømnighed, bleg Ansigtssfarve med Rande om Munden, Trængsel og Smerte i Endetarmen.

Mercur er Hovedmidlet mod slimet, grøn eller blodig Diarrhoe med smertefuld Trængsel og Pressen i Endetarmen, ved Stolgange, som see ud som haffede Ug, med Hudløshed i Tarmen, ilde Lugt fra Munden, Kvalme, Kuldefornemmelse, Sved, ogsaa isærbelesshed naar Stolgangene indfinde sig om Natten.

Phosphori acidum mod vedvarende, vandagtige Diarrhoer med heftig Rumlen i Underlivet, som ere vanskelige at tilbageholde, som undertiden uvilkaarlig bryde frem, ved ringe eller uden Smerte.

Pulsatilla ved slimebe, hvidlige Stolgange, eller tynde, stinkende Diarrhoer af foranderlig Farve, som Følge af Mavesfordærvelse, med bitter Smag i Munden, belagt Tunge, Ildebefindende, Kuldefornemmelse, Opkastning, Mavepine.

Rheum er Lægemidlet mod grønne Diarrhoer med suur Lugt, som af gjærende, flydende Stoffer, med Trængsel og skjærende Smertes, der ikke opføre ved Udtømmelserne, men stadig fornyes, hvilket hos Børn viser sig ved at trække Laarene op imod Underlivet, Strigen, Uro, Ansigtssbleghed, Spytflob.

Secale cornutum især hos smaa Børn ved vandagtige, gulagtige eller grønne Udtømmelser, som afgaa meget hurtigt men uden mange Smertes, og som i kort Tid forarsage stor Udmattelse og Svækkelse.

Sulphur passer ved langvarige Diarrhoer, som komme ofte og hurtig gjentage sig, og ere slimet eller undertiden blodig Beskaffenhed, senere af skarpe, at de gjøre hele Bagdelen og de om-

liggende Dele hudløse, hvoraf der danner sig blegneagtige Udslet, som ofte udbrede sig over hele Legemet.

Veratrum ved Sommerdiarrhoer og Opkastning med Angst, Uro, kold Svøb, Mæthed, især efter Spisen og Driften.

Ved blodige Stolgange maae især bemærkes: Arsen., Ipecacuanha., Merc., Sulph.

Ved raaddenlugtende: Arsen., Carb. veg., China.

Ved grønne (galdeagtige): Cham., Merc., Bryon., Ipec., Pulsat., Sulphur.

Ved suurtlugtende: Calcarea acet., Rheum.

Ved skarpe, som angribe Huden: Arsen, Cham., China, Ferrum, Mercur, Pulsat., Sulphur, Veratrum.

Ved skummende: China, Colocynthis.

Ved slimede: Cham., Mercur, Pulsatilla.

Ved smertefri: Calc. ac., Ferrum, Ac. phosphoricum.

Ved mattende: Arsen., China, Ipec., Sulph. acid., Secale corn.

Ved sortagtige: Arsen., China, Ipec., Sulph.

Ved stinkende (aabselagtigt lugtende): Arsen., Carb. veg., China, Sulphur., Calcarea.

Ved ufordøjede: China, Phosph. ac., Ferrum.

Ved uvilkaarlig: Ars., China, Phosph. ac., Rheum, Veratrum.

Ved hvidagtige: Calc. ac., Colchicum, Puls., Sulphur.

Ved Diarrhoe efter Skræk: Coffea, Opium.

Bed Diarrhoe efter Uregreelse eller Brede:  
Bryon., Cham., Colocynthis.

Bed Diarrhoe efter at have druffet Koldt:  
Arsen., Pulsat.

Bed Diarrhoe efter Forkjølelse: Bryonia,  
Dulcamara, Veratrum.

Bed Diarrhoe efter at have spist Frugt:  
Arsen, China, Veratrum.

Bed Diarrhoe efter at have druffet Mælk:  
Bryonia, Sulphur.

Bed Diarrhoe med stærk Trængsel: Mercur,  
Ipec., Capsic., Nux. vom.

Undertiden indtræder, hos Børn for det meste som Følge af Diarrhoe og Blodgang, men ogsaa som Følge af en stærk Trykken ved haardt Liv, Fremfald af Endetarmen. Derved finder sædvanlig en Krængning af Endetarmens nederste Slimhudsfolde Sted med en Fremtræden af dens Endemuffler i Form af en rundagtig, blød, rød, let blødende Svulst, uden nogen særdeles Smerte. Sædvanlig lader den sig bringe tilbage ved et let Tryk med Fingeren paa et Klæde, som lægges derover, især naar Barnet lægges paa Maven, og den fremfaldne Tarm gøres slibrig med Olivenolie.

Hvor en stærk Trykken ved Stolgangen er Aarsagen hertil, forhindrer som oftest Nuxvomica Gjentagelsen heraf ved enhver ny Stolgang; eller ogsaa Ignatia. Er den en Følge af langvarig Diarrhoe, saa passer Mercur og Colchicum, dersom der ved samme endnu er Trængsel og Pressen tilstede, fremtræder derimod Tarmen uden nogen Følelse af Smerte, men kun af Svækkelse, saa er Ruta Hovedmidlet. Indtræder et saadant Fremfald for gamle Folk som Følge af

Snækkelse eller Samhed, eller som Følge af Hæmorrhider, Kræft, Tarmeforsnevning etc., saa ere Nux. vom., Sulphur, Arsen., Mercur hyppigt hjælpesomme, dog er det i saa Tilfælde altid raadeligt, at adspørge en Chirurg, ligesaa i Tilfælde, hvor den udtraadte Tarm ikke lader sig bringe tilbage ved de anførte Midler.

## 7. Blodgang.

Denne bestaaer i en Betændelse i Tyktarmens Slimhud, som især strækker sig fra Blindtarmen ned til Endetarmen, og characteriserer sig ved meget hyppige Udtømmelser af slimebe, hindeagtige og blodige Masser næsten uden Excrementer, ved heftig Trængsel og Trykken i Endetarmen og skjærende Smerter i Underlivet. Sædvanlig ere samme forbundne med stærke Feberfornemmelser. Denne Sygdom optræder for det meste om Sommeren og Efteraaret og angriber sædvanlig mange Mennesker samtidig.

Hovedmidlet er her Mercur og Mercurius sublimatus corrosivus; det passer altid, hvor der er stærk Stoltrang tilstede forud for og endnu stærkere efter at der har fundet Udtømmelse Sted, som om Indvoldene skulde presses ud, ved Afgang af reent Blod eller af blodige, grønagtige Masser af Slim, der ligne haffede Eg, ved heftige Mavesmerter, stor Mæthed, Bittren i Lemmerne, kold Sved i Panden.

Gre Udtømmelserne mindre hyppige og blodige, og Stoltrangen ikke saa stor, ere Smerterne i Bugen derimod heftigere, med Kulde, som nøde til at krumme sig sammen, med en Følelse af Op-

spændthed, som ved Vindvatersot, saa er *Colocynthis* at foretrække.

Bestaae Udtømmelserne af mere galdeagtige Stoffer med lidet blodig Sliim, ved heftig Stotrang, Kulde, Kvalme og Brækning af alt hvad der nydes, saa er *Ipecacuanha* passende.

*Colchicum* er at anvende, naar blodige Stolgange, med Larmeaffrab ere tilstede ved heftig Trængsel eller Fremtræden af Endetarmen, med stærkt Oppusten af Bugen, Koliksmarter, Brænden og Trængen ved Urinledningen; saaledes ogsaa *Capsicum*, naar Underlivet er opspændt til Sprængning med yderst smaa men hyppige Udtømmelser i Forening med heftig Trængen og Brænden.

Naar Stolgangene begynde at blive raadne, afgaae uvilkaarlig med stærk Svækkelse, stinkende Urin, raadden Smag i Munden, ligegyldig Bedøvelse eller urolig Uengstelighed, brændende Tørst, blegt, indfaldent Ansigt, blaalige eller rødliges Pletter paa Huden, saa maae der anvendes *Arsenic*.

Ved meget heftige Feberanfald, Riven i Lemmerne, i Hovedet, Rasken og Skulbrene, ligesom ogsaa naar det truer med Betændelse i Bughinden og i Tarmen, saa er det hensigtsmæssigt at give nogle Indgioter *Aconit*, som undertiden ogsaa yttre en gunstig Virkning paa selve Udtømmelserne og som derfor, naar samme gives i Sygdommens Begyndelse, ikke sjældent ganske helbreder samme.

Mød Blodgang i ringere Grad med hvide, slimebe Udtømmelser, belagt Tunge, klisteragtig Smag, Kvalme eller Opkastning af Sliim er ofte *Pulsatilla* alene tilstrækkeligt til Helbredelse, eller ogsaa *Nux vomica*, naar hyppige, smaa,

med Excrementer blandede, Udtømmelser finde Sted med Stoltrang og stærke Smerter i Navleegnen.

### 8. Cholérine.

Herved forstaaer man saavel den i mange Hebe Somre epidemisk optrædende Brækning og Diarrhoe, (europæisk Cholera), som ogsaa de hyppige lettere Anfald, som indtræde paa den Tid, den asiatiske Cholera grasserer, og som aabenbart maae antages at være denne Epidemies Indvirkning paa særlig disponerede Personer. Den karakteriserer sig, som bekendt, især ved hyppig Afgang, først af Excrementer, dernæst af galdeagtige eller vandagtige Masser gennem Stolgangen og ved galdeagtige, slimeede eller vandagtige Brækninger med større eller mindre Besværligheder i hele Legemet, saasom Underlivs- og Mavesmerter, Ungstelse, Tørst, Svælfelse, Krampe i Læggene.

Hovedmidlerne imod Cholérine ere *Ipecacuanha* og *Veratrum*.

*Ipecacuanha* passer, naar Opkastningen er fremherskende, naar slet ingen Diarrhoe er tilstede, eller naar samme ere mere galdeagtige eller gulagtige, mindre vandagtige og slimeede; *Veratrum*, naar meget heftige, vandagtige Stolgange ere tilstede, i Forbindelse med Kulde i Lemmerne, kold Sved, Angst, stor Svaghed, blegt, indfaldent Ansigt og Krampe i Læggene.

Et Middel, som ikke sjældent viser sig særdeles helbigt er *Acidum phosphoricum*, nemlig hvis der, medens der grasserer Cholera, skulde vise sig stærke vandagtige Udtømmelser med hyppig Rumlen og Buldren i Maven, meget klæbrig Tunge, stor

Swækkelse og Svøb, for det meste uden nogen som helst Mavesmerte.

Til Forhindring af dette Onde maa man isørigt gjøre opmærksom paa at, navnlig naar en Cholera Epidemie græsser, det næst efter en hensigtsmæssig Diæt, som undgaaer al Overfyldning og Ryddelse af vanffæligt forbrugelige Ting, er aldeles nødvendigt at holde Legemet varmt, især Underlivet.

### 9. Cholera.

Til Trods for de mangfoldige Besværligheder, som denne ondartede Sygdom frembyder, er det dog netop nyttigt og nødvendigt for Lægmand, at han erholder en hensigtsvarende Belæring og Anvisning med Hensyn til samme, da der fremfor Alt ikke er nogen Tid at spille, og Hjælpen maa bringes saa snart som muligt.

Choleraen adskiller sig især fra Cholerinen ved de aldeles farveløse, Miisvand lignende, Udtømmelser oven og nedenfra, ved Kulde i hele Legemet, tør, uelastigt Hud, som beholder Indtrykket af en Finger, Udeblivelse af Urinaffondring, den svage Puls, som ofte ikke er til at høre, den ofte stærke Krampe i Arme og Been, og Legemets pludselige Tab af Kræfter. De almindelige Lægemedler ere i saa Tilfælde *Ipecacuanha*, *Veratrum*, *Camphora*, *Cuprum*, *Arsenic*, *Acid. hydrocyanicum* og *Secale corn.*

*Ipecacuanha* maae kun anvendes i lette Tilfælde, naar Brækningen og Diarrhoen strax begynder, og de øvrige Symptomer ere meget svage, eller ogsaa, naar Udtømmelserne vedblive, efterat Tilstanden i det Hele allerede har forbedret sig.



*Veratrum* er Hovedmidlet i alle Cholera-tilfælde med meget heftige Udtømmelser saavel foroven som forneden, især naar samme ledsages af stor Angst, Kulde, kold Sved, indfaldent Ansigt med blaa Ringe om Vinene og med lang Næse, kold Tunge og koldt Aandedræt, heftige Kolikmerter.

Optræder Choleraen pludseligt med hurtigt Forløb, uden Brækning og Diarrhoe, er der i Huden en blaalig Farve og Jiskulde tilstede, stor Angst, Kvælningssornemmelse, Sukken og Stønnen, Muskelkrampe eller Stivkrampe og Krampe i Rjæberne, kold Tunge og koldt Aandedræt, saa er alene Camphora istand til at hjælpe. Ved Diarrhoe og Brækning med Tørst passer dette Middel aldrig.

*Cuprum* staaer sin Prøve, hvor meget heftig Krampe fordreie Lemmerne, især Fingrene og Tæerne, med Tryk og Sammentrækning i Mavegruben og Brystet, og ved tydelig Rumlen ved Synkningen af Drikke.

*Acid. hydrocyanicum* bringer ofte endnu vidunderlig Redning i de usædvanlig hurtigt forløbende Tilfælde, hvor der i den korteste Tid udvikler sig Lamhed i Aandedræts- og Circulationsorganerne, og hvor den karakteriserer sig ved Asphyxi (Stindød Tilstand), Hullen, Rjæbekrampe eller Stivkrampe.

*Arsenic* passer i de ondartede Tilfælde, i hvilke der strax i Begyndelsen viser sig de betænkligste Symptomer, især stærk Uro og Dødsangst, hurtigt Tab af Kræfterne, svag, forsvindende Puls, uudsluttelig Tørst, Brænden i Maven som af glødende Kul, tørre, sortagtige Læber og lignende Tunge.

*Socale* viser sig isærdeleshed virksomt, naar Stoluttømmelserne ere meget vandagtige og heftige,

ved liden eller slet ingen Brækning, ved hurtig Forsvinden af Kræfterne, Fiskulde i Extremiteterne, meget smertefulde Kramper i Læggene og Benene, Krumtrækning og Sovefornemmelse i samme.

Desuden ere endnu Colchicum og Tabacum to meget vigtige Lægemidler: førstnævnte især ved masseagtig Brækning og Diarrhoe med heftig Pressen i Endetarmen og i Blæren og en Fornemmelse af Fiskulde i Maven, sidstnævnte især ved fremherskende Mandedrætsbesværighed og Kvælnings-tilfælde.

Ved denne Sygdoms overordentlig hurtige Forløb maa isørigt Lægemidlerne gives i hurtig Gjentagelse, ved stor Hæftighed ofte hver 5—15 Minuter. Tillige maa den som oftest aldeles undertrykte Hudvirksomhed understøttes ved Varme i Sengen, og fremkaldes ved varme Stene eller Frotteren med uldne Stykker, naar Lemmerne eller maafee hele Huden lider af Kulde. Imod Tørsten anbefales som oftest koldt Vand i smaa Portioner, dersom det udtrykkelig forlanges, ogsaa M. Thee af alle Slags maa ganske undgaaes, kun naar der forlanges varm Drikke kan heft Vand eller heet Thee af Lindeblomster indrømmes.

## 10. Forstoppelse og haardt Liv.

Forstoppelse forekommer ved mange acute Sygdomme, uden derfor at være et besværligt eller farebringende Symptom; den er endogsaa i mange Tilfælde ønskelig og normal, saaledes f. Ex. i de første Dage efter Nedkomsten, i mange Betændelsestilfælde etc. Man vogte sig derfor overhovedet i feberagtige Sygdomme strax at tage Forholdsregler mod

dette formentlige Onde, men vente roligt, om ikke Naturen selv bringer Abningen i Orden igjen. Kun hvor Excrementsamlinger i Underlivet gjør sig bemærkelig, og der deraf skulde opstaa Blodtilstrømning til Hjernen, eller hvor Afgangens lader vente altfor længe paa sig, maa samme i acute Sygdomme befordres ved kunstige Midler, men ogsaa da alene ved en simpel Band- og Olieclysteer, saa meget mere naar, som det som oftest er Tilfældet, kun den mekaniske Forhærdelse og Samling af Excrementerne i Endetarmen er at overvinde. Kun naar de øvrige Symptomer passe dertil, anvende man Nuxvomica, Opium eller Bryonia derimod. Det samme gjælder ved Forstoppelse hos Nyfødte, der som oftest kun hidrører fra for feed Mælk eller fra utidig Madning.

Den habituelle Haardtlivethed, d. e. den vedblivende Tendens til Forstoppelse og haardt Lid hos Personer af forøvrigt tilsyneladende Velbefindende, kan foranlediges af de meest forskjelligartede Omstændigheder og sygelige Tilstande, som ofte ere meget vanskelige at opdage, og som udkræve den omhyggeligste Undersøgelse af hele Legemet. En regelmæssig og hensigtsmæssig Diæt, Udgaaelse af al Overlæsselse af Maven med svært fordøielige Spiser, passende Legemsbevægelse og den Bane, at gaae tilstols til en bestemt Tid, vil her meget ofte være tilstrækkeligt til at hæve eller lette dette Onde, idetmindste altid have bedre Virkninger end de kun som Palliativ virkende og derfor ofte skadelige Afføringsmidler. Især er i slige Tilfælde meget at vente af Gymnastiken, de saakaldte Frisvælder, især hos meget stillestående Personer og for Kvinder. Udkræver Ondets Haardnakethed Lægemidler, saa

ere (her ganste affect fra de Tilfælde, hvis Aarsag maa søges i enkelte Organers særdeles Forandringer) Hovedmidlerne: Bryonia, China, Nux vomica, Opium og Sulphur, som endogsaa ofte formaa at bevirke en vis Regelmæssighed ved Stoludtømmelsen selv i saadanne Tilfælde, hvor selve Aarsagerne ikke kunne fjernes derved, eller den ved en organisk Omban- nelse stedfindende Forhindring forandres.

Bryonia passer ved Forstoppelse som ind- træder isærdeleshed efter forudgaaende Diarrhoe eller om Sommeren hos Personer, som have Disposition til Congestion til Hovedet og til trykkende Hoved- pine, til Rheumatisme, Kuldefornemmelser, Brede og Hefthighed.

China passer for svagelige, ømfindtlige Per- soner især af Kvindekønnet, hos hvem Stoludtøm- melsen først finder Sted efter lang Trykken og med Smerte i Endetarmen, og der viser sig Tunghed i Hovedet, med Hæde, Pressen i Panden og livagtig Ugrerlighed.

Nux vomica er i de fleste Tilfælde Hoved- midlet, isærdeleshed for alle Stuesiddere, og for alle som lide af Hypochondri og Hæmorrhoidal- tilfælde, naar Haardtlivetheden er ledsaget af Appetit- løshed, Ildebefindende, Oppustethed i Maven og Bugen, Trykken i Maven, Hovedpine, Ulyst til Arbejde, Pirrelighed, en Fornemmelse som om Endetarmen var luftet eller forsnævret, og af hyp- pig eller forgjæves Trang til Stolgang; ogsaa naar Forstoppelsen er foranlediget af Overlæselse i Ma- ven, Graadseri eller standset Diarrhoe.

Opium anvendes ved Tilbøielighed til Stol- gang uden tilstrækkelig Trang dertil med en Følelse af at Endetarmen er luftet, Tunghed og Banken i

Underlivet, Appetitløshed, Tørst, Tørhed i Munden, Blodstigning til Hovedet og Ansigtserødem; især ved Forstoppelse som Følge af Svækkelse eller Lammelse af Tarmkanalen efter langvarige Diarrhoer, Mangel paa Legemsbevægelse, hos kraftige, fuldbloedige, velnærede Personer, hos Frugtsommelige og Batebørn, ved Blyforgiftning, indesklemte Brok.

Sulphur passer i forældede Tilfælde meget ofte efter *Nux vomica* hos Hypochondrister og Hæmorrhoidallidende, hvor der er megen Oppustethed og gjentagen, men frugtesløs Stoltrang.

Foruden disse Hovedmidler kan endnu særdeles nævnes *Graphit* ved langvarigt haardt Liv med besværlig Afgang af haarde, knolde, altfor tyktformede Excrementer, eller ogsaa ved besværlig Afgang af ganske tyndtformede Excrementer, som en Spolorm; *Natrum muriaticum* i meget haardnakke, langvarige Tilfælde, hvor der aldeles ingen Trang eller Fornødenhed viser sig, og Indvoldene synes aldeles uvirksomme, og *Plumbum* ved haardnakket Forstoppelse med heftig Rolik, haard Sammentrækning af Bugen, Sammensnøren af Endetarmen og besværlig Afgang af haarde, knolde eller faaremsgformede Excrementer. \*)

## 11. Hypochondri og Hysteri.

Disse Tilstande, som hovedsagelig bestaa i en sygelig Forstemthed og et pirreligt Sind ere altid kun Følger eller Ledsaagere af en legemlig Sygdomstilstand, og som oftest ere længere og dybere

\*) I den nøjere Tid anbefale amerikanse Homøopather især *Hydrastis canadensis* og *Iris verticolor* mod Forstoppelse.  
Dr. S.

Lidelser i Fordøjelsen, Forstoppelse, Haardtlevethed og Oppustethedsbesvær, at ansee for de eneste Aarsager dertil; for Hysteri ligge tillige ikke sjældent Uregelmæssighed i Menstruationen, Uterussygdomme og Rygmarsklidelser til Grund. Derfor maa der ved sammes Behandling isærbeleseth tages Hensyn hertil, og sammenlignes, hvad der er bemærket om den homöopathiske Helbredelse af disse Fordøjelsesbesværligheder. De tvende Hovedmidler ere som Følge heraf som oftest *Nuxvomica* og *Sulphur*. Forværres Gemytsymptomerne, saaledes som det ikke sjældent skeer, indtil virkelig Livslede og virkelig Tungfindighed, saa ere fremfor alt *Arsen* og *Aurum* at anbefale. Lige Udsvævelser i Kjærlighed, Sættab eller Onanie til Grund for Lidelsen, saa ere *China*, *Acid. phosph.*, *Ferrum* og *Calcareo* særdeles virksomme. Hos hysteriske Jomfruer og barnløse Koner ere foruden de Lægemidler, som nærmest have Hensyn til den forstyrrede Fordøjelse, især *Pulsatilla*, *Platina* og *Sepia* af megen Virkning, og ved Forstyrrelser med Hensyn til Maanedsfloppet maa man tage Hensyn til, hvad der er bemærket desangaaende i de betræffende Kapitler.

## 12. Udsvænding i Underlivet.

Den usædvanlig rigelige Dannelselse og Ophobning af Vinde hidrører i Almindelighed fra Fordøjelsesvagthed og forekommer derfor meget ofte i Forbindelse med Hypochondri, Hæmorrhoider, haardt Liv, Mavekrampe og andre Sygdomme i Underlivet. I saadanne Tilfælde optræde disse Besværligheder ikke alene efter Nydelsen af oppustende Spiser, men overhovedet efter ethvert Maaltid og

Characterisere sig da især ved Mavens og Bugens kvælende Oppustethed i Forbindelse med Uro og Uengstelighed.

Er der gaaet en Rydelse af oppustende Spise forud, saaledes navnlig af Raal og Urtegemyse, Løg og utilstrækkeligt afgjæret Æl, er Oppustetheden betydelig uden særdeles Koliksmærter, Mandedrættet indskrænket med almindelig Hebe og Uro, og afgaa Vinde saavel foroven som forneden med nogen Lettelse, saa hjælper China bedst.

Viser der sig efter ethvert Maaltid en Følelse af Overfyldthed og Oppustethed af Mavepartiet og Underlivet med Besvær af tætsluttende Klædningsstykker og Baand, Fornemmelse som af en stor Byrde i Underlivet med Knurren og Rumlen og Omfindtlighed ved Tryk, Tungthed i Hovedet, Følelse som om Endetarmen var luffet, Fortrædelighed og Mismod, saa er *Nux vomica* særdeles passende.

Sulphur er ofte særdeles nyttigt i de værste og ældste Tilfælde; hvor Fordøielsern aldeles er standset, hvor Standsning i Leveren, Hæmorrhoider og andre Underlivssygdomme ere tilstede i Forbindelse med Oppustethed af Maven og Bugen, Bandsammenløben, Halsbrynde, daarlig, raadden Mundsmag, heftig Kolik, medens Oppustetheden skifter Sted og Vindene lugte ilde.

Endnu ere følgende Symptomer at bemærke:  
 Ved Vinde, som flytte sig, passer især: *Aurum*, *Carbo veget.*, *Causticum*, *Colchicum*, *Hepar sulphur.*, *Nux vomica*, *Phosphor*, *Sulphur*.

Ved let afgaaende: *China*, *Graphit*, *Mercur*, *Phosphor*, *Veratrum*.

Ved meget stinkende: Arsen, Asa, Carbo veget.,  
China, Pulsatilla, Sulphur.

Ved lugtfrie: Bellad., Lycopod.

Ved Fordærvelse af Maven med meget fede  
Spiser: Pulsat., Arsen, Carbo veget.,  
China.

Ogsaa ved denne Lidelse er forøvrigt ligesom ved  
Forstoppelse, fremfor alt Gymnastik et Hovedmiddel.

### 13. Brok, Larmbrok.

Broktilfælde hos Borne (saavel Lyskebrok som  
Laarbrok) fordrer, at der bæres et godt passende  
Brokbaand, da deres radicale Helbredelse ved An-  
vendelse af indre og ydre Lægemidler ikke kan ventes.  
Broktilfælde hos smaa Børn læges i de fleste Til-  
fælde af sig selv eller ved Brugen af Nux vo-  
mica og Cocculus; ved Lyske- og Laarbrok bør  
derfor alle Baand og Bind undgaaes, kun ved  
Navlebrok maa anvendes forsigtige Strimler af  
Gesteplaster, som oftere maa fornyes.\*)

Ved indflemte Brok maa altid snarest muligt  
tilkalbes Lægehjælp, for om muligt maaske at til-  
veiebringe en Tilbagetrængen (Reposition); dog er  
det en Kjendsgjerning, at en saadan ofte først da  
lykkes, naar de passende homøopathiske Lægemidler  
(Aconit, Nux vom., Opium, Sulphur) iforveien ere  
anvendte.

Aconit maa anvendes først, naar det inde-  
flemte Broksted er meget smfindtligt ved enhver  
Berørelse, er rødt og hedt, med brændende Fornem-  
melse i Bugen, almindelig Hebe og Uro, Ildebefin-  
dende, galdeagtig Opkastning.

\*) Eller en elastisk Navlebandage.



*Nux vomica* passer, naar der ikke er Tegn til Betændelse eller disse kun ere meget ringe, men naar der derimod viser sig en stor Oppustning af Bugen, heftige Opstød, eller der er gaaet Diætfel, Forkjølelse eller heftig Uergrelse forud.

*Opium* er Hovedmidlet, naar Opkastningen bliver ilbelugtende, excrementagtig, naar Ansigtet bliver rødt og Underlivet trommeagtig opspændt.

*Sulphur* og *Acidum sulphuricum* maa anvendes, naar efter Anvendelsen af *Aconit* de betændelsesagtige Symptomer have tabt sig, men Brokket ikke laber sig tilbagebringe, og der maaske tilmed viser sig suur Opkastning.

I Tilfælde af en Forstoppelse, som ikke vil lade sig overvinde, med voldsom Oppustning af Underlivet maa ogsaa *Capsicum*, *Plumbum* og *Thuja* forsøges.

De samme Midler anvendes i Tilfælde af at der skulde indfinde sig Opkastning af Excrementer, (Misserere) i Følge Tarmslyngning eller Sammensnøren eller en anden mechanisk Aarsag.

Skulde der kunne befrygtes Kolbbrand i de indklemte Dele, naar Smerterne mildnes og de ubønhørlige Subpartier farves mørke, saa er der maaske endnu at vente Hjælp af Arsen eller *Lachesis*.\*)

#### 14. Drm.

Tidligere antog man, at Indvoldsormene opstod af sig selv i Menneskets Tarme (saaf. *generatio aequivoca*), og at en vis Legemsconstitution

\*) Ofte er indklemmt Brok saa farligt at Operation ikke bør opsættes.  
Dr. S.

saavel som meel- og sukkerholdig Koft frembragte Disposition dertil. Nu veed man ved ligefremme Forsøg, at den Slags Snyltegjæster kun kunne opstaae af Æg eller Embryoner, som udbendig fra komme ind i Legemet. Rigtignok er det muligt og maaske endog sandsynligt, at der ved denne, som ved enhver anden Sygdom, hører en vis Disposition til at udvikle disse Æg og give dem Livskraft, og at derfor det ene Menneske er mere udsat for samme end det andet.

Om Bændelormen veed man med Bestemthed, at den udvikler sig af de saakaldte Tinter, som ofte findes i stort Antal hos Sviin og Hornkvæg, og som saaledes komme ind i Menneskets Mave og Larme ved Rybelsen af deres ukogte Kjød. Hertil maa altsaa tages behørigt Hensyn til Undgaaelse af dette Onde.

De Besværligheder, som Bændelormen pleier at give Anledning til, ere saa mangfoldige og tilbels saa ubestemte, at dens Tilstedeværelse kun med Visshed kan erkjendes, naar man seer enkelte Dele af den afgaa; alle andre Tegn ere bedragerske. Isørrigt ere disse Besværligheder ikke altid saa betydelige eller saa skadelige for Legemet, at de synes at udfordre Drmens hurtige Død og dens mekaniske Bortfjernelse; ofte vil maaske Mobbhydelighed være Hovedbevæggrunden til at stille sig af med den. Men selv i Tilfælde, hvor Bændelormen tilsyneladende ikke foraarsager nogen som helst Besværighed, er dog dens Bortfjernelse indtrængende at tilraade, da den for det første ved dens fortsatte Pirring paa Larmenes Slimhinde kan give Anledning til sygelige Tilstande, som hvert Øieblik kunne udvikle sig i betydelig Grad, og for det andet, fordi

Tilstedeværelsen af flige Parasiter (Snyltene) endnu kan give Anledning til andre farligere Lidelser. Thi det er blevet en utvivlsom Kjendsgjerning, at ogsaa Mennesket ved Indsørsel af modne Dele af Bændelormen eller dens Æg i dets Mave kan blive tintsyg ligesom Svinet, og selv om ogsaa Tinternes Nærværelse i Mufflerne næppe kunne give Anledning til Besværligheder eller ikke foranledige nogen Sygdom, saa ere de dog ulige farligere, naar de trænge ind i Hjertemufflerne, i Diet eller i Hjernen. Og disse Tilfælde ere ingenlunde saa meget sjældne, som man maaste skulde troe, da alene den berømte Zielæge Gräfe i Berlin i Løbet af saa Aar har kunnet paavise henimod 60 Tilfælde af Dientinter, som tydeligt have kunnet iagttages ved Hjælp af Diespeilet.

Rigtignok kan Bændelormens Død og Bortfjernelse ikke opnaaes ved homöopathiske Midler, da disse kun ere istand til at helbrede, men ikke kunne bræbe. Dertil maa man derimod bruge meget stærkt virkende Midler, som ere Bændelormen specifikt fjendtlige, saasom Barken af Granatroden, Rousso-blomster, Bregnerod etc., men paa ingen Maade anvende disse eller endogsaa hemmelige Midler paa egen Haand, men henvende sig til en fornuftig Læge, hvem det vil være let, at paavirke Ormens Afgang med dens Hoved. Bedst skal dette kunne lykkes i Maanederne Marts til Mai, fordi Ormen i dette Tidsrum synes i og for sig at være svagest og taber enkelte Led. Efter mine Erfaringer kommer man næsten altid lettest og sikkest til Maalet ved Anvendelsen af et stærkt Afkog af Granatrodens Bark, kun maa man ikke glemme, at der gives to forskjellige Arter af Bændelorm, af hvilke den ene (*taenia*

*mediocanellata*) er ulige vanskelige at fordrive end den anden.

Meget ofte hæves alle Besværligheder for bestandig eller ialtsalb for længere Tid ved nogle Jndgiwter *Filix max* eller *Cicuta*; undertiden afgaaer ogsaa ved længe fortsat Brug af dette Middel den hele Drm med Hoved lidt efter lidt. Ved meget heftige, brændende, bævende Smerter i Underlivet, stærk Spøtsamling, betydelig Kulbefornemmelse og Ømsindtlighed med Kulde, en Fornemmelse som om Underlivet var indfaldent eller af Gnaven i Maven, med stærk Kvalme og Følelse af at Noget sad fast i Svælget, bruger man nogle Jndgiwter *Sabadilla*, som dog ikke maa gives for hurtigt efter hinanden.

Ogsaa kunde det være ret hensigtsmæssigt, efter Bændelormens Afgang at give nogle Jndgiwter *Calcareo carb.* og *Sulphur*, skiftende hver tredje Dag, for at udrybde den Disposition i Tarmkanalen til at paavirkes af disse Parasiter, hvoraf mange Individer aabenbart lide; særlig er dette at anbefale for scrophuløse, svampede Legemsconstitutioner.

Paa dette Sted er det ogsaa passende at bemærke Noget om de i den nyeste Tid saa meget omtalte *Trichiner*.

*Trichinerne* ere smaa, tynde og traadagtige Drme, som neppe ere at opdage af det ubevæbnede Øie, de ere omtrent en femtedeel Linie lange, og de indesluttet af særegne runde, citronfarvede Kapsler; disse Kapsler findes undertiden i uhyre Mængder (i et Lod Kjød fra 1000 til 100,000) mellem de enkelte Trevler i trichinsyge Sviins røde Kjød. Indspræs nu Noget af saadant trichinholdigt Kjød

i uløgt Tilstand i et Menneskes eller andet Batteredes Mave eller Tarme, saa falde disse Trichiner først ud af deres Kapsler og udvikle sig derefter med stor Hurtighed. Allerede 24 Timer efter deres Overførelse i Tarmen ere de modne til Forplantning, saaledes at Befrugtningen kan finde Sted; og fra den sjette Dag, afgaa enkeltvis de unge Embryoner fra den kvindelige Trichin, som imidlertid er bleven dobbelt saa stor som den mandlige, (omtrent en Linie lang). Denne nye Generation, de saakaldte Tarmtrichiner, er det, som forarsager den egentlige Sygdom. Thi ikke alene ophobe de sig i Tarmen i uhyre Antal, men gjennebore Tarmvæggen og gaa ind i Bughulen; derfra trænge de sig ved at gjennebore den Hinde, som indvendig beklæder Underlivet, ind i de nærliggende Muskelvægge, tilbeels ogsaa gennem Mellemgulvet i Brysthulen og i Hjerteposen. Ved at krybe fremad i det løse Bindevæv, som omslutter og trækker sig igjennem Legemets Muskler, naae de til Legemets yderste Steder, ind i Fingrenes og Tærnes Muskler. Men Tilintetgjørelsen gaaer kun udover Trevlernes kjødagtige Indhold, det ydre Hylster forbliver uforstyrret, og inden i dette Hylster begynder den unge Orm nu at voge, og at udvikle sine indtil da ufuldstændigt dannede Indvolde. I Begyndelsen ligger den udstrakt i Muskeltrevlens Rør, men naar den har naaet en vis Størrelse, saa krummer den sig stadig mere sammen, saaledes at den til Slutningen faaer Udseende af flere Spiralgange. Trevlrøret udvider sig efterhaanden efter Ormens Omfang og der opstaaer ved en Slags Styrken efterhaanden den ooenævnte temmelig tykvæggede Kapsel, som efter Aar og Dag ved Indsugning af Kalksalte

antager sin senere faste og uigjennemsigtige Bessaffenhed. Her lever nu Musseltrichinen sandsynligvis i mange Aar uden videre Ulempe for den Syge, indtil den enten dør, sandsynligvis ved Forkalkning, eller den ved en eller anden Omstændighed kommer ind i Tarmen eller Maven paa et Menneske eller et Pattedyr, for der at udvikle sig videre og føde Unger.

Det er let at fatte, at en saadan Udvikling af saa store Dyremasser og deres Udbredelse i hele Legemet ikke kan finde Sted uden i høj Grad at virke forstyrrende paa Organismen, og visse ere de herhenhørende Sygdomstilfælde sædvanligt temmelig heftige, undertiden endog saa dødelige, ja hos de fleste Pattedyr virker en stor Dosis trichinsygt Kød med samme Sikkerhed som en dødelig Gift. De første Sygdomssymptomer ville, især hos Dyr, vise sig i Tarmenes Slimhinde og i Forhold til Trichinernes Mængde bestaae i Pirrelse, Diarrhoe, Katarrh og Betændelse. Ved Epidemien i Plauen, hvor over 30 Mennesker bleve angrebne, begyndte Sygdommen med en Fornemmelse af Sønderslaethed og heftige smertelige Fornemmelser i Lemmerne, efter nogle Dages Forløb indtraadte da pludselig, meest om Natten, en betydelig Hævelse især i Ansigtet. Smerterne og den tiltrædende Feber lode ikke Patienten have Ro hverken Dag eller Nat. De heftigst angrebne kunde ikke strække deres Lemmer uden at føle Smerter og laa som oftest med halvtbøjede Arme og Been som en Klob i Sengen. I Sygdommens 2den eller 3die Uge indtraadte, medens de lettere Tilfælde efterhaanden helbrebedes, hos de værre Angrebne endnu en almindelig, meget smertelig Svulst. Om ogsaa

Trichinsygdommen endnu ikke altid eller med Lethed kan kjendes, og der senere sandsynligvis ville findes bedre Tegn til dens Erkjendelse, saa synes dog allerede den ejendommelige Smerte og Vanskelighed i at bevæge Lemmerne, saavel som den besynderlige Ansigtssvulst og Hævelse at kunne gjælde som karakteristiske Tegn. Iøvrigt kunde denne Sygdom i dens Begyndelse let forveksles med Rheumatisme eller vel endog saa Typhus, men en nøiagtig Betragtning af det efterfølgende karakteristiske Sygdomsbillede maa dog i de fleste Tilfælde lede til den rigtige Erkjendelse af Sygdommen. Bludselig Dphovnen af Ansigtet, især af Vielaagene, efter at Patienten allerede i flere Dage har følt sig som sønderflaaet, og mistet Appetiten; denne Hævelse forarsager kun Spænding, men ingen Smerte; Feber med meget hurtig Puls og med rigelig, ofte ildelugtende Sved; Bevægelse af Arme og Been smertelig og vanskelig; Musklerne svulne og spændte, ømfindtlige for Tryk og for enhver Bevægelse, halvbøjet Stilling af Lemmerne; i de værste Tilfælde er Patienten aldeles ude af Stand til at bevæge sig og meget ømfindtlig; Mave-Tarmkatarrh med rødlig, noget belagt og tør Tunge, Hævelse i Fødder og Laar, naar Ansigtshævelsen i Løbet af nogle Dage er forsvunden; hurtig indtrædende Hudvandsot.

Skvad nu Behandlingen angaaer, saa er Trichinernes Fjernelse ubetinget den første og meest paatrængende Betingelse. Et stærkt Brækmiddel kunde rigtignok føre til Maalet, naar Smitten

bliver opdaget højest 4—5 Timer efter Nybelsen. Senere maae man forsøge For drivelse ved stærke Afføringsmidler, hvortil man, for tillige at dræbe Trichinerne, kan tilføje et saakaldet Orme-middel. For at opnaae det sidste synes Cuprum aceticum eller oxydatum bedst at passe. Har Gjennem boringen af Tarmvæggen af de nysbødte Trichiner allerede fundet Sted og er deres Vandring ind i Musfeltervlerne begyndt, saa er der rigtignok liden Udsigt til, endnu at naa dem og dræbe dem med den Slags Midler. Der bliver da ikke andet tilovers, end at anvende homøopathiske Midler, som passe til de tilstedeværende Symptomer, og navnlig imod vandagtig Hævelse i Ansigtet Arsen eller Ferrum, imod Musflernes Stivhed og Smfindtlighed Rhus toxicod. eller Arnica, imod Hudvandsfoten China, Helleborus, Arsen. Det kan isørgt ikke betvivles, at man ved større Erfaring vil finde et sikkert Middel, som specifikt dræber Trichinerne og afbryder eller aldeles forhindrer deres Forstyrrelser.

Til at undgaae Smitten af trichinsygt Kjød gives der naturligvis kun eet Middel, nemlig aldeles at afholde sig fra at nyde raat eller utilstrækkelig saltet eller røget Svinekjød. Mikroskopet og den saakaldte Kaliprøve tilbyder rigtignok Midler til at opdage, om der findes Trichiner i Svinekjød, men desværre ere disse Midler utilgængelige for Slagteren og for Kokkepigen. Saameget er imidlertid fastslaaet ved direkte Forsøg, at alle Musfeltrichinerne dræbes i deres Kapsler ved Røgning og ved stærk Saltning og Røgning, og at saaledes endogsaa stærkt trichinholdigt Kjød derved gøres uskadeligt. Isørgt maa det overhovedet i saa Henseende stærkt



tilraades at vise den største Forsigtighed, thi Slagte-  
dyrene ere ikke de eneste Stabninger, som afgive  
deres Indvoldsorme til Mennesket. Ogsaa fra andre  
Dyr tilegne vi os Snyltegjæster, deels derved, at  
vi nyde Spiser, som ere gjorte urene ved deres  
Excrementer. Saaledes er det f. Ex. næsten utvivl-  
somt, at den almindelige Spolorm paa denne  
Maade kommer ind i Barnets Legeme, da det ved  
at vælge sine Spiser kun er lidet betænksomt, og  
derfor let ved at nyde nedfalden Frugt, Rødder etc.  
kan synke et eller andet derpaa siddende Æg eller  
et halvtudviklet Dyr. Det er fremdeles en Kjends-  
gjerning, at Hunden, i dens nøie Samliv med Men-  
nesket, ved at gjøre Spiserne urenlige, kan be-  
fænge Mennesket med en meget farlig lille Bændel-  
orm (*Taenia Echinococcus*), som kan foranledige  
store Vandblærer med fast Hinde i Leveren, Lungen  
og andre Indvolde, som kunne forvolde Døden.  
Ligeledes forekommer i Hundens Næsehule en næsten  
fingerlang Snyltegjæst (*Pentastomum taenioides*),  
hvis Æg trænges frem udvendig med Næfslim-  
hindens Affondring, og ved Besnøftning af Spiserne  
eller af Menneskets Hænder kan overføres til Men-  
nesket.

Med Hensyn til Besværligheder, som frem-  
kaldes ved Spring- og Spolorme see under Børne-  
sygdomme.

### 15. Hæmorrhoider.

Man betegner med dette Udtryk de Hævelser  
og knudeagtige Udvidninger, som paa Grund af  
uregelmæssig Blodcirculation opstaa i Endetarmens  
Blobaarer; de briste ikke sjældent og foranledige derved

periodiske Blødninger. Allerede heraf fremgaaer det, at Hæmorrhoider kun ere Symptomet paa en anden Sygdom og kun da grundig kunne helbredes naar Aarsagen til den er blevet hævet. Enhver Sygdom, som indvirker forstyrrende paa Blod-circulationen, kan give Anledning til Dannelsen af Hæmorrhoider; især gjælder dette om visse Arter af organiske Hjerte- og Lungesygdomme, saavelsom chroniske Lidelser i Fordøjelses og Underlivsorganerne. Da imidlertid mange af disse Sygdomme netop ikke ere til at helbrede radicalt, og der, efter en Hæmorrhoidalblødning noget efter indtræder en betydelig Bedring i Almenbefindendet, saa maa Behandlingen af Hæmorrhoider ofte kun blive en symptomatisk og indskrænke sig til at ophæve de meest generende Besværligheder, men maa sjelden gaae ud paa, ved ydre chirurgiske Midler at fordrive Udvikelsen af Venerne, og ganske undertrykke de ofte kritiske og lettende Blødninger.

Angaaende Hæmorrhoidernes radicale Helbredelse, hvorved der imidlertid stedse maae tages Hensyn til det dem foranledigende Grundonde, saa ere Hovedmidlerne Nux vomica, Sulphur og Belladonna med Hensyn til hvilke man maa sammenligne, hvad der er sagt om vedkommende Underlivsygdomme.

Med Hensyn til den symptomatiske Behandling maae følgende Bemærkninger være tilstrækkelige.

Imod den ofte besværlige Alse i Endetarmen virker bedst Aconit, Ignatia, Nux vomica, Sepia eller Sulphur; er Smerten mere brændende og stikkende, saa er Arsen eller Causticum at foretrække. Indtræder Rødme, Svulst eller Betændelse af Knuderne eller deres

Omgivelser, saa passe især Aconit, Arsen, Belladonna, Chamomilla eller Pulsatilla; ved heftige Smerter i Underlivet og Kolik Colocynthis, Nux vomica, Pulsat. eller Sulphur.; ved Gliimafgang bagfra Antimon, Capsicum, Carbo veget., Mercur, Pulsat.

Imod hyppigt blødende Knuder hjælper bedst Belladonna og Sulphur., eller ogsaa Aconit, Capsicum, Cham., Kreosot og Pulsat.; bliver Blodafgangen for stærk og overvældende, saa maa Ipecacuanha anvendes, eller, naar dette ikke hurtigt hjælper, Kreosot, og i meget betænkelige Tilfælde koldt Vand eller Is.

## 16. Urinbesværligheder og sygelig Beskaffenhed af Urinen.

I de fleste Tilfælde foraarsages Smerter saavel som Vanskelighed ved Urineringen hos Borne af Blæresten eller Forsnevninger i Urinrøret; men da nu disse tvende Lidelser formedelst Diagnosen Vanskelighed og deres Behandling alene maa overlades til Lægen og Chirurgen, saa kunne her kun de lettere Tilfælde omtales, som betinges af andre, ikke mekaniske Forhindringer, saasom Krampe, Hæmorrhoider etc.

Mod besværlig, meget smertelig Urinafgang med stærk Trængen og ringe Afgang er sædvanligt Belladonna Hovedmidlet, især naar der er Symptomer tilstede, som tyde paa en Betændelsestilstand; ved ringere Smerter ere Aconit og Pulsatilla de passende Midler; kun hvor et Stød eller et Fald paa de paagjældende Dele er gaaet forud,

eller naar Anvendelsen af spanste Fluer, ubvendig eller indvendig, har forarsaget Besværlighederne, maae Camphora anvendes. Opstaaer Ondet under Svangerskabet eller som Følge af undertrykte Regler, saa passe isærdeleshed Belladonna og Pulsatilla; fremkommer det som Følge af spiritusøse Drikke eller frisk, ugjæret Øl, maa man bruge Nux vomica og Pulsatilla, som Følge af Stræk eller Uergrelse, Aconit og Chamomilla, som Følge af tilbageholdt Urinladning under Rjørsel, Nux vomica.

Fremkommer der trods stærk, smertelig Trængen slet ingen Urin eller kun ganske ubetydelig draabevis, saa maae Cantharis og Mercur anvendes, er der Hæmorrhoider tilstede (en Omstændighed, som forresten yderst sjældent virkelig er tilstede, men hvad saa meget oftere urigtigt forudsættes) saa passe Nux vomica og Sulphur, ligeledes ere Cantharis og Mercur Hovedmidlerne, naar Afgangen er blodig eller slimet.

Ved altfor stærk Trang til Vandladning, uden at man dog føler Smerte eller Besværlighed, passe Argentum, Belladonna, Petroselinum, Pulsatilla og Spigelia; ved Trang om Natten: Conium, Nux vom., Belladonna; ved uvilkaarlig Afgang af Urinen om Natten Pulsatilla, og foruden dette endnu Belladonna, Carbo veget., China, Hepar sulph., Sulphur.

Mød de ufrivillige Afgange af Urin, som betinges af Svækkelse eller Lammhed i Blærens Lufkemuskel, ere Hovedmidlerne Belladonna, Causticum, Dulcamara, Plantago, Pulsatilla og Sulphur; afgaaer Urinen som Følge af stærk

Hofte eller Latter, faa maa Antimonium Crudum, Ferrum og Zincum fortrinnsviis anvendes, fom Følge af heftig Bevægelse, Bryonia og Pulsatilla.

Med Hensyn til felve Urinens Befkaffenhed gjælde følgende Bestemmelser, fom dog naturligviis ikke for fig alene, men kun i Forbindelse med de øvrige Sygdomssymptomer, kunne have en betydelig Indflydelse paa Balget af Midlet.

Bed lys, vandagtig Urin: Conium, Ignatia, Colocynthis, Arg. nitr.

Bed rød og heed Urin: Aconit, Belladonna, Bryonia, Mercur, Phosphor.

Bed bruun Urin: Bryonia, Antim. crudum., China, Mercur, Phosphor, Pulsatilla.

Bed fortagtig Urin: Colchicum, Lycopodium, Asparagus.

Bed grønlig Urin: Camphora, Colchicum, Jod, Magnesia carb., Rheum.

Bed uflar Urin: Antim. tartaricum, Arsen, China, Mercur, Sepia.

Bed hvidlig, mælleagtig Urin: Dulcamara, Jod, Muriat. acid., Phosph. acidum.

Bed rødligt Bundfald: Belladonna, Graphit, Natr. mur., Pulsatilla.

Bed hvidligt Bundfald: Calcareæ, Mercur, Phosphor, Sepia.

Bed guulagtigt Bundfald: Baryt, China, Cuprum, Lycopod., Phosphor.

Bed slimet Bundfald: Aurum, China, Dulcamara, Mercur, Natr. carb.

Bed trevlet Bundfald: Cannabis, Cantharis, Mercur, Nitri acidum.

- Ved sandagtigt Bundfald: Calcarea, Lycopod., Natrum mur., Pulsat, Sepia, Silicea,  
 Ved leret Bundfald: Ammon. mur., Arsen, China, Sassaparilla, Sepia, Sulphur.  
 Ved krystalagtigt Bundfald: China, Ferrum, Colocynthis, Lobelia.  
 Ved blodigt Bundfald: Arsen, Cantharis, Colchicum, Carbo veget., Ipecac., Lycopod., Mercur.  
 Ved slimet Bundfald: Calcarea, Cantharis, Mercur, Pulsatilla.  
 Ved fedtagtig (Fedthinde) Urin: Calcarea, Hepar sulph., Jod, Sulphur.\*  
 Ved materieagtig Urin: Cannabis, Cantharis, Clematis, Mercur, Lycopod.  
 Ved æggehvideholdig Urin: Cantharis, Colocynthis, Ferrum, Mercur, Phosphor, Colchicum, Hep. sulph.  
 Ved sukkerholdig Urin: Dulcamara, Ferrum, Jod, Ammonium.  
 Ved skarp Urin, som gjør huden sløs: Cannabis, Causticum, Jod, Kreosot, Mercur, Phosphor, Senega.  
 Ved skarplugtende Urin: Antim. tart., Asa, Phosphor, Rhodod.  
 Ved suurlugtende Urin: Calcarea, Graphit, Natrum carbon., Petroleum, Sulphur.  
 Ved raadbentlugtende Urin: Calcarea, China, Nitri acidum., Phosphor, Rhododendron, Sulphur.

## 17. Betændelse og Svulst i Testiklerne.

Optræder denne som Følge af et Stød eller en Kvæstelse, saa maa Arnica anvendes udbvendigt og indvendigt, bliver der i længere Tid herefter nogen Svulst og Ømhed tilbage, saa passer Conium.

Optræder den under eller efter et Udflod af Sliim fra Urinrøret, saa anvendes Pulsatilla og Mercur, skulde der vise sig overordentlig heftige Smerter med Feber, er det hensigtsmæssigt, i Forvejen at give nogle Indgiver Aconit.

Ikke sjældent springer ved Faarefyge Svulsten fra Drefjertlen ned i Testiklerne, i saa Fald vil Mercur hjælpe, eller ogsaa Bella'donna, naar der viser sig Hjernesymptomer.

Imod Chroniske Svulster og Forhærdelser i Testiklerne, ere især Aurum, Clematis og Spongia at anvende, imod Vandsamling i Pungens Hud (Vandbrost) Graphit, Jod, Rhododendron og Silicia, imod Formindstelse og Svind (Atrophia) af Testiklerne Jod.

Imod Ringorme paa Pungen er Ant. crud., Aurum, Nitri acidum og Petroleum, imod Røse og Brænden uden Udflæt Ignatia, Mercur og Petroleum de bedste Lægemidler.

## 18. Besværligheder og Uregelmæssigheder ved Reglerne.

Den maanedlige Renselse er for mange Kvinder Kilben til mangfoldige Lidelser og Besværligheder,

som besværr: ofte endnu forøges ved den store Mængde af yndede, men som oftest aldeles unyttige, endog saa skadelige Huusmidler og Kvaakalverier, saa det er fornødent, her at angive de homöopathiske Lægemidler, som passe for de sædvanligste Besværligheder. Først og fremmest kan det ikke tilstrækkelig strengt paatales, at en feilagtig Levemaade, navnlig en uhenfigtsmæssig Paaklædning og en skaanselsløs Fremgangsmaade før eller ved Reglerne, ere af største Indflydelse og ofte den eneste Årsag til de besværlige, ofte farlige Forstyrrelser i samme. Disse Omstændigheder, saavel som navnlig ogsaa en uhenfigtsmæssig eller pirrende Næring, en Forsømmelse af alle legemlige Øvelser, Rattervaagen og en stærkt irriteret Phanthasi etc., maa det tilskrives, at især i store Stæder de fleste Pigebørn strante i Udvillingsaarene, og først efter mangfoldige Besværligheder, navnlig efter blegfottige Tilstande, saa Reglerne i Orden.

Derfor er det ved Behandlingen af disse Besværligheder fremfor alt nødvendigt, at regulere Levemaaden. Ligeledes maa alle drivende Huusmidler undgaaes, fordi de i alle Tilfælde volde Skade; navnlig maae de saa meget yndede Fodbade kun bruges med største Maadehold og Forsigtighed, fordi de i Tilfælde, hvor virkelig Blodmangel er Årsagen til det uregelmæssige Maanedsflo, netop virker modsat og skadeligt, og hvor denne Mangel ikke er tilstede eller er hævet, som oftest ere aldeles overflødige.

Reglernes Udebliven hos unge Piger er næsten altid en Følge af Blegfot, derfor gjælder med Hensyn til Behandlingen af hiin Tilstand, hvad der er sagt med Hensyn til Be-



handlingen af denne. Ere Reglerne for svage, for kortvarige, eller udeblive fra Tid til anden, saa vil som oftest Pulsatilla være det hjælpende Middel efter de Symptomer, som specielt ere anførte som Symptomer for Blegfot. Viser der sig istedetfor Perioden Næseblod eller Blødning fra andre Dele, med Svimmelhed, Hovedpine etc., saa ere fornemmelig Belladonna og Bryonia at anvende.

Ligesom der ved den første Indtrædelse af Menstruationen for den unge Pige ofte fremkommer Besværligheder, saaledes fører ikke sjældent dens Ophør i de senere Aar sygelige Tilstande med sig. Især er det herved Symptomer af Blodstigninger, saasom Hjertebanken, Hovedpine, flyvende Hebe, som indtræde Tid efter anden og ofte foranledige stor Uengstelighed. Foruden Aconit, Belladonna, Sepia er navnlig Sulph. acid. et Hovedmiddel mod slige Blodstigninger (saakaldte Overstrømninger af Hebe med pludseligt Udbrud af Svøb).

Imod heftige Underlivssmerter ved Periodens Indtrædelse, Menstrualkolik (sædvanligt ogsaa kaldet „Krampe“) ere de hensigtsmæssigste Midler Belladonna, Chamomilla, Cocculus, Coffea, Kali carb. Nux vomica, Platina, Pulsatilla og Sepia; og især Belladonna ved langsomme eller svage Regler, ved Trængen nedad i Underlivet mod Rjønabelene, Hebe og Rødme i Ansigtet, Hovedpine, Svimmelhed, Chamomilla ved for tidlige og stærke Regler, heftig Kolik med stor Ømfindtlighed i Underlivet for Tryk, tourelignende Trængen fra Krynset af, diarrhoeagtig Abning, mørkt, klumpet Blod, bleg Ansigtssfarve. Cocculus ved sparsom Blodafgang, trykkende Koliksmarter, Ildebefindende, Svækkelse, Besvimelse, Tryk i Brystet, Suffen, Stønnen, Angst: Coffea ved stærk

Blodflob, Fornemmelse i Maven som om den skulde sprænges eller som om Larmene skulde skjæres istykker, med Hæftighed, Sammentrympen, Tænderstjæren, Strig, Rasten med Kulde og Stivhed i Lemmerne; Kali carb. ved almindelig Mæthed, Rysten, Kulde, Uro, Stjæren og Trykken i Underlivet, som om alt trængte sig ud foruden, Smerter over Krybset, Forstoppelse især ved for tidlige eller for længe vedvarende Regler, Nux vomica ved for tidlige, stærke og længe vedvarende Regler, Udspiling af Underlivet, Ildebefindende, Forstoppelse, Trængsler til Bandladning og Åbning, Hovedpine, pirrelig, fortrydelig og kivagtig Stemning; Platina ved stærk og langvarig Afgang af sort, tykt Blod, trykkende Smerter over Rjønabelene, Ængstelighed, Rlykten, Forsagthed; Pulsatilla ved ringe Afgang af tyndt, vandagtigt Blod, Tungthed i Underlivet som af en Steen, tourelignende Pressen, Kuldefornemmelse, kolde Fødder, Rlykten; Sepia ved sparsomme Regler som efterhaanden gaa over til slimet Udflod, og saaledes vedbliver flere Dage efter Reglerne, ved Kolik og Tryk i Underlivet, Migræne, Tungthed i Lemmerne, Nedslaaethed.

Forekomme Reglerne i Forbindelse med virkelig Krampe og Trækninger i Lemmerne, saa egne sig isærbelesshed Coffea, Secale cornutum, Ignatia, Cuprum eller Coccus til Anvendelse.

Ved overordentlig stærke Regler, ved Blodstyrtninger under Svangerskabet og ved Forløsningen ere Hovedmidlerne: Arnica, Belladonna, Chamomilla, China, Crocus, Ferrum, Ipecacuanha, Kreosot, Pulsatilla, Ratanhia, Sabina og Secale cor-

nutum. I alle de Tilfælde, som ere en Følge af mechanisk Anstrængelse, af Fald, Udvidelse etc. er Arnica Hovedmidlet, især under Svangerskabet og Perioden. Vise Reglerne sig, som det ikke sielbent er Tilfældet, hos svagelige, angrebne, blege og blegfottige Piger og Koner for stærke, langvarige eller for ofte, saa er sædvanlig Calcareæ carb. Hovedmidlet; kun maa samme anvendes i længere Tid med nogle Indgiver i den mellemliggende Tid. Indtræder ved eller efter Forløsningen en overordentlig stærk Blødning, passe hovedsagelig Ipecacuanha, Pulsatilla og Secale cornutum, ved Aborter Sabina og Ipecacuanha. Ved meget betydelige Blodtab, hvor der allerede viser sig Svimmelhed, Kulde og Blegthed i Lemmerne, anvendes især China eller Ferrum. Hos kraftige, fuldblodige Personer, hos hvem Blødningen opstaaer som Følge af Blodtilstrømning, anbefales især Belladonna, Arnica, Sabina, Kreosot, derimod hos svage, udmattede Koner, hos hvem Blødningen isærbelesshed vedligeholdes paa Grund af Svaghed og Livmoderens Uvirkksomhed, China, Crocus, Ferrum, Pulsatilla, Secale cornutum. Ved Afgang af tykt, sort Blod passe Chamomilla, Crocus, Platina, Sabina, ved lyst, vandagtigt Blod Belladonna, China, Ferrum, Ipecacuanha. Tillige er herved et horizontalt Leje og fuldkommen Ro for Legemet absolut nødvendig, alle ydre og chirurgiske Midler maae desuden strengt undgaaes, da kun en Læge eller Fødsels-hjælper hensigtsmæssigt kan anordne og anvende saadanne.

Herved maa forøvrigt endnu sammenlignes,

hvad der er sagt om Sygdomme hos Svangre og Barfeskvinde. Viser der sig iftedetfor den maa-  
nedlige Blodafgang Sliimafgang (hvidt Flob),  
eller indtræder dette regelmæssigt før eller efter  
Perioden, saa er i første Tilfælde, især China  
og Pulsatilla, i sidste Tilfælde Kreosot og  
Sepia de bedste Lægemidler.

### 19. Hvidt Flob.

Denne besværlige og meget udbredte Sygdom  
bestaaer i en katarrhalst Betændelse af Stedens  
Sliimhinde og i sjeldnere Tilfælde af Moderen eller  
Urinrøret, men er rigtignok i saa Fald fordetmeste  
først Symptomet paa eller Følgen af en anden al-  
mindelig sygelig Tilstand i Organismen. Der  
gives rigtignok ogsaa et Slags hvidt Flob, som op-  
rindelig er en reent stedlig, ved local Smitte op-  
staaet Lidelse, men om denne, saavelsom om den  
meget ondartede, som fremkommer som Følge af  
Kræft eller lignende Affectioner i Livmoderen, kan  
her ikke være Tale, paa Grund af at dens Erkjen-  
delse og Behandling udfordrer lægevidenskabelige  
Kundskaber.

Denne Sygdom forekommer hyppigst hos  
Kvinder, som have født, især naar der som Følge  
af Fødslerne hos dem har dannet sig Sænkninger,  
Bøininger eller Fremfald af Moderen, dog heller  
ikke sjældent hos ugifte Piger, meget sjældent hos  
Koner i en fremrykket Alder og Børn, hos  
sidstnævnte som oftest kun som Følge af Orm eller  
af en anden mekanisk Pirring.

I lette Tilfælde viser det sig kun af og til i

nogle faa Dage før eller efter Menstruationen. Den hyppigste Aarsag dertil, især hos Piger, er Blegfot og Blodmangel eller ialtfald Disposition til disse Sygdomme (see Blegfot). Ofte ere talrige Barselsenge, Onani (Selvbesmittelse), Overdrivelse i Brugen af varme Bade, Anvendelse af irriterende Indsprøjtninger, af Moderkrands etc., overhovedet alt, som virker pirrende og svækkende paa Kjønsystemet og Legemet, den directe eller indirecte Aarsag til denne Lidelse. Iøvrigt finder næsten altid under Svangerskabet en forøget Slimaffonndring Sted i Steden, men som paa ingen Maade maa foranlede medicinsk Behandling, naar den ikke bliver betydelig.

Ved Behandlingen af dette Onde, maa der fremfor Alt tages Hensyn til at de indre eller ydre Aarsager, som have foranlediget samme, og som ovenfor ere omtalte, bortfjernes eller mildnes. Og saa Valget af Lægemidlet retter sig forstørstedelen derefter. Saaledes ere ved blegfottige og Svækkelsestilstande fortrinsviis Pulsatilla, Ferrum, Calcarea, China, Natrum mur., Phosphor Hovedmidlerne, ved betændelsesagtig Affection og Irritation Alum., Mercur sol., Jod, Natr. sulph., Sabina, Sepia, Thuja, ved ondartede Sygdomme i Livmoderen og andre Organer Argent. nitr., Arsen, Kreosot, Sulphur, Graphit, ved Fremfald af Steden eller Moderen Arnica, Nux vom., Pulsatilla, Sepia.

Med Hensyn til de enkelte Symptomer gjælde følgende Angivelser:

Ved almindelig Slimet Udflod af hvid eller

gullig Farve paa se isærbelesshed Calcareæ,  
Natr. sulph., Pulsat.

Bed materieagtigt Udflod: Mercur, Natr.  
sulph., Nitri. ac., Sepia, China.

Bed tyndt, vandagtigt Udflod: Alum.,  
Graph., Ferrum, Jod, Sabina.

Bed tykflydende Udflod: Arsen, Bovista,  
Mezereum, Natrum mur., Puls., Sepia,  
Zinc.

Bed skarpt, ætsende Udflod: Alum., Arsen,  
Jod, Kreosot, Mercur, Silicea, Sulph.

Bed ilbelugtende Udflod: Kreosot, Nitr. ac.,  
Sabina.

Bed grønagtigt Udflod: Carbo veg., Kreosot,  
Merc., Sabina, Sulph.

Bed blodslimet Udflod: China, Calc., Kreosot,  
Lycop., Nitri. ac.

Bed guulagtigt Udflod: Arsen, Kali, Lycop.,  
Sepia.

Bed hvidt, mælkeagtigt Udflod: Calcar.,  
Ferrum, Lycop., Natr. mur., Natr. sulph.,  
Pulsat., Sabina, Sepia, Silic., Zinc.

Bed stærk Svækkelse: Calcar, China, Kreo-  
sot, Natr. mur., Pulsat., Sepia.

Bed Ansigtshlegelighed: Arsen, Calcar, Gra-  
phit, Natr. mur., Pulsat., Ferrum.

Bed tilstedeværende Smerter i Rygsjæ og  
Ryggen: Baryt, Graphit, Phosphor,  
Pulsat.

Foruden disse Lægemidler, blandt hvilke Balget  
rigtig nok i mange Tilfælde ingenlunde er let, og  
som maa finde Sted med omhyggeligt Hensyn til  
alle Aarsager og Omstændigheder, understøttes Be-  
handlingen af hvidt Flod i høi Grad ved Anvendelse

af Bade, navnlig af de saakaldte Sædebade; ganske affeet fra, at allerede Reenlighed fordrer en hyppig Baden og Vaskning af de paagjældende Legemsdele, for at der ikke skal vedligeholdes en vedvarende Irritation ved at Slimen klæber sig fast. Disse Sædebade anvendes daglig, bedst om Aftenen før man gaaer tilfængs i 5 à 10 Minuter ad Gangen, og derved maa iagttages, at Karret er noget dybt og er godt fyldt, forat Vandet kan komme til at berøre og bestynde alle angrebne Dele. Desuden anbefales Anvendelsen af smaa Skederør af Blik, forsynede med Huller, som kunne lette og befordre Vandets Indtrængen til de høiere liggende Vægge i Mobermundten. Til disse Sædebade egner sig, med Undtagelse af enkelte Tilfælde, i hvilke kun en Læge kan tage Bestemmelse, reent, koldt Vand, kun maa man, for at undgaa Forkjølelse, de første Gange tage det noget kuldslaaet, maafe endogsaa lunken, og først efterhaanden gaa ned til en lavere Temperatur.

## § 10.

### Gudsygdomme.

#### 1. Rosen.

Denne forekommer hyppigst i Ansigtet og Hovedet, dernæst paa Fødderne; ikke sjældent forandrer den ogsaa Plads, idet den lidt efter lidt angriber de nærliggende Dele, saa at den f. Ex. fra Ansigtets ene Side efterhaanden udbreder sig over hele Hovedet. Undertiden er den ogsaa forbunden med gastriske Symptomer. Desuden udbreder der sig

ofte en rosenagtig Betændelse i Huden i Nærheden af Saar og Hævelser.

Mod den almindelige glatte Rosen er *Belladonna* næsten altid Lægemidlet, idet det ikke alene meget hurtig bevirker dens Fordeling og forhindrer dens videre Udbredelse, men ogsaa standser den undertiden meget heftige Smerte og mildner de ved Ansigtсроsen undertiden optrædende meget betænkkelige Hjernesympptomer. I de saa Tilfælde, hvori dette Lægemiddel ikke virker hurtigt, maa der anvendes *Lachesis*.

Mod Blærerøsen er *Rhus toxicodendron* Hovedmidlet; dersom dette Middel ikke hurtigt mildner den ofte tilstedeværende Brænden og Kløe, saa bruges nogle Indgiver *Euphorbium*. Ogsaa er det her tilraadeligt at bestrø de opbrudte og vædsfænde Blærer med Rug- eller Kartoffelmeel, og ved denne kunstige Huddækning at beskytte de ømfindtlige Dele mod Luftens Paavirkning og andre Indflydelser.

Tilbøieligheden til Tilbagefald, som ved Ansigtсроsen ofte er overordentlig stor, hæves bedst ved *Apis*, *Graphit* eller *Camphora*.

En farligere Sygdom er som oftest Rosen hos Nyfødte; her er i Begyndelsen sædvanlig *Arnica* meest passende, da Sygdommen næsten altid udvikler sig som en Følge af Navlens Bestådigelse og Betændelse. Lader Sygdommen sig ikke forhindre i dens fuldkomne Udvikling ved dette Middel, saa er for det meste *Belladonna* virksomt. See nærmere herom under Sygdomme hos Nyfødte.



## 2. Helvedesild.

Denne ikke sjældent forekommende Sygdom be-  
staaer i mindre eller større Blærer, som i Forbin-  
delse med heftig Brænden og Kløe, danner en  
smal (haandsbred) Stribe paa et Sted af Krop-  
pen og udbreder sig om dens halve Omkreds. Feber-  
agtige og andre Symptomer træffes kun sjældent i  
Forbindelse dermed; kun foranlediger den yderst  
heftig Kradsen og Kløe, ofte Uro og Søvnlø-  
shed. Undertiden gaa heftige Nervesmerter forud  
for dens Udbrud eller ogsaa tilsyneladende rheu-  
matiste Besværligheder. Rhus toxic. og Mer-  
cur ere de specifikke Midler mod denne Lidelse og  
læge næsten altid samme i meget kort Tid. Bryde  
Blegnene op og danner der sig vædsfende Steder,  
saa gjør man vel i at bestrøe samme med Kartoffel-  
meel eller at lægge Bomuld paa dem\*).

## 3. Ansigtssfinner, Hudorme.

Med dette Udtryk betegner man de smaa  
Blegner, Knopper eller sorte Punkter, som vise sig i  
Panden og paa Næsen af unge Mennesker, og som  
genere mere end de besvære. De betinges af en syge-  
lig Fedtassonbring af Hudens Fedtkjertler, denne Af-  
sonbring bliver fast i Overfladen, og derved tillukkes  
Udførselskanalen som med en Prop. Hyppig indtræder  
ogsaa Betændelse i disse Kjertler og de danne da  
Materiepustler eller større Knopper. De fremkomme  
især i Ungdommen efter Udvillingsperioden og frem-  
bringer netop i denne Tid meget Besvær hos den,

\*) Ved Helvedesild paa den ene Halvdeel af Brystklassen  
med stærk Smerte i Brystet, hjælper ofte Ranun-  
culus bulbosus.

som lider deraf, paa Grund af at de tilsmudse Teinten. Desuden synes de tillige at befordres ved pirrende Spiser, Ophidselse, Rydelse af Spiritus og Diætfeil, hvortil der ved Behandlingen maa tages særdeles Hensyn.

Imod dette temmelig haardnakkede Udslet viser Belladonna, Pulsatilla og Sulphur sig mest virksomme; imod de sorte Punkter (Huborme) derimod Nitri acidum og Sepia, og imod større Materieknuder Antimon. crudum og Mercur.

Nær beslægtet med denne Lidelse er ogsaa det saakaldte Robberudslet (Robbernæse), som bestaaer i en Udvidelse af Hubens Blobaarer først i Næsen, senere ogsaa i Kinderne og i Panden, og som, naar Ondet tiltager, ogsaa danner Knopper og Pusler, Huben bliver blaarød og ofte tyk og opsvulmet. Dette Onde forekommer isærdeleshed hos Drankere, men ogsaa hos Personer, hos hvilke en Tilbagestrømning af Blobaarernes Blod til Hjertet forhindres eller vanskeliggjøres ved en Hjerte- eller Lungelidelse.

Da dette Onde som oftest hidrører fra en Udvidelse af de paagjældende Blobaarer, og desuden ofte staaer i Forbindelse med organiske Feil i større Organer, saa er Helbredelsen af denne generende Hublidelse naturligtvis meget vanskelig, ofte aldeles umulig. Carbo veget. (især hos Drankere), Acid. nitr. og Sulphur, maaskee ogsaa Arnica og Ant. cr. ville endnu virke bedre; ofte gjentagne kolde Dmslag bringe ogsaa, ialtfald midlertidig, Bedring og forhindre videre Udbredelse.

#### 4. Frislingeudslet og Meldefeber.

De acute Frislinger, saavel de røde som de hvide, fremkomme kun i Følge med eller som

Symptom paa en feberagtig Sygdom, f. Ex. Nervefeber, Gigtfeber etc.; enten ere de da en Følge af megen Varme og langvarig Sved, og i saa Tilfælde uden nogen særdeles Vigtighed eller Indflydelse paa Sygdommen og dens Behandling, eller de optræde som et Sygdomssymptom af meget stor Vigtighed, der sædvanligt maa betragtes som et høist betænkeligt eller ogsaa kritisk Moment, eller som i det mindste aldrig er uden væsentlig Indflydelse paa Sygdommens Forløb. Naturligviis kunne de da heller ikke i saa Tilfælde blive upaaagtede ved Sygdommens Behandling. I de fleste Tilfælde fordres Ipecacuanha eller Arsen; førstnævnte passer især, hvis der under Forløbet af en feberagtig Sygdom med svæbende Hud fremtræder Kuldegysninger uden nogen tænkkelig Grund i Forbindelse med Brystbellemmelse, Kortaandethed, Svimmelhed, Rysten, Uro, Angst, Besvimelse, Ildebefindende; Ipecacuanha vil i saa Tilfælde befordre Frislingernes Frembrud, og gjøre dem uftadelige under Sygdommens Forløb, ja ofte virke helbredende. Arsen virker især godt, naar Frislingerne allerede ere udviklede, isærdeleshed de hvide, ved Nerve- og Barselfebre, med fremtrædende Svækkelse og Angst. I disse sidste Tilfælde kunne endnu Valeriana og Bryonia komme i Betragtning.

Meldefeber er en aldeles farefri, men ofte meget haardnakket Sygdom, som bestaaer i pludselig frembrydende røblige eller hvide fremstaaende Pabler, som fløe og brænde meget stærkt, hurtig forsvinde, men som ofte vende tilbage. De fremkomme ofte efter Nydelsen af Krebs, Jordbær, meget fede Spiser, eller ved Berøring af Brændenælder, Giftsumak (Planten *Rhus toxicodendron*) og giftige

Dyr, undertiden ogsaa uden at nogen Aarsag kan paarises. De sædvanligste Lægemidler ere Bellad., Dulcam., Rhus tox., Urtica, Arsen, Apis og Pulsat. Er Sygdommen opstaaet efter Ryddelsen af usunde, fede Spiser, saa hjælper bedst Pulsat. og Arsen; efter Berøring af skarpe Planter Bellad., Rhus toxic., Urtica eller Bryonia; efter Berøring af giftige Dyr, Arsen eller Apis; efter overdreven Ryddelse af Viin, Nux vomica eller Sulphur.

Imod meget Chronisk og haardnakket Neldeseber viser sig undertiden ogsaa Calcarea, Copaiva eller Lycopod. hjælpsomme.

Bed heftig Brænden og Røbe kan man anvende Indgnidning med Drefedt, Balmueolie, eller bedst frisk Glycerin.

## 5. Fnat.

Dette smitsomme Hubdplet bestaaer af smaa Knuder, Blærer eller Blegner, som isærdeleshed fremkomme i Lemmernes Bøiningsslaber, mellem Fingrene og paa Rjønssdelene, men aldrig i Ansigtet. Udslættet foranlediger en uafbrudt Kradsen, og denne kan ved Efterladenhed danne større Materieknopper (Pustler) og Forboldninger. Som bekjendt er Aarsagen til denne Sygdom en lille Midde, som sidder i en lille Gang, lægger Eg og saaledes udbreder Onket videre samt bliver smittende for andre. Kun Tilstedeværelsen af denne Midde er vigtig for at erkjende Fnat, og dens Opdagelse er følgerlig nødvendig for at fjerne enhver Bilsfarelse i saa Henseende. Rigtignok er det kun muligt for den Øvede, at finde og at undersøge dette lille Dyr (*Acarus scabiei*

eller Sarkoptes) som neppe kan sees med ubevæbnet Øie. Fnatmiddden opholder sig kun i Gange, som ligne en lille Naalerift, men som aldrig ere ganske lige, som endogfaa undertiden bøie sig og løbe tilbage i hestefoagtig Form. Enhver Gang har to Ender og ved den ene viser der sig en lille Blegn eller et langagtigt, rundbøiet Sted som Resten af en Blære eller Materieknop. I den modsatte Ende viser sig i dens yderste Spids et lille farvet Legeme, hvor Fnatmiddden sidder i og altid fører Gangen videre, hvorfor Gangenes Længde altid er forskjellig. Som Følge heraf sidder Fnatmiddden aldrig i Gangens Midte. Stikker man nu en spids lille Kniv ind paa det bestrevne Sted, og bringer det lille Legeme under en Loupe, saa vil man af dets Bevægelser let opdage selve Middden. Dens Hovedsæde er især i den fine, haarløse Hud mellem Fingrene eller Forarmens Indreside saavel som i Rjønssdelenes Nærhed; Lemmernes Strækkesteder forstaaes næsten altid, formodentlig paa Grund af det derværende Haarlag, og i Ansigtet forekomme de aldrig.

Langsmed Middegangen danner der sig sædvanligvis en Mængde Smaablegner og Blærer, Materieknopper fremkomme først lidt efter lidt, sandsynligvis kun ved ydre Indflydelse. Thi jo heftigere Fnattet er, jo større Ureenligheden er, jo længere de Negle ere, som krabse og kløe, desto flere Bustler eller Materieknopper vil man forefinde.

Dette Ondes Helbredelse udfordrer naturligvis fremfor alt Middens samt dens Ingels grundige Tilintetgjørelse, ganske ligesom man f. Ex. ved Glabluus eller andre Luus først og fremmest maa søge samme bortfjerne fra Legemet. Talrige Forsøg have viist, at Fnatmiddden hurtigt dræbes ved

directe Berørelse af meget forstjelligartede Midler, f. Ex. ved Svool, Mercur, Kali, Tjære, skarpe ætheriske Olier etc. Man kunde derfor til dette Diemebs Opnaaelse anvende forstjellige Indgnidninger, men man maa dog passe paa, at samme hverken i og for sig ere farlige eller virke skadeligt, at de ei heller virke altfor irriterende paa Huden, og at de ikke plette Linnebøt, saaledes at det ikke atter kan renses. Bedst virker gjentagen omhyggelig Indgnidning af alle angrebne Hudsteder med en Svoolsalve bestaaende af 1—2 Drachmer Svoolblomme paa 1 Unze Svinesedt. Før den første Indgnidning lader man Vedkommende tage et varmt Sæbebad. I almindelige Tilfælde ere 3—4 saadanne Indgnidninger, foretagne hver Morgen med Samvittighedsfuldhed og Eftertryk, tilstrækkelige til fuldstændig at bræbe Midten med dens Afkom; indvendig giver man i denne Tid Morgen og Aften en Draabe Svooltinctur eller et Gram af Sulphur (Svool) i 2den Rivning. Istedetfor Svoolsalven kan man ogsaa til Indgnidning anvende grøn Sæbe, Styrax, Petroleum eller Perubalsam, helst anvender man disse om Aftenen, stærkt og rigeligt paa alle angrebne Steder, som man da først om Morgen derefter afvasker med lunkent Vand. Herved maa dog ikke glemmes, at det ogsaa undertiden er nødvendigt at rense Klæder og Linnebøt for de Midter, som muligen maatte findes deri, hvilket bedst finder Sted ved tør Hæde, f. Ex. i en Bagerovn. Men er Midten bræbt, saa maa man dog undertiden fremdeles vedblive med den indvendige Brug af Svool, for at bringe Knuderne, Blegnerne og Pustlerne til fuldstændig at læges, og for at hæve Hudnervernes store Irritabilitet, som især giver sig til-

kjende ved Kløe og Krillen i Huden; varme Sæbe-bade Tid efter anden ville altid understøtte dette Middel. Ved meget udbredte eller forføjte Tilfælde af Fnat maa disse Fjndgnidninger med Salven foretages i længere Tid og hyppigere. Er der med Fnatstet store Blærer, saa give man efter Middelens Udelæggelse ved Fjndgnidning to Gange daglig en Fjndgiot Mercur, enten strax fra Begyndelsen eller efter nogle Fjndgioter Sulphur. Den hurtige Helbredelse af Fnat, selv i Tilfælde, som ikke ere aldeles nye og friske, har aldrig betænkelige Følger, tvertimod er det endogsaa en utvivlsom Kjendsgjerning, at Sygdommen først efter en længere Tilstedeværelse og ved Middelens Udbredelse i hine Gange kan forandres fra en stedlig til en almindelig, og da ved dens Undertrykkelse alene ved ydre Midler ikke sjældent kan blive Aarsag til farlige Chroniske Onder. Det samme gjælder om Hududslet, som hyppig kun er en Følge af en indvendig Lidelse. Ved disse ere alle ydre, irriterende og udtørrende Midler strængt at undgaae, og i saadanne maa der foruden den nødvendige Hudpleie ved Reenlighed, kun anvendes indre Lægemidler. Behandlingen af disse Chroniske Hudsygdomme udfordrer i Lighed med de saakaldte Ringorme, fortrinnsviis foruden Sulphur, endnu Arsen, Causticum, Lycopodium, Mercur, Carbo veget., Mezereum, Pulsatilla, Graphit, Antim. crud., Rhus toxic., Ranunc. etc., hvis specielle Angivelse imidlertid her ikke kan gives udførligt, da der til deres firkte og rigtige Anvendelse hvergang foruden Symptomerne paa Hudsygdommen maa tages Hensyn til Symptomerne paa Almeenbefindendet. Som nogenlunde Holdpunkter kunne

følgende korte Angivelser tjene, som dog kun tage Hensyn til Symptomerne paa Hudsygdommen.

Arsen passer fortræffeligt ved Klid-, skjæl- eller materieagtige Udslæt med heftig Brænden og stor Uro; ogsaa ved Bylber og Brandblærer.

Causticum ved storblæret Udslæt med Materieknopper.

Lycopodium ved skurvagtigt, barkagtigt Udslæt med vædskende Revner og hubløse Steder.

Mercur ved tørt Udslæt, som let bløder eller ved materiagtige, ædende Pusler med utaalelig Kløe, især i Sengenvarmen.

Carbo vegetabilis ved tørt, fintornet, frislungeagtigt Udslæt.

Mezereum ved frislungeagtigt Udslæt med Hubløshed, utaalelig Kløe og Brænden om Natten.

Graphit ved skorpeagtig, ædende Udslæt med fugtige, hubløse Pletter.

Pulsatilla ved tørre eller vædskende Udslæt, især paa den nederste Deel af Benene med almindelig Rødme i den omgivende Hud og Udvidning af Blodaarerne.

Antim. crud. ved koppeagtigt Udslæt, med brune, sorte Skorper.

Rhus toxicod. ved blære- og blegneformet Udslæt eller ædende, vædskende, ogsaa skjælagtigt Udslæt.

Ranunc. bulb. ved tætte, vædskende Blærer, som flyde sammen i større Skorper.

## 6. Kløe i Huden (Pruritus).

Denne bestaaer i en høist besværlig Kløe paa et eller flere bestemte Steder af Huden, som oftest



uden noget som helst synligt Udslæt; hyppigt føles det i Bagdelen og paa Skambelene, undertiden dog ogsaa paa hele Hudoverfladen og tvinger til en heftig Kradsen og Riven, saaledes at der ikke sjældent fremkommer hudløse og vædstende Steder. Gamle Folk hjemses især deraf, og da især i Sengenvarmen.

Som oftest hæves dette Onde ved Sulphur; dog ere ikke sjældent ogsaa andre Under forbundne dermed, eller ogsaa kunne visse Aarsager, saasom Drm, Hæmorrhoider, Leverlidelser, være Anledningen dertil, saaledes at mangfoldige Lægemidler kunne ansøres derimod. Derfor her kun nogle almindelige Anviisninger.

Ved sin, stikkende, brændende Røse, som af Loppetist over hele Legemet, om Aftenen i Sengen, og som ved en let Kradsen hurtig forsvinder fra det angrebne Sted og da fremkommer paa et andet, hjælper Ignatia eller Mezereum; begynder Røsen altid ved Afklædningen, Nux vom. eller Arsen; fremkommer den først efterat man er blevet varm i Sengen, Pulsatilla eller Mercur; er Røsen særlig brændende, Rhus tox.; bløder det let, naar der kradses, Mercur og Sulphur. Forekommer den isærbelesshed i Bagdelen, saa passe Calcaria, Causticum, Lycop., Ignat., Sep., Sulph.; paa Testiklerne: Nitri ac., Petrol., Sulph.; paa Rysndelene: Calcar., Caust., Carb. veg., Conium., Platina, Natr. mur., Sep., Sulph.

## 7. Ringorme.

Med dette almindelige Udtryk betegner man sædvanligt mange Former af chroniske Hubsygdomme, saasom Ekzem, Herpes, Lichen, Psoriasis etc. De angribe som oftest kun en eller enkelte Dele af Legemet, ere snart tørre, snart vædskende og næsten altid, om end ikke farlige, saa dog meget haardnaktede. En af de meest hyppige og meest haardnaktede Former, der som oftest er stærkt vædskende, er Ekzemet paa Skinnebenene, det saakaldte Saltflod. Helbredelsen af denne Hublidelse, som meget ofte hidrører fra og vedligeholdes af en indre almindelig Sygdomstilstand, er som oftest meget vanskelig, og udfordrer en meget nøiagtig Undersøgelse af samtlige tilstedeværende Sygdomssymptomer. Hovedmidler ere Sulphur, Mercur, Arsen, Graphit, Lachesis, Mezereum, Pulsatilla, Rhus toxic.; den specielle Anviisning til Anvendelsen af disse Midler, er her ikke tilraadelig, kun maa herved sammenlignes, hvad der er sagt om disse Lægemidler under Behandlingen af Fnat.

## 8. Hubløshed.

Denne fremkommer især hos Nyfødte imellem Laarene, paa Halsen og i Armhulerne, som ogsaa hos fede Personer om Sommeren eller efter lange Spadseretoure. I første Tilfælde er som oftest den fornødne Reenlighed, regelmæssig Badning og Tørring, saavel som Paastrøen med Kartoffelmeel tilstrækkelig til at hæve Ondet; ellers læges det let ved nogle Indgipter Chamomilla. I de sjældne Tilfælde, hvor Hubløsheden er stærkt udbredt, og hvor en stor

Deel af Legemet's Overflade er rødt, øm og væd-  
stende, maa der anvendes Mercur og Lycopo-  
dium.

Hubløshed hos Borne som Følge af Ridning  
eller Gaaen, hæves lettest ved Badning med for-  
tyndet Arnica-Tinctur.

Gjennemliggen hos fengeliggende Syge behandles,  
naar den ikke, som ofte ved Nervefeber, er et Symp-  
tom paa selve den indvendige Sygdom, ligeledes  
bedst med fortyndet Arnica-Tinctur.

### 9. Blødbylber, Furunkler.

Imod smaa Blødbylber, af hvilke der ikke sjæl-  
dent samtidigt danner sig flere, er Arnica det bedste  
Middel; mod store, hvor der finder en meget lang-  
varig og smertefuld Forholdning Sted, er Anven-  
delsen af Hepar sulph. eller ogsaa Mercur  
meest passende. Er den omgivende Hud meget be-  
tændt og smertefuld, saa ere nogle Indgivter Bel-  
ladonna af god Virkning. For at befordre og  
fremstynde Forholdningen er det forøvrigt ogsaa  
hensigtsmæssigt at anvende varme Omslag af Havre-  
grød eller Hørfrømeel, medens en for tiblig Ab-  
ning med Kniven af den endnu ikke fuldstændig  
blødgjorte Svulst har en meget tvivlsom Virkning.

Er Bylben meget stor og truer den med Brand  
(Carbunkel), saa maa der anvendes Arsen. En  
Carbunkel (Brandbylb) medfører for ældre Personer  
let Livsfare, naar den forekommer i Halsen eller  
paa Ryggen, og udkræver i saa Fald naturligvis  
den største Opmærksomhed og Omhu i dens Behandling.

Imod en sygelig Tilbøielighed til Blødbylber hjælper bedst Sulphur.\*)

### 10. Babler og Neglebylber.

De almindelige Babler læges, meget hurtigt ved nogle Indgioter Hepar sulphuris; isærdeleshed forhindres ved dette Middel den ofte meget besværlige Nydannelse af dem. Er denne Blære ikke stærkt fylbt, saa maa man isørigt vogte sig for at aabne den, da den i saa Fald bruger længere Tid til at læges, idet da Overhuden maa danne sig paany.

Negle- eller Fingerbylber (bolbne Fingre) opstaa som oftest ved Negleleddet, men forekomme ogsaa paa Fingerens mellemste eller nederste Deel; de ere ofte ledsagede af en betydelig Betændelse af de omliggende Dele og overordentlig heftige Smerter, og foraarsage ikke sjelden Veenedder, Tab af en Fingerknokkel eller ialtfald en Fingers Stivhed og Vanskabning. I de ringere Grader, hvor Betændelsen og Forboldningen kun er overfladisk, er Hepar sulph. næsten altid tilstrækkelig til en hurtig Helbredelse; gaaer Betændelsen dybere, udbreder den sig til Musklerne og Senerne, saa er Mercur det meest passende Middel. Er Knokken angreben, saa maa man efter Mercur give nogle Indgioter Silicea, og ofte veksle med disse to Midler. Saa længe Svulsten endnu ikke har aabnet sig, er det henfigtsmæssigt, i mindre betydelige Tilfælde hyppig at anvende varme Sæbebad, men ved betydelig Forboldning varme Omslag af Havregrød eller Hørfrømeel. Svulstens Aabning med Knive er kun da

\*) ogsaa Arsenicum.

tilraadelig, naar den overalt er blød og Smerten uudholdelig. Enhver utidig Skjæren, som ogsaa Behandling med stærke Plastre og Salver foranlediger meget hyppigt Forbolbninger af den værste Slags og Veenedder, medens de passende homöopathiske Midler sædvanligt meget hurtigt hæve dette Onde fuldstændigt og uden skadelige Følger.

I den første Begyndelse af dette Onde lykkes det ikke sjældent at fordele den begyndende Betændelse ved en gjentagen Indgivning (Penslen) af det smertende Sted med en stærk Salpeter- eller Saltsyreopløsning.

## 11. Frost.

Er Huden paa Hænder og Fødder rød og sprukken med stødviiis meget heftige brændende Smarter, er den udvendige Anvendelse af Arnica-Tinctur næsten altid af stor Virkning. Er Huden sprukken, fuld af Revner eller der forefindes vædstende Steder, saa maa Tincturen fortyndes med mindst 6 Dele Vand, men er Huden uftadt, saa kan man bruge den mindre fortyndet, ja selv ganske reen. I meget haardnakkede Tilfælde, hvor Huden er rødlig, blaa og opsvulmet, men ikke vædstende, gjør undertiden en svag Oppløsning af Acid. nitricum i Vand (omtrent 40 Draaber i en halv Unze Vand) endnu bedre Virkning. Bliver der, efter Smertens Ophør i Sουλsten, endnu en blaaligrød Farve tilbage i Huden, saa kan man anvende Petroleum, Acid. nitri eller Pulsatilla indvendig. Ved meget heftige Smarter er ogsaa ofte Arsen i nogle Indgiver af hurtig Virkning.

De saakaldte Frostknuder udfordre til deres Helbredelse som oftest den ydre Anvendelse af Arnica-

Tinctur og hyppige varme Fodbade; man maa samtidig strengt undgaae Alt, som kan udøve et Tryk paa Svulsten og de nærliggende Dele. Ogsaa vil man spore god Virkning ved indvendig Anvendelse af Acid. nitricum; Hamamelis, Petroleum, Sulphur og Thuja, saameget mere, naar Onket ikke allerede er forældet\*).

## 12. Forbrænding.

Uagtet det skulde synes som om Brandsaar kun yderst sjældent skulde gjøre Anvendelsen af indre Lægemidler nødvendige, saa fremkalde disse dog ikke sjældent almindelige Sygdomssymptomer, som fortjene den yderste Opmærksomhed, ja som endogsaa kunne blive livsfarlige. Saaledes optræde undertiden, især ved Forbrændinger, som indtage en betydelig Overflade, meget heftige Feberanfald, der fordre Aconit, i sjældnere Tilfælde Arsen; endnu hyppigere indtræder Opkastning, som lettest hæves med Ipecacuanha; ved stærk Sindsbewægelse, Angst og Hjertebanken ere nogle Indgivter Ignatia af god Virkning. De utaalelige Smerter lindres ofte hurtigt ved Arsen og Causticum. Ved stærk udbredt og langvarig Forboldning gjør Sulphur god Virkning.

Hvad den ydre Behandling angaaer, saa retter denne sig efter Forbrændingens Grad. I lettere Tilfælde, hvor Overhuden kun er rød, uden at være istykket, bruger man bedst Omslag eller Badstning med varm Spiritus; ere Smerterne meget voldsomme, kan man tilføje nogle Draaber Cantharis, Causticum eller Urtica-Tinctur (10 Draaber paa

\*) Et godt Middel til udvortes Brug er Petroleum-Spiritus samtidig med Petroleum 3 Fortyndning indvortes.  
Dr. H.

$\frac{1}{2}$  Unze Biinaand) til Spiritus. Er derimod Huden gjennembrændt og en hudløs, vædsfende Flade tilstede, saa lægger man oppluffet Bomuld derpaa, som man lader klæbe sig fast, og forsøger samme med nye Dag, saalænge Fugtigheden trænger igjennem; saasnart der har dannet sig en ny Overhud, lader Bomulden sig let trække af i enkelte Stykker. Paa samme Maade forholder man sig, naar der ere store, stærkt fyldte Blærer tilstede, kun at man forinden maa stikke samme op og trykke dem ud saa vidt muligt.

Ved meget dybe, materiehølbige Brandsaar benytter man bedst en Salve af Balmue- eller Mandelolie med Eggeblomme, som man forsigtig indsmører, og daglig gjentager efter at have rensset Saarene, hvorpaa de tilbækkes med Lærred.

### 13. Saar.

Saar foranlediges ofte af indvendige, almindelige Sygdomme til hvilke der maa tages Hensyn for at kunne foretage en tilfredsstillende Behandling. Derfor kan her kun omtales de almindelige Tilfælde og gives almindelige Angivelser med Hensyn til de ydre Eiendommeligheder.

De hyppigste og meest haardnakkede ere Saar paa Foden. Disse forekomme især hos Folk, som staa meget (saasom Bogtrykkere etc.) og overhovedet meest som Følge af Naresvulst, hvorfor de ofte vise sig hos Frugtommelige eller hyppigst efter Barselsengen. Hovedmidlerne imod samme ere Sulphur, Pulsatilla, Mezereum, Arsen, Silicea, Lachesis og Mercur sublim.

Pulsatilla er et Hovedmiddel mod Saar paa

Fødderne ifølge Aaresvulster med Opspændthed i Blod-aarerne og Blodets Standsning i Fødderne af mechaniske eller andre Grunde.

Sulphur og Mezereum passe isærdeleshed ved Saar med Udslet omkring, stærk Kløe, Forbøielsesforstyrrelser, hos hypochondriske, svækkede Personer; Arsen ved stærk, utaalelig Kløe især i Sengenvarmen, ved Saar med haarde, hornagtige Rande; Mercur ved stærk materieholdige, dybe, urene og ækle Saar. Ved stærkt brændende Saar, som let bløde og have en ubehagelig Lugt, er Carbo veget. ofte af god Nytte, saavelsom Lachesis ved saadanne, som gribe stærkt om sig og ere omgivne af mindre Saar.

I de fleste Tilfælde vil Sulphur bevirke en gunstig Indflydelse, ialtfald paa de smertelige Fornemmelser.

Naturligvis udfordres der til Helbredelse af disse Fodsaar en hensigtsmæssig Levemaade, navnlig er Fodens horizontale Stilling og saavidt muligt Undgaaelse af staaende Stilling, af meget forbelastet Indflydelse. Til Forbinding egner sig bedst frisk Dgetalg, smurt meget tyndt paa Lærred, i visse Tilfælde vise Omslag af koldt Vand god Virkning\*).

Ikke sjældent forekomme slige Fodsaar som Følge af Forstyrrelser i Blodcirculationen, isærdeleshed Hjertefeil, hvortil der altsaa stedse maa tages Hensyn ved Behandlingen.

Fremdeles danner der sig hyppig Saar ifølge

---

\*) Som udbændigt Middel benytter jeg med Held Virginia-Baseline. Dr. S.



Udslet (saakaldet Saltflod). Ogsaa i dette Tilfælde er Sulphur et Hovedmiddel og derefter Arsen, Graphit, Mercur, Pulsatilla, Rhus tox.

Med Hensyn til Saar stammende fra Kjørtelsygge maa man sammenligne, hvad der er sagt angaaende Behandlingen af Kjørtelsygge og Kjørtelsvulster.

Gjennemliggen ved langvarige Sygdomme undgaaes bedst ved glatte Underlag (Dyreskind etc.) og stor Reenlighed, og ved begyndende Rødme af de paagjældende Steder paa Huden ved hyppig Basting af samme med fortyndet Arnica-Tinctur eller Citronsalt. Opstaaer der desuagtet, saaledes som det i Typhus og ondartede Febre ikke sjældent er Tilfældet, hudløse Steder og Saar, saa anbefales især Arsen, Kreosot og Nitr. ac.

De cariose Saar (Beenedder) kræve hovedsagelig Silicea, Mercur, Phosphor, Calcarea, Staphysagr., Jod og Asa foetida; Fistelsaar: Calcarea, Phosphor, Silicea; kræftagtige Saar: Arsen, Condurango, Conium, Lachesis, Mercur; ildbrandsagtige Saar: Arsen, Carbo veget., China, Lachesis, Secale, Silicea; svampe Saar (med saakaldet dødt Rjød): Arsen, Carbo anim., Lachesis, Nitri acid., Sulphur; Raabsaar: Arsen, Carbo veget., Kreosot, Muriat. ac.; let blødende Saar: Arsen, Carbo veget., Kreosot, Lachesis, Nitri ac., Sulph. ac.

#### 14. Sæksvulster.

Herved forståes Svulster, som danne sig i eller under Huden i en egen hindeagtig Sæk og hvis Indhold snart er fast, snart blødt eller flydende. De ere som oftest runde, undertiden for-

grenebe, af meget forskjellig Størrelse og som oftest aldeles uden Smerte. Især forekomme de i den behaarede Deel af Hovedet og i Panden, hvor der undertiden kunne findes flere paa engang. Nagtet de som oftest ikke forvolde nogensomhelst Besvær-  
lighed, kan man dog, saa meget mere som de undertiden tiltage betydeligt i Størrelse, forsøge deres Helbredelse, som ikke sjældent opnaaes hurtigt og fuldstændigt ved nogle Indgioter Calcareo og Silicea. Skulde disse Midler vise sig for-  
gjæves, og Patienten absolut vil befries fra dette Onde, saa maa han lade en Chirurg borttage Svulsten med Kniven eller et ætsende Middel. Denne Operation er let og libet smertefuld, kun maa der-  
ved erindres, at det ikke er tilstrækkeligt, at aabne Svulsten og trykke dens Indhold ud, men den hud-  
agtige Sæt maa enten udskrælles med Kniven eller bedre bortfjernes ved Utsugning og den derved op-  
staaende Betændelse og Forboldning hæves, da i modsat Fald Svulsten atter let danner sig paany.

En særegen Art af Svulster ere de saakaldte Overbeen eller Senefnuder (Ganglier). Disse ere mindre, som oftest meget haarde Svulster i Nærheden af Leddene, (især paa Hænder og Fødder), som danne sig paa en Muskelscene ved en Ud-  
strækning og Udsvævning af den samme omgivende Hinde. De forsvinde undertiden af sig selv eller forandre ialtsald fra Tid til anden deres Størrelse, især forsvinde de undertiden efter et stærkt Tryk eller Slag; imidlertid er et saadant ofte lefsaget af en stærk Betændelse eller andre Følger, og der-  
for en sliq Fremgangsmaade ikke at anbefale. Ofte lykkes det ved nogle Indgioter Silicea og Calcareo at læge disse Overbeen uden Smerte og for

bestandig; hvor disse Midler vise sig virkningsløse, vil maaskee Phosphor føre til Raaret. — Endnu forekommer der en eiendommelig Svulst paa Knæstallen, isærbelesshed hos Folk, som ofte ligge paa Knæ, nemlig Broelæggerne, Skurekoner etc. Der banner sig nemlig paa dette Sted, som Følge af Trykket og den derved opstaaende Udsvedning, en deigagtig, som oftest smerteløs Svulst af Størrelse som en Bære, der ved fortsat Tryk voxer og endelig kan forarsage Besværligheder ved at staa og gaa. Silicea frembringer næsten i alle Tilfælde, endog saa i meget forældede, og i kort Tid, fuldstændig Helbredelse.

### 15. Bortter.

Disse, sædvanligen aldeles smertefri, smaa Hududvæxter fremkomme undertiden i saa sto t Antal, isærbelesshed paa Hænderne, at de blive i høj Grad besværlige og vansirende, saa at de maa staffles bort. I dette Tilfælde indtræder der undertiden efter Brugen af nogle Indgiwter *Lycopodium* eller *Sepia* Helbredelse ved Borternes successive Indtørring og Bortsmuldbren; opnaaes dette Resultat ikke, saa kan man Morgen og Aften besugte Borterne med den rene Tinctur af *Veratrum* eller *Thuja*, hvorved de som oftest bringes til at forsvinde ligesaa sikkert og langt paalideligere end ved Anvendelse af de forskjellige ætsende Midler eller ved Skjæring. \*)

---

\*) Hurtigst virker dog Pensling med Jiseddike.

## 16. Leverpletter og Fregner.

Iffe sjældent fremtræder Leverpletter ifølge Chroniske, især Underlivsbesværligheder, og forsvinde da atter ved disses Helbredelse; i de fleste Tilfælde vil Sepia være det passende Lægemiddel. Vedblive de desuagtet eller fremkomme de uden noget andet Sygdomssymptom, saa forsvinde de ofte ved gjentagen Pensling med Veratrum-Tinctur. Mere haardnakkede, men ligeledes ganske ufskabelige, ere de medfødte Leverpletter.

Fregner behøve neppe Lægehjælp, kun ved en overordentlig rigelig Mængde kan man indvendigt forsøge Lycopodium eller Veratrum derimod, og ogsaa anvende det sidstnævnte Middel ubvendigt.

## § 11.

## Almindelige Sygdomme.

## 1. Knusninger, Forstuvninger og Saar.

I alle slige Tilfælde, som ere forårsagede ved ubvortes mekanisk Kraft, og hvormed der ikke er forbunden nogen væsentlig Bestadigelse af Huden, anvendes Arnica, ubvendig og indvendig, med det bedste Resultat. Dens Lægekraft bekræfter sig saavel ved Forstrækning af Leddenes Sener og Baand ved Feiltrin og Fald, som ogsaa ved de saakaldte Contusioner af Knoernes Bløddel, hvorved der finder Blodudtrædning (Extravasat) Sted paa Grund af Sønderrivning af de smaa Arter, i Forbindelse med Svulst og Færvning af de paagjældende Dele. Meget ofte bliver i lettere Tilfælde (f. Ex. ved

Contusioner i Hovedet, de saakaldte Buler) ved øieblikkelig Brug af dette Lægemiddel Blodudtræningen og Svulsten forebygget eller ialtfald svinder den hurtigt. Anvendelsen finder Sted overalt i alle Tilfælde, hvor Huden er ubeskadiget, bedst udvendigt ved Omflag bestaaende af en Blanding af 1—3 Dele Arnica-Tinctur med 3 Dele koldt Vand; samtidig maa der drages Omforg for ved et hensigtsmæssigt Deie eller Forbinding af det paagjældende Lem at skaffe det fuldstændig Ro og Hvile. I betydeligere Tilfælde er ogsaa en samtidig indvendig Anvendelse af fortyndet Arnica fordeelagtig. Ved samtidig Bestadigelse af den ydre Hud maae man indskrænke sig til den indvendige Anvendelse eller ialtfald benytte en svagere Blanding udvendig.

Kun virkelige Forstuvninger eller Beenbrud forbre ubetinget en Chirurgical Undersøgelse og Behandling, dog virker ogsaa i saa Tilfælde Arnica meget fordeelagtigt til Forbinding eller Formindskelse af den indtrædende Svulst, indtil den hensigtsmæssigste Hjælp kan opnaaes.

Ligesom for enkelte Bestadigelser af Lemmerne, saaledes egner Arnica sig ogsaa for lignende, som forekomme paa Kroppen eller i Hovedet, idet ved dettes Anvendelse de ikke sjældent optrædende Følgesymptomer, saasom Hovedpine, Svimmelhed, Bedøvelse, Opkastning, Brystsmerte, Kortaandethed, Hoste, Blodspytning etc. enten undgaaes eller ialtfald formindskes. Navnlig er det ogsaa meget virksomt imod Følgerne af Tand- og Dienoperationer.

Træffer Knusningen et hjertelagtigt Organ, som f. Ex. Testiklerne eller Spytthjertet, saa er næst Arnica, Conium af stor Virkning, naar det

anvendes indvendigt; ved Knusninger, som navnlig have truffet Knoklerne eller Beenhinden, er ofte *Symphytum officinale* et udmærket Lægemiddel.

Mod langvarige Besværligheder, som undertiden blive tilbage efter Helbredelsen af et knust eller forstuvet Led, og som især beleskes vise sig ved Anstrængelse eller Veirforandringer, hjælper *Rhus toxicodendron* bedst.

Ligeledes kan ogsaa ved mange Saar al Chirur-gist Hjælp undværes. Kun ved meget betydelige Blødninger, især ved Bestadigelser af Pulsaarerne (Arterierne), hvorved der sprøjter lyserødt Blod stød-viis frem, og ved Saar, som trænge ind i Bryst- eller Mavehulen, er Tilfaldelsen af en Chirurg uundgaaelig. Fremfor alt gjælder ved Saar den Grundsætning, at de næsten altid læges naar kun ydre Bestadigelser undgaaes og visse Betingelser opfyldes; hertil hører imidlertid, at Blødningen standses, at Saaret renses, at man søger at nærme et gabende Saars Rande til hinanden, og ved en simpel Forbinding forhindrer ydre Bestadigelser. Til at standse Blodet og til Saarets Rensning er friskt, reent Vand det bedste; Sammentrækningen af Saarrandene finder bedst Sted ved at anbringe smalle Striber af Hefteplaster eller i betydeligere Tilfælde ved Sammensyning; Forbindingen bestaaer bedst i en ikke for stram Indvikling med Lærred. Desuden maae der tillige sørges for, at den saarede Legemsdeel faaer et bekvemt Leie og Ro. Alle Salver, Plastre og Balsamer ere ofte oversflødige, ikke sjældent skadelige, og maa alle Forsøg paa at stille Blodet, overlades til en Læge eller en Chirurg.

For at fremstynde Helbredelsen af Saar er

Arnica ogsaa af stor Virkning, kun maa den udvendig anvendes i stærkt fortyndet Tilstand, omtrent 10 à 15 Draaber til en Overkop Vand, for at Saaret ikke skal blive irriteret og saaledes forstyrres. Ved betydeligere Saar er det ogsaa tilraadeligt, at anvende Arnica indvendigt for at forhindre Saarseber. Optraæder denne heftigt, saa ere nogle Indgioter Aconit af stor Nytte. Hos Personer, som have en irriteret Hud, for hvilke ofte ubetydelige Saar strax begynde at flyde og læges meget langsomt, gjør nogle Indgioter Hepar sulphuris ofte god Virkning. Betydelige Saar, især i Huden eller Bløddelen med Substansstab læges altid kun igjennem Inflammation; i saa Tilfælde maa de forbindes med frisk Dretalg og ellers behandles som Saar (§ 13. Hudsygdomme).

## 2. Rheumatisme, Guld.

Denne meget hyppigt forekommende Sygdom angriber som oftest Musklerne, sjældnere Leddene, forekommer ogsaa undertiden i Kroppens Muskler, især i Nakken, Ryggen og Brystet. Undertiden er Rheumatismen forbunden med Feber, i hvilket Tilfælde flere Ledde lide af Smerter og Svulst (acut Rheumatisme, Gigtfeber); endnu oftere viser den sig ved en stadig vedvarende eller hyppigt tilbagevendende Smerte i en enkelt Muskel eller Led uden videre at angribe den samlede Organisme (chronisk Rheumatisme). Dens sædvanlige Aarsag er Forkjølelse, hvorfor denne Lidelse som oftest forekommer i fugtigt, foranderligt Veir, efter Gjennemblødning, Træt, standset Sved etc., dog snues den ogsaa at kunne fremkaldes ved andre Omstændigheder, navnlig ved Misbrug af Medicin, som China, Mercur, Bly etc.

Foruden de Leilighedsaarsager, for hvilke der senere skal gives bestemte Anviisninger, maa der ved Behandlingen nøie tages Hensyn til Smerternes Sæde og Art; saavel som til de ledsagende Symptomer.

Er Feberen, i Gigtfeber, stærk, forbunden med Uro, Hjertebanken eller Angst, Smerterne heftig stikkende eller rivende, Svulsten rød og øm for Berøring, saa passer bedst Aconit.

Et udmærket Lægemiddel er Bryonia, især naar Smerten mere sidder i Musklerne, og naar den frembringes eller forstørres ved, at den lidende Deel bevæges, ved Stivhed eller ringe Svulst, Forværrelse om Natten, gastriske Symptomer, uklar, mørke-rød Urin.

Ved trækkende, rivende Smerter med en Fornemmelse af Følelseløshed eller Lammelse i den angrebne Deel, Forværrelse om Natten, stadig Skiftet af Leiet i Sengen, midlertidig Bedring ved at sidde overende og ved Bevægelse, Kulde, Fortrydelighed og Svækkelse, især om Morgen, maa Chamomilla anvendes.

Mod Smerter, som navnlig ikke taale Sengenvarme, med deigagtig Svulst i Leddene, rigelig Sved, der ikke letter, Kuldefornemmelser i de angrebne Dele, Forværrelse om Natten henimod Morgen og i kold og fugtig Luft, hjælper især Mercur.

Glytte Smerterne og Svulsten sig hurtig fra et Led til et andet, forværres de i Sengenvarmen og om Natten, og forringes de ved Bløttelse, og ledsages af bleg Ansigtssfarve, Kuldefornemmelser, en Følelse af Døvhed eller Lammelse, uden Tørst, virker Pulsatilla godt.

Ved rivende, spændende eller Forvridnings-



Smærter med en Følelse af lammende Smærter og Kløe, som især ere fremtrædende, naar man er i Ro eller naar man reiser sig op fra en siddende eller liggende Stilling, med rød, glindsende Svulst af Leddene, med stikkende Fornemmelser ved Berøring, er *Rhus toxicodendron* det bedste Middel.

Mod meget heftige, rivende, stikkende eller trækkende Smærter, med Svækkelse og Kløe, rød, betændt Svulst, almindelig Smerte i Legemet, Forværrelse mellem Aften og Morgen, Hebe, sparsom, rød eller mørkfarvet Urin, hjælper ofte *Colchicum* meget hurtigt.

Ere saagodtsom alle Ledde i Arme og Been angrebne af rivende eller trækkende Smærter, med Lamhed og Rykten, forværres samme desuden ved enhver Ophedning og Bevægelse, er der tillige en jæregen Følelse af Klamhed i Leddene eller Bænen og Trækning i Musfeldelene, med Rykten i Legemet i Søvne og gjentagen Opfaren i Forstrækkelse, hjælper *Zincum*.

Ved Forvridnings- eller Knuusningsmærter, eller haard, rødglindsende Svulst, ved en Fornemmelse, som om de lidende Dele laa for haardt, passer *Arnica*.

Ved stikkende, brændende Smærter, som forværres om Natten og ved Bevægelse, Ved meget ømsindtlig Svulst med glindsende, stærk udbredt Rødme, ved Blodstigning til Hovedet, Rødme i Ansigtet og Dinene, Banker i Pulsåarerne, anvendes *Belladonna*.

Mod heftig Rheumatisme i Ledene, som yttres sig snart hist, snart her, med Smærter, Svulst og Rødme, som ogsaa viser sig paa flere Steder samtidig, hjælper *Tartarus eme-*

ticus hurtigt. Indtræder, medens de rheumatiske Smerter staa paa, eller efter sammes hurtige Forsvinden, Uro, Angst, Hjertebanken, Beklæmmelse i Brystet, maa der strax anvendes Spigelia, dog er det i saa Tilfælde altid raadeligt, at tilkalde en Læge, da det maa befrygtes, at Rheumatismen kan slaa sig paa Hjertet.

Ved langvarige, kroniske Rheumatismer have desuden ogsaa Causticum, Ferrum, Lachesis og Sulphur viist sig virksomme, og deraf navnlig Causticum mod Smerter, som i fri Luft ere uudholdelige men i Værelset og i Sengen mindre, med fuldstændig Læmhed i eller Sammenbøjning af den angrebne Deel; Ferrum mod forældet Stivhed eller Sammenbøjning, navnlig efter Misbrug af Mercur; Sulphur ved haardnakkede Efterveer eller Tilbagesald og i noget forældede Tilfælde.

Mod Rheumatisme i Leddene med Svulst er fortrinnsviis at anbefale: Aconit, Arnica, Belladonna, China, Nitrum, Pulsat., Rhus. tox., Zinc; mod Rheumatisme med Sammentrækning og Stivhed: Bryonia, Caust., Lachesis, Rhus tox., Sulphur; mod rheumatisk Læmelse: Arnica, China, Ferrum, Rhus. tox., Ruta; ved omkring jagende Smerter: Bryonia, Pulsat., Zinc; forhøies Smerterne ved og efter Bevægelse: Bellad., Bryonia, China; ere de værst i Rolighed: Rhus toxicod., Rhodod., Dulcamara, Nux. vom., Lycopod. og Thuja; forværres de om Natten og i Sengenarme: Acon., Cham., Mercur, Pulsat., Colchic., Lycop., Rhus., Thuja.

Er Rheumatismen opstaaet ifølge en Gjennemblødning, anvendes især Rhus. tox., Calcarea,

Nux mosch., er den foranlediget af Træf eller Blæst: Calcarea, China, Belladonna; af tør Kulde: Arsen, Bryon., Nux vom.; viser den sig ved enhver Temperaturforandring: Bryonia, Calcarea, Colch., Dulcam., Merc., Nux mosch., Phosph., Rhodod., Rhus tox., Veratr. Stammer Rheumatismen fra Misbrug af Mercur, saa passer bedst: China, Jod, Hep. sulph., Sulphur; fra Misbrug af China: Arsen, Bellad., Ferrum, Pulsat., Veratrum; fra Misbrug af Valerian: Bellad., Mercur; fra Blyforgiftning: Bellad., Nux vom.,; fra Dryppert: Clem., Mercur, Tereb., Thuja.

### 3. Gigt, Podagra.

Gigt er en Sygdom, som er forskjellig fra Rheumatisme, allerede derved, at den ikke, saaledes som denne, især angriber Musklerne eller Senerne, men ubelukkende Leddene og især deres Baand og Beeneder, og forarsager voldsomme Anfald af Smerter, brust- og beenagtige Fortykkelser og Sammentræninger i Leddene (saakaldte Gigtknuder og Contracturer). Den er overhovedet en Sygdomstilstand i Leddene og Ernæringen, ved hvilken Organismen yttre en Tilbøielighed til i Leddene at affætte kalkagtige Masser af lignende Art, som Steensygdommen affætter i Nyrene og Blæren. Derfor er det en fornuftig Therapiens Opgave, ikke alene hurtigt muligt at bortfjerne de enkelte Gigtanfald, men tillige om muligt at helbrede de almindelige Anlæg til denne Sygdom og den sygelige Tilstand i Blodet.

Angaaende de enkelte Gigtanfald, saa angribe de som oftest Foden (Podagra) især Ballen paa den store, Taa, Fælen eller Fodleddet; kun i

Sygdommens videre Forløb angriber den ogsaa de øvrige Led, navnlig Knæ- og Fingerleddene. Ved Begyndelsen af Gigtanfaldet, især naar der er heftig Feber tilstede, bringe nogle IndgiFTER Aconit stor Lindring, er Svulsten haard og rødlig med Smerter, som om Ledet var forvredet, og en Følelse som om det var for tungt, anvendes Arnica; ved stærk Rødme og rosenagtig Betændelse af de omliggende Dele Belladonna. Ved rød, glindsende Svulst med heftige Smerter som i Knoklerne og fuldstændig Ubevægelighed, hjælper Sabina; forsøges Smerterne om Natten og i Sengenvarmen, er Ferrum, Mercur eller Rhus toxicod. bedst; springe Smerterne fra et Led til et andet, Pulsatilla. Hos Personer, som drikke megen Viin, og som pleie at nyde meget kraftig Kost, passer Aconit, Calcarea eller Sulphur.

Optraæder Gigten mere chronisk, eller danner der sig endog Gigtknuder eller Contracturer, saa ere Hovedmidlerne Calcarea, Causticum, Colchicum, Acid. phosphoricum, Ledum, Rhododendron og Sulphur, af hvilke overhovedet Calcarea og Sulphur bidrage det Meste til at helbrede Anlæg til Gigt; men Middelvalget er selvfølgelig afhængigt af mangfoldige specielle Omstændigheder, og Udsaldet er ligeledes betinget af en hensigtsmæssig Diæt og Leve-maade.

#### 4. Blodstød og Høsteværk.

Med det første Udtryk pleier man at betegne en for det Meste pludselig opstaaende Smerte i

Krybsæt, som Følge af at bukke sig eller at løfte Noget, en Smerte, der gjør enhver Bevægelse umulig, og som ved uhensigtsmæssig Behandling sædvanlig vedvarer 6—12 Dage. Nagtet dette Tilfælde hyppigt er af rheumatisk Natur, forekommer der dog ogsaa Tilfælde, hvor Smerterne paa Grund af legemlig Anstrængelse foranlediges ved Strækning af et Leddebaand eller Sønderrivning af enkelte Ledbetræde. I sidstnævnte Tilfælde er Arnica sædvanlig alene istand til at hæve Ondet i Løbet af 2—3 Dage, i førstnævnte Ledum. Skeer der gjentagne Tilbagefald vil Rhus toxicod. lettest hæve Dispositionen til denne Sygdom. Er der Complicationer med Underlivsbesværligheder, Forstoppelse, Hæmorrhoider maa der anvendes Nux vomica og Sulphur.

Desuden forekomme endnu Smerter i Ryg, Krybs og Lænder, dels af rheumatisk Art, dels som Følge af Hæmorrhoider, Rygmærvs- og Nyrelidelser, og ere efter deres Natur af meget forskjellig Betydning. Ved reent rheumatisk Affectioner af Ryg- eller Krybsmusklerne ville de under Rheumatisme givne Raad være at følge, altsaa isærdeleshed Arnica, Bryonia, Ledum, Rhus tox. være passende; ved Hæmorrhoidalaffectioner især Nux vomica og Sulphur. Følgerne af Rygmærvs- og Nyrelidelser egne sig ikke til Omtale for Ikke-Læger.

Ikke sjældent forekommer ogsaa en eienDOMMELIG Høftesmerte, som ikke har sit Sæde i Ledet, men i Høftemusklene og Lemmerne. Den ytrer sig ved en meget heftig Smerte, som undertiden strækker sig ned i Knæet, ja endogsaa

ned i Hælen, og som ofte gjør Gangen umulig. Imod denne Lidelse ere Hovedmidlerne *Belladonna*, *Colocynthis* og *Pulsatilla*; Imidlertid er ogsaa herved en sagtyndig Underfølgelse aldeles nødvendig, fordi der under lignende Symptomer kan fremkomme en langt farligere Sygdom nemlig en Betændelse og Forholdning af Lændemusklernes, hvis Behandling ikke kan tilraades nogen Iffe-Læge.

### 5. Skjørbug og Blodpletter.

Saaledes kalder man en Sygdom, som kommer af en eiendommelig, som det synes hovedsagelig vandagtig Opløsning af Blodet, og som ofte er Følgen af en udelukkende Rydelse af salte Spiser, hvorfor den fornemmelig pleier at forekomme paa Skibe og ved Kysterne; dog optræder Skjørbug ikke sjældent i enkelte Tilfælde uden denne Årsag. Sygdommen characteriserer sig navnlig ved blaalt, opsvulmet og blødende Tandkjød, blaaltgrøde Pletter paa Huden, foranledigede ved udtraadt Blod og ved Blødninger af enhver Art. Hertil slutter sig som oftest Ledbesmerter, almindelig Mæthed og Svaghed, forstyrret Fordøjelse og i heftige Tilfælde Feberanfald. Denne Lidelse er nær beslægtet med den saakaldte *Werlhoffske* Blodpletsygdom, og begge hidrøre aabenbart fra den samme sygelige Beskaffenhed i Blodet, kun at Lidsen ved denne hovedsagelig concentrerer sig til Huden, og ved Skjørbugen til Tandkjødet.

Hovedmidlet mod disse Sygdomme er *Phosphor*, det er altid at anvende, hvor der forefindes ophovnet, blødende Tandkjød, Blodopkastning og

Blodspytning, Næseblod, røde Pletter eller Striber paa Hud, især paa Arme og Been etc. Kun i Tilfælde, hvor Tandkjøbet ligesom er boldent og stinkende, og der viser sig Tegn til en forraadende Blodtilstand, passe endnu bedre Mercur, Kreosot eller Acid. sulphuricum. China er at foretrække, naar Hovedondet forstørstedelen er hævet, men naar den Syge er meget svækket paa Grund af Blodtab.

## 6. Koldfeber.

Denne Sygdom, som næsten alene optræder paa lavtliggende, fugtige, sumpebe Steder og som især forekommer om For- og Efteraar, yttres sig ved enkelte Anfald, som vende tilbage i regelmæssig Orden; ethvert af disse Feberanfald bestaar som oftest af tre Stadier, Kuldestadiet, den tørre Hedes Stadium og Svedstadiet, hvorefter den feberfri Tid følger, i hvilken Patienten sædvanlig idetmindste tilsyneladende befinder sig vel, med Undtagelse af Mæthed og Svagheb. Disse Feberanfald (Paroxysmer) vende tilbage enten hver Dag, eller hver tredje eller fjerde Dag, som oftest paa samme Tid. Saa let nu end denne Sygdomserkjendelse (Diagnose) i de fleste Tilfælde er, selv for Lægemænd, saa frembyder dens Helbredelse paa Grund af dens utallige Modificationer og de samme ledsagende Sygdomssymptomer, store Vanskeligheder, som ofte kun kunne overvindes af en Læge. Som Følge heraf kan her kun tages Hensyn til de sædvanlige Former, for hvilke Helbredelsesmaaden med Bestemthed lader sig angive. Angaaende den almindelige Anvendelse af China eller Chinin mod

Koldfeber, bemærker jeg strax paa Forhaand, at dette ingenlunde er det passende Lægemiddel for alle Former, og at det i alle Tilfælde, hvor det ikke passer, vel for nogen Tid kan undertrykke Anfaldene, men paa ingen Maade helbrede Sygdommen, idet det enten har langt heftigere Tilbagefald tilfølgende, eller fremkalder endnu langt betænkeligere Sygdomstilfælde. Overhovedet maa den Regel fastholdes, at denne Sygdom ingenlunde er hævet, saasnart de enkelte Feberanfald ubeblive; saalænge der endnu er Hævelser tilstede i Milten eller Leveren, Svulst i Fødderne, Fordøielsesforstyrrelser etc., vedvarer Sygdommen endnu, og den ringeste Foranledning kan atter fremkalde Anfald.

China eller Chinin, dette med Urette som Universal-Specificum mod Koldfeber priste Middel, er kun i de Tilfælde et virkeligt Lægemiddel, naar en directe Indvirkning af Sumpmiasma virkelig har fundet Sted, og desuden en meget betydelig Afkræftelse og Mæthed under og efter Anfaldene, urolig, forstyrret Nattesøvn, gul, askefarvet Ansigtssfarve, Ømhed for Tryk i en eller flere af Ryghvirvlerne, Ømsindtlighed i Milten, Rysten i Lemmerne, opspændt Underliv og sparsom, uklar Urin med rødt, krystalagtigt Bundfald er fremtrædende. De enkelte Feberanfald characteriseres ved Blødbefindende eller Tørst, Ulvehunger, Hovedpine, Uengstelighed før Kulden, ved Tørst sædvanligt mellem Kulden og Heden eller efter Heden og under Sveden; ved afværgende Kulde og Hede, eller ved Hede, som først kommer frem længe efter at Kulden er ophørt.

Arsenicum er Hovedmidlet i alle Febre, hvor Organismens vegetative Virksomhed er meget



aftaget, hvor Lever og Milt ere stærkt opsvulmede, Fødderne ophovne og hele Livskraften, især efter Chininmisbrug, er stærkt svækket. De enkelte Anfald udmærke sig ved Hestighed og lang Varighed, især ved et langt og heftigt Hede stadium med brændende, uflukkelig Tørst og stærk Ophidselse i Blodet, ved heftig langvarig Sved, som for det meste først bryder frem flere Timer efter Heden, og ved mangfoldige periodisk forekommende Besværligheder, navnlig Angst, Krampe, Smertex, Vildelse eller Lammelser, som i den feberfri Tid aldeles forsvinde.

Ipecacuanha er et udmærket Middel i alle Febre, som først ere begyndte for kort Tid siden, ofte som Følge af Diætfeil, og som ikke have forvoldt større Forstyrrelser i hele Organismen, især naar Mave- eller Brystbesværligheder staa i Forbindelse dermed, navnlig en Fornemmelse af Overfyldning og Tryk i Maven efter Maaltidet, Væmmelse, Ildebefindende, Opkastning, Diarrhoe, Sammensnøren og Tryk i Brystet, Aandedrætsbesvær, krampagtig Hoste. For det meste forekomme Symptomerne kun medens Feberanfaldet varer, især før eller under Kuldeperioden; sjældent vise de sig ogsaa i den feberfri Tid, og da ialfald kun svagt. Kulden, som mærkes mere indvendigt end udvendigt over hele Legemet, vedvarer længe og tiltager ofte ved Anvendelsen af udvortes Varme; Tørst er sædvanlig slet ikke tilstede eller kun i ringe Grad, saa længe Kulden varer, men den indfinder sig i Hedeperioden.

En lignende Virkekreds, som Ipecac. har *Nux vomica*, kun at dette Middel bedre passer for Febre, som have været længere og ere heftigere, og ved hvilke

der viser sig Afmagring, Affældighed, guulgraa Hudfarve og betydelige Forstyrrelser i Fordøjelsen. Ved de forskjellige Anfald er Kulbestadiet ikke skarpt adskilt fra Svedstadiet, saaledes at Kulde og Hede enten optræder blandet, eller Heden foran Kulden, eller ydre Hede med indvendig Kulde eller omvendt. Characteristisk er endnu især Patientens Forlangende om at blive tilbækket saavel under Kulde som under Hedeperioden, fordi han fryser ved den mindste Bløttelse. Sædvanlig ledsages hele Sygdommen af haard, besværlig Nafning.

Pulsatilla passer for flegmatiske, godmodige, blege og blodfattige Personer, især af Kvindeskønnet, med svagt, uregelmæssigt Maanedsflob. I Anfaldene spiller Kulden den største Rolle, ikke alene ved dens Heflighed, men derved, at den varer længere end Heden, og at den selv under denne, oftere vender tilbage. I den feberfri Tid viser der sig Tilbøielighed til at fryse, eller ialtfald ofte Kulde i Hænder og Fødder. Tørst er næsten aldrig tilstede, eller kun i ringe Grad i Hedeperioden, derimod bitter Smag, Opkastning af Sliim, Galde og af Syre, som ogsaa Svimmelhed, Hovedpine og rigelig, vandklar Urin.

Veratrum er Lægemidlet for visse, som oftest ondartede Koldfebre med stærk Følelse af Svaghed og Angrebethed, virkeligt Svind af Kræfterne, langsomt og svagt Hjerte- og Pulsflag, rigelig, vandagtig Diarrhoe med Opkastning, bleg, kold Hud, og kold Sved, stor Slappelse og Blegthed i Ansigtet eller blaalig Farve i samme. Anfaldene selv ubmærke sig ved fremherstende Kulde og ringe ubvendig, næsten umærkelig Hede, ved Tørst under

Kulden og mørk, sparsom Urin. De nævnte Visymptomer indtræde næsten alle under Kuldestadiet.

Ignatia passer for Febre af lettere Slags, som ere opstaaede hos sensible, pirrelige Personer, efter Skræk, Vrgrelse eller Frygt. I Anfaldene afverle Kulde og Hede meget hurtigt med hinanden, optræde undertiden samtidig, eller indtage kun en enkelt Deel af Legemet, saaledes at f. Ex. i Hede-stadiet Fødderne ere kolde; Tørst bemærkes kun i Kuldestadiet; Kulden lader sig let hæve ved ydre Midler. Den feberfri Tid er, med Undtagelse af nogen Mæthed, uden alle Besværligheder.

Ferrum anvendes især efter Chininmisbrug ved stor, lammende Svaghed, Svulst og Haardhed i Leveren og Milten, Oppustethed i Underlivet, Svulst i Fødderne, Blegghed af Læberne, Tandkjødet og Gummerne, Blæsen i Halsaarerne (et Tegn paa Blodfattigdom). Desuden ere Anfaldene ledsagede af Blodstigning til Hovedet, Svimmelhed, Hovedpine, opsvulmede Arter, Opsvulmen om Vinene, Trykken i Maven og Underlivet selv om man kun nyder lidt, eller Opkastning af Maden og Spænden i Livet, som forarsager Kortaandethed.

Cina er godt mod Febre, i hvilke der efter Anfaldet, ofte endog saa under samme, indtræder Graadighed med Sultfornemmelse, selv om der kort forinden har fundet Opkastning Sted. Characteristiske Kjendetegn ere endvidere en bleg, gusten Ansigtssfarve, Rande om Vinene, udvidede Pupiller, Tørst i Kuldeperioden, næsten aldeles reen Tunge.

Natrum muriaticum passer i forældede Febre eller gjentagne Tilbagefald med Knokkelsmerter, gul Ansigtssfarve, bitter Mundsmag, Betændelse i Mundtrogene, stærk Svækkelse. I Kulde-

perioden eller endnu hyppigere i Hebeperioden er der slemme Hovedsmerter tilstede, i Hebeperioden en berøstløs Henliggen, og Laage for Vinene.

Capsicum er et vigtigt Middel ved Kulde med feen, indtil 14 Timer derefter følgende Sved, uden at der viser sig Hebe derimellem, eller naar Heben kommer før Kulden. Tilmed er Tørsten kun betydelig, medens Kulden vedvarer, og under Heben en heftig Brænden indvendig og udvendig, flimebe, brændende Diarrhoer, megen Besværighed af Slim i Munden, Halsen og Maven og Afstyk for enhver Støi.

## 7. Blegfot, Chlorose.

Uagtet Blodfattigdom, Blegfotens Grundlidelse, netop i Rutiden meget hyppigt kan optræde som Bisymptom eller Følgesymptom i ganske forskellige Sygdomme, saa maa Blegfoten, saaledes som den, navnlig hos unge Piger i Udviklingsaarene, ofte fremtræder, dog betragtes som en selvstændig Sygdom og her behandles som saadan. Dens meest fremtrædende Symptomer ere: bleg, næsten grønlig Hudfarve, hvidagtig og blodtom Farve paa Læberne, Tandkjødet, Gummerne og den indvendige Side af Dienlaagene, megen Muskelsvagthed og Kraftløshed, kolde Lemmer og Tilbøjelighed til at fryse, Kortaandethed og Hjertebanken efter enhver Legemsbevægelse, Fordøjelsesbesværigheder, især Modbydelighed for Kjød og nærende Spiser, Udeblivelse af eller Uregelmæssigheder ved Reglerne, hvidt Flod, Hovedpine, Mangel paa Energi, Forstemthed. Det sikreste Symptom er den saakaldte „Nonnestøi“, en eiendommelig Susen og Brusen, som ved Hjælp

af Stethoskopet tydelig kan høres i de store Hals-aarer.

Ved Behandlingen af denne Sygdom er For-  
skriften af en passende Diæt og Levemaade en  
Hovedsag. Da Blodmangel er en Følge af en  
mangelfuld Blodsammensætning og en utilstrækkelig  
Tilgang af Blod, saa maa der fremfor Alt, efterat  
Fordøielseorganerne igjen ere bragte i behørig Virk-  
somhed, tilføres Legemet letfordøielige, men kraftige  
og blodproducerende Næringsmidler, altsaa Rjød-  
suppe og godt Rjød, blødkogte Æg, Mælk, godt  
Ol. Imidlertid er det en Bidsfarelse, eller en Over-  
drivelse af Nutiden, naar man antager, at Blegkot  
eller Blodmangel altid er en Følge af utilfreds-  
stillende Næring, altsaa et Slags Sultesygdom.  
Det er sikkert, at den meget oftere ikke er en Følge  
af en for ringe Tilførsel af Næring, men at den  
opstaaer og bestaaer som en Følge af mangelfuldt  
Udbytte og Assimilation af det, som tilføres Lege-  
met. Ligefermt latterlig er derfor den Fremgangs-  
maade af de fleste Læger, at de opfordre deres  
Patienter til at nyde Masser af Æg og Rjød, for-  
inden deres Mave og Tarmkanal er istand til at  
fordøje og assimilere kun en Brøddel deraf. Frem-  
deles maa der sørges for sund Luft, Reenlighed,  
henigtsmæssig Legemsbevægelse og Beskjæftigelse,  
medens alle Sindsbevægelser og Pirringer maa  
undgaaes. Af Lægemidler ere de vigtigste: Pulsa-  
tilla, China, Calcareo og Ferrum. Pulsa-  
tilla især i Begyndelsen af Behandlingen, naar  
Fordøielsen er stærkt forstyrret og ikke istand til at  
tilføre Legemet og Blodet brugbare Stoffer; China  
ved virkelig legemlig Svækkelse med stærk Pirrelig-  
hed især som Følge af svære Sygdomme og Tab

af Kræfter; Calcareæ ved stor Svaghed, nervøs Svækkelse, Blodstigninger, Hjertebanken, Rygsvagthed især ved at sidde, svampeagtig Fedme eller Op-pustethed i Legemet, Afsty for Rjød og varme Episer, Lyst til Skarpt og Surt, Mavesyre, Mi-græne; Ferrum, naar Legemets Organer ved Pul-satilla ere satte istand til at erstatte de Blodbestand-dele, som ere gaaede tabte. I ethvert Tilfælde maa Jern gives i længere Tid og stærk Indgiot (2—3 Draaber af Tincturen eller 1ste Fortynding). Imid-lertid advares meget stærkt mod Anvendelsen af Jern i alle Tilfælde af Blegfot, som hidrøre fra Hjertelsyge, uhelbreddelig Lungesvindfot er i saa Tilfælde kun altfor hyppigt den sikreste Følge af Overfyldning af Jern.

I Tilfælde, hvor Blegfoten kun er foranlediget af svære Bloctab eller andre Marsager, vil for-uden Ferrum isærdeleshed China virke meget vel-gjørende, og ligeledes ved overordentlig Pirrelighed og Svækkelse af Nerverne Ignatia.

Det er en Kjendsgjerning, at enkelte Tilfælde af denne Sygdom endnu behøve andre Lægemidler, saasom Natrum muriaticum, Phosphor, Sulphur, Chamomilla; imidlertid passe disse ikke for Læg-mand, da Undersøgelsen paa Grund af mulige Combinationer med Hjerte- og andre Sygdomme udfordrer udbannede medicinske Rundstaber, og Be-handlingen sælgelig ofte er vanskelig.

## 8. Krampe.

Man betegner ved dette Udtryk, som i det daglige Liv meget ofte anvendes feilagtigt og bliver forverlet med andre Symptomer, en sygelig Til-

stand i Nervesystemet, som giver sig tilkjende ved uvilkaarlige og uregelmæssige Bevægelser af enkelte Muskler eller af hele Muskelgrupper og Lemmer (Trækninger, Convulsioner, Sammentrækninger). Allerede heraf fremgaaer det, at Krampe ikke er nogen selvstændig Sygdom, men kun et Sygdomssymptom, og det et Symptom, som kan optræde ved forskjellige Sygdomme, idet det kan fremkaldes ved forskjellige Aarsager, saasom overordentlig Pirrelighed i Nervesystemet, Udsvedning og Betændelse i Hjernen, mekanisk Tryk paa eller Bestaabigelse af enkelte Nervestammer, utilstrækkelig Ernæring af Nervemassen ved Blodfattigdom. Derfor er ogsaa Betydningen af og Faren ved Krampe efter Omstændighederne meget forskjellig, og ligeledes naturligvis dens Behandling og Helbredelse, og det vilde overhovedet være uberettiget, her at indrømme den et eget Kapitel, dersom der ikke netop temmelig hyppigt optraadte enkelte Former af denne Sygdom, som ere temmelig constante, hvis Behandling ere mulige for Lægmand, og som derfor maa være ham meget ønskelig.

Barnealderen overhovedet, og navnlig den Tid, hvori Barnet faaer Die, er særlig disponeret til Krampe paa Grund af Nervesystemets stærke Pirrelighed, og forholdsvis ringe Omstændigheder, saasom Tand-, Orme- og Fordøielsesbesværligheder, Opkastning, Skræk og Frygt, ere istand til i denne Periode at fremkalde Krampe. Om disse vil der senere under Børnesygdomme nærmere blive Tale.

Krampe hos Borne (bortseet fra Liigfald, Beitsdans og Stivkrampe) er sjældent farlig, især hos sensible og hysteriske Fruentimmer, og behøver under selve Anfaldet næppe nogen Lægehjælp. Navn-

lig gjælder dette om Latter- og Grædekrampe hos hyfteriske Personer, da det hos saadanne hovedsagelig kun kommer an paa Helbredelsen eller Formindsfelsen af den overvættes almindelige Virrelighed og Omfindtlighed; i meget heftige og vedvarende Anfald er det imidlertid ofte hensigtsmæssigt, at anvende Hyoscyamus, Platina eller Stramonium. Imod Krampeanfald som Følge af Skræk eller Frygt er for Borne Opium og undertiden Ignatia det hensigtsmæssigste Middel.

Krampe i Læggene er med Undtagelse af Choleratilsfælde af let og farefri Natur, uagtet den undertiden, om Natten i Sengen, kan være yderst smertelig og besværlig; af ganske lignende Art er den Krampe, som forekommer i Fodsaalerne og i Lemmernes andre Musfelpartier. Den forsvinder hurtigt ved at strække eller sætte samme fast imod noget, eller ved at stryge de sammentrufne Musfler mod en Jernnøgle. Som Forhindrengs- og Hjælpemiddel mod hyppige Gjentagelser anbefales Ferrum, Sulphur, Secale cornutum\*) eller Veratrum.

## 9. Epilepsi (Tiigfald).

Uagtet Behandlingen af denne Sygdom netop ofte er en af de vanskeligste, og Lægen ikke sjældent maa anvende den største Omhu og Opmærksomhed for deels at finde de høist mangfoldige Aarsager til denne Sygdom, deels for at opbage et Holdpunkt

\*) Dette Middel har jeg fundet meest virksomt baade i lavere Forthvnding (6te—12te) og i høiere (30te).

Dr. S.



for Middelvalget i tilsyneladende Bifymptomer og Smaating, saa tilbyder dog Homøopathien for adskillige Arter af disse Kramper, navnlig hos Børn, saa bestemte Lægemidler med saa fikre Følger, at ogsaa Lægmanden bør være underrettet om samme, for at han i passende Tilfælde kan skride ind derimod med Held.

Først og fremmest gjælder som Hovedregel, at der sædvanligen under selve Anfaldet ikke maa anvendes noget som helst Lægemiddel, hverken indvendigt eller udvendigt, og at der kun maa sørges for, at Patientens Leie er hensigtsmæssigt, at han ikke kan bestadige sig ved at falde ned eller ved at flaa om sig, og ikke generes af Klædningsstykker. Først naar Anfaldet er forbi, er det Tid at give det passende Lægemiddel, thi den homøopathiske Behandling gaaer ikke alene ud paa at forforte og mildne det enkelte Anfald, men saavidt muligt at forebygge dets Tilbagevenden, altsaa radikalt at hæve Sygdommen.

Har Epilepsien, især hos Unge, ikke varet længe, er den fremkommen som Følge af Skræk, eller kommer der let et Anfald ved en heftig Sindsbewægelse, saa er Ignatia Hovedmidlet. Isærbelesshed passer det hos sensible, særlig pirrelige, ængstelige, frygtsomme Folt med letforanderlig Sindstemning og Overstadighed i Glæde og Sorg, ligesom i den modnere Alder hos Ugifte eller Personer, hvis Kjønndrift ikke er bleven tilfredsstillet.

I Tilfælde foranlebigede af lignende Aarsager passer ogsaa undertiden Opium, isærbelesshed naar Anfaldet er ledsaget af en langvarig, tung Søvn, med mørkerødt, oppustet Ansigt, langsomt, snorkende Aandedræt, langsom, ofte svag Puls og Trækninger i Ansigtet.

Det tredje Hovedmiddel i ny Tilsælde er Belladonna; det egner sig især for fuldblobige Personer, som ere tilbøielige til Blodstigen til Hjernen, med bevidstløs Henliggen eller pludselig Opfaren af Søvne med Strig og Frygt, Fornægtelse af Tilsældene ved Berøring, med Krampe i Svælgget eller ved at synke, ved fordreiede, stirrende Øine, udvidede Pupiller, fuld, haard, hurtig Puls.

Cuprum anbefales, naar Trækningerne efterhaanden begynde i Fingrene eller Tærne, ved Sammentrækning af Tømmelfingeren, Spytflod, hyppig Vandladning og Tilbagefald med bestemte (maanedlige) Mellemrum.

Lachesis passer mod Anfald, som begynde med Tankeløshed, Svimmelhed, Fødsulde, Hjertebanken, Opstød, Oppustethed, og som følges af Sliim i Mund og Hals, Trængen til Vandladning eller ufrivillig Urinafgang og en meget dyb Søvn.

Ved chronisk, forældet Epilepsi ere Sulphur og Calcarea de bedste Midler; Sulphur især belestthed, naar der før Anfaldet kommer en Fornemmelse, som om en Muus løb igjennem Musklerne fra neben og opad; Calcarea især ved Anfald, som komme om Natten (ligesom ved Opium). Forøvrigt vil her i de fleste Tilsælde en tilfredsstillende Behandling kun kunne opnaaes af en sagkyndig Læge.

Hos Børn er Drm ikke sjældent Aarsagen til Epilepsi, og i saa Tilsælde ere naturligtvis de Lægemidler at anvende, som passe derpaa; overhovedet er der hos Børn næsten altid mere Udseende til en radical Helbredelse end hos Vorne.

## 10. Stivkrampe og Mundflemme.

Stivkrampe er altid kun et Symptom paa eller en Følge af en anden Sygdom, som oftest af et Saar eller en Forgiftning; og dens Behandling kan derfor ikke foretages af nogen Lægmand. Hovedmidlerne mod denne farlige Sygdom ere Angustura, Belladonna, Camphora, Ipecacuanha, Moschus, Opium, Platina, Secale og Stramonium.

Det samme gjælder ogsaa om Mundflemme som ligeledes kun optræder som et nyt og meget faretruende Symptom for en allerede tilstedeværende Sygdom. Her anbefales som hensigtsmæssigt Belladonna, Camphora, Hyoscyamus, Ignatia eller Veratrum.

## 11. Besvimelser, Afsmagt.

Sædvanligt ere Besvimelser, særlig hos Fruentimmer og sensible, svagelige Personer, uden nogen som helst Fare. Kun maa man bringe Bedkommende i et bekvemt Leie og løse alle generende Klædningsstykker. Er Afsmagten meget dyb og varer den længe, saa sprøiter man koldt Vand i Ansigtet i fine Draaber, gnider Hænderne og Fodsåalerne med en Børste og lader Patienten lugte til Eau de Cologne eller Kamferspiritus. Anvendelsen af store Masser af stærke og skarpt lugtende Substantier, saasom Hjortetæl og Ammoniakvand, er ganske overflødig, ja undertiden ligefrem skadelig.

I enkelte Tilfælde, især ved Tilbøielighed til Besvimelser eller ved tilbageblivende Besværligheder, kan ogsaa lægekyndig Hjælp være nødvendig. Har Stræk eller Angst været Aarsag til Afsmagten,

saa giver man Opium eller Coffea, ved Svækkelse og Slaphed ifølge Blødninger, Forboldninger, Diegiving, Diarrhoer og Sygdomme: China; hos hysteriske og blegfottige Piger: Pulsatilla og Ferrum; mod Afmagt ifølge heftige Smerter: Aconit eller Veratrum; mod Afmagt som Følge af Væmmelse eller Synet af Blod og Saar: Ipecacuanha. Veroer Tilbøieligheden til Afmagt paa organiske Hjerte- eller Lungesygdomme, saa vil Belladonna i mange Tilfælde være af stor Nytte, dog vil for det meste kun en Læge være istand til at yde væsentlig Hjælp. Under en dyb Afmagt kan man ogsaa anvende disse Lægemidler ved at lade lugte til samme, naar det ikke lykkes at aabne Munden.

Derfor der under Afmagten eller efter samme indtræder Opkastning, maa man ikke forstyrre den, ligesaa lidt som den Søvnen, der ofte følger efter, da den er den bedste Bedrøvelsel og Styrkning.

## 12. Slagfald og Lamhed.

Slagfald, Apoplexi, er en altfor farlig Sygdom, til at en Lægmand skulde paatage sig dens Behandling, derfor kan der her kun gives nogle faa Forskrifter om den første Hjælp, da der ofte i Tidsspilde kan ligge en stor Fare.

Efter at Patienten er bragt i et hensigtsmæssigt Leie, og alle besværende Klædningsstykker ere bortfjernede, vil det i de fleste Tilfælde være hensigtsmæssigst, at anvende nogle Ingviter Arnica. Kun for ældre Personer, og især naar der bemærkes rallende Aandedræt, Snorken og Fare for

en Lungelammelse, passer Baryt bedre; ved fuldkommen Veridsiløshed, udvidede Pupiller, højrødt og spændt Ansigt, meget Synkebesvær, maa Belladonna eller Opium foretrækkes.

Om andre, ydre eller indre Lægemidler ere nødvendige, kan kun en Læge bedømme.

De almindelige Lamheder, som blive tilbage efter Slagflod i enkelte Dele af Legemet eller i hele den ene Halvdeel af samme udfordre ligeledes næsten i alle Tilfælde en nøiagtig lægevidenskabelig Undersøgelse og Behandling; kun i mindre betydelige Tilfælde kan Lægmand gjøre Forsøg med de i det Følgende angivne homöopathiske Lægemidler. Imod de Lammelser, som ere almindelige efter Slagflod, naar de imod Slagfloddet anvendte Midler, som Arnica, Belladonna etc., ikke have ydet nogen eller kun en ufuldstændig Hjælp, er sædvanlig Rhus toxicodendron i stærke Indgiver Hovedmidlet, som fortsættes i længere Tid; senere efter især Coccus og Causticum.

Med Hensyn til de forskjellige Legemsdele, som træffes af Lamheden, kunne følgende Antydninger benyttes.

Mod Lamhed i Ansigtsmusklene kan anbefales: Bellad., Causticum, Graphit, Stramon.

Mod Lamhed i Øienlaagene: Bellad., Plumb., Sepia, Spigelia, Stramon., Veratr.

Mod Lamhed i Tungen: Bellad., Caustic., Lachesis, Ac. muriat.

Mod Lamhed i Overlemmerne: Cocc., Ferrum, Nux vom., Rhus toxic.

Mod Lamhed i Underlemmerne: Bryon., Plumb., Secale corn., Veratrum, Zinc.

Mod Lamhed i Blæren: Bellad., Camphora, Cantharis, Nux vomica, Pulsatilla.

Behandlingen af Lamheder som Følge af Rheumatisme og Gigt maa eftersees i de paagjældende Kapitler; Lamheder som Følge af undertrykte Af- og Udsønderinger eller af forbrevent Hududslæt finde undertiden deres Lægemidler i Sulphur og Dulcamara, af Gjennemblødning og Forkjølelse især Rhus toxicod.

### 13. Søvnløshed og Besvær ved Søvn.

Søvnløshed og urolig Søvn er næsten altid Følgen af andre Lidelser, hvorfor fremfor Alt disse maa medtages i Betragtningen; men ogsaa i de sjældne Tilfælde, i hvilke Søvnløsheden skulde være det eneste Symptom som viser sig, vil Aarsagen dertil være at efterse i Levemaaden eller i en eller anden daarlig Vane. De sædvanlige Aarsager ere: overdrevent aandeligt Arbejde, lang Vaagen, hyppig Nydelse af stærk Kaffe eller The, seent Aftensmæd, Overfyldning af Maven, stærk Sindsbewægelse og Lidenstabelighed etc. Den snarest mulige Hjælp af disse er det Vigtigste af Ruren mod Søvnløshed, ligesom ogsaa en passende legemlig Bewægelse og Træthed, og fremfor Alt en vis Regelmæssighed i at gaa tilfængs er det væsentligste Lægemiddel berimod, thi netop i dette Tilfælde er Vanen af stor Indflydelse og kan ved en rigtig Anvendelse blive det bedste Lægemiddel.

Er Søvnløsheden en Følge af hyppige og stærke Sindsbewægelser, saa er en Indgiwt af Aconit eller Opium en Time før man gaaer tilfængs det Hensigtsmæssigste; har der allerede dannet sig

en vedvarende og almindelig Virrelighed og Nerveophidselse, saa er Coffea endnu bedre. Ved Rummer, nærmest Sorg og ængstelige Tanter er Ignatia, og ved overordentlige Aandsanstrengelser og overbreven Rydelsen af Kaffe anvendes Nux vomica. Imod Søvnløshed hos Oldinge hjælper som oftest Opium eller Conium, medens Søvnløshed hos Pattebørn og Børn fordrer Aconit og Coffea, eller isald Vinde og Jordsielsesbævrer, som det ofte hænder, er Skjold i deres Uro, Chamomilla og Jalappa. Mod Søvnløshed ifølge for fildige og for rigelige Maaltider, virker Pulsatilla godt, ligeledes Arnica, især naar der føles Angst, Hjertebanken og indvendig Hebe, som om der flød varmt Vand i Aarerne.

Belladonna anbefales ved stærk Søvnhighed, men forgjæves Bestræbelser for at sove, naar man farer ængstelig sammen ved Indslumringen, har skræmmende Billeder ved Sønnen, kaster sig frem og tilbage og føler tør Hebe.

Sulphur mod stærk Søvnhighed om Dagen, især om Eftermiddagen og om Aftenen, Søvnløshed om Natten i Sengen med Uro og Krillen i Lemmerne, naar man kun kan sove i Rygleie eller i halv siddende Stilling.

Imod de vigtigste Søvnbesværligheder egne sig hovedsagelig følgende Lægemidler:

Imod tung, bedøvende Søvnhighed og Svimmelhed om Morgen: Belladonna, Opium, Stramonium, Tartarus emeticus.

Imod for let Søvnhighed: Chamomilla, Lachesis, Mercur, Ranunc. sceleratus.

Imod ængstelig Søvnhighed: Aconit, Arsen, Belladonna, Phosphor, Rhus toxicod.

**Imod urolig Søvn med stærk Omtaalen:**  
Arsen, Belladonna, Chamomilla, China,  
Phosphor, Rhus toxicod.

**Imod Søvn med Drømme:** Bellad., Bryonia,  
China, Nux vomica, Phosphor, Pulsatilla,  
Sulphur.

**Imod uvederfølgende, mattende Søvn:**  
Alum., China, Lycopod., Phosphor, Sul-  
phur, Zincum.

**Imod ofte afbrudt Søvn:** Arsen, Bella-  
donna, Digit., Laches., Mercur, Nux  
vom., Pulsatilla.

**Imod afbrudt Søvn med hyppig Sammen-  
faren:** Bellad., Bryonia, Cuprum, Hyos-  
cyamus, Ipecacuanha, Opium, Pulsat.,  
Sulphur.

**Imod at tale og skrige i Søvn:** Arsen,  
Bellad., Cham., Jalappa, Ignatia, Nux  
vom., Pulsat., Zincum.

**Imod Træklinger eller Fordreining af  
Zinene i Søvn:** Bellad., Cham., Coccu-  
lus, Hyosc., Ignatia, Ipecac., Veratrum.

**Imod Mareridt:** Aconit, Nitrum, Nux  
vom., Opium, Pulsat., Sepia, Sulphur.

**Imod Krampe i Læggene:** Cuprum, Secale  
cornutum, Sulphur, Veratrum.

**Imod Tænderskjæren:** Arsen, Bellad.,  
China, Helleborus.

**Imod Snorken:** China, Ignatia, Nux vom.,  
Opium, Stramonium.

**Imod Søvngjænger:** Bryonia, Opium,  
Phosph., Silicea.

**Imod at børe Hovedet ned i Puderne:**  
Bellad., Helleborus.



#### 14. Besværligheder og Sygdomme ved Svangerskab, Fødsel og Barselseng.

Det er let begribeligt, at en saa betyden-  
de Begivenhed, som Undfangelsen, Udviklingen og Fød-  
selen af Barnet for det kvindelige Væsen kun  
sjældent forløber uden forskellige og mangfol-  
dige Besværligheder og Vanskeligheder, ligesom den  
ogsaa navnlig kan give hyppig Anledning til for-  
forskjellige eienbommelige Sygdomstilfælde af større  
eller ringere Betydning. Uagtet det nu her ikke  
kan være Opgaven, at give en fuldstændig Diætetik  
for Frugtommelige og Barselskvinder eller en ud-  
førlig Afhandling om alle i dette Tidspunkt op-  
trædende Lidelser og Sygdomme, skulle vi dog  
omtale nogle af de almindeligste Tilfælde og  
Uregelmæssigheder, og angive de meest hensigts-  
mæssige Midler til deres Afhjælpning eller Lindring,  
saameget mere, som der netop i denne Henseende er  
udbredt en Mængde af de meest forkeerte Anstuelser  
og Ufornuft, og Kvakalveri har bragt en utallig  
Mængde skadelige Vaner og Lægemidler i Brug.

Fremfor Alt maa enhver Frugtommelig be-  
tænke, at selv det gunstige Forløb af denne Til-  
stand ikke kan finde Sted uden forskellige Besvæ-  
rligheder og Ubehageligheder og at saadanne langt-  
fra altid ere Abnormiteter og sygelige Tilstande,  
imod hvilke der strax maa anvendes Hjælp og  
Lægemidler, men langt hyppigere ere naturlige Om-  
stændigheder, som ere en nødvendig Følge af selve  
Tilstanden. Kraften til at bære disse med Taal-  
modighed og Glæde, og tillige stadig at anvende den  
største Omhu med Hensyn til fornuftig Paalædning,  
Diæt, samt Vægs- og Sjælsro, vil enhver Kone

bedst finde i den Bevidsthed, at hendes eget og hendes tilkommende Barns Vee og Vel er afhængigt deraf, og at hun netop heri har at søge den bedste Sikkerhed for et lykkeligt Udfald.

En af de hyppigste Besværligheder, som for detmeste allerede indtræder i Svangerskabets første Maanedes, er Jildebefindende og Opkastning; fremkommer disse i Forbindelse med andet Forbøielsesbesvær, saasom Mangel paa Appetit, Halsbrynde, Mavekrampe etc., saa er Ipecacuanha, Sepia og Nux vomica sædvanligt de passende Midler, navnlig det sidste, naar de staa i Forbindelse med haardt Liv, og naar man føler dem paa fastende Hjerte. Undertiden forekommer Opkastningen ogsaa uden alle Vibesværligheder og i Forbindelse med upaaflegelig Appetit, i saa Fald er Kreosot meest at anbefale.

Imod den ligeledes hyppige Forstoppelse og Haardlivethed, er, foruden Bryonia og Nux vomica, isærdeleshed Sepia virksomt; dog maa denne Besværlighed samtidig modarbeides ved en passende Kost og Diæt. En Frugtsommelig bør nemlig aldrig nyde meget faste, vanskeligt fordøielige Spiser, mindst i større Omfang, ligeledes bør alle oppustende Retter, navnlig Urter og Raal, kun tilledes i ringe Mængde, da disse som bekjendt udkræve en større Fordøielsekraft end dyrisk Kost og tørre Grøntsager, og tilmed stedse affætte flere Excrementer i Larmene. Ligeledes bør en Frugtsommelig altid gjøre sig det til Regel, meget omhyggeligt at tygge alle Spiser og at synke dem langsomt, saavel som aldrig at spise meget paa engang, men hellere spise oftere. Derfor Ondet trods alle disse Forholdsregler ikke lader sig fjerne,

ſaa er det henſigtsmæssigt, Tid efter anden, at hjælpe derpaa ved ſimple Vandklyſterer.

Imod Diarrhoe hjælper hyppigſt Acidum phosphoricum og Veratrum, ſaavelſom imod Kolik og ſkjærende Smerter i Underlivet Pulsatilla og Colocynthis.

Indfinder ſig Urinbeſværligheder, iſær gjentagen Trang eller Standſning, ſaa hjælper Conium og Pulsatilla; naaer Standſningen en høi Grad, maa der bruges Cantharis og beſuden varme Omſlag af Hørfrø i Blæreeggen.

En hyppig og plagende Lidelse er endvidere Tandpine. De virkſomſte Midler derimod ere Belladonna og Pulsatilla, ved meget hyppig Gjentagelſe af Smerterne, eller derſom begge diſſe Midler viſe ſig uvirksomme, Sepia eller Calcareo carbonica.

Imod Hovedpine, Svimmelhed og Blodſtigning til Hovedet hjælpe beſt Belladonna, Nux vomica og Sul. ac., og imod de gule og brune Pletter i Anſigtet Sepia.

Imod Hævelſe i Blodaarerne paa Laarene, Aareknuder, maa der intet bruges, ſaalænge den ikke bliver meget ſtærk, da de ſom ofteſt have en mechaniſk Aarſag og ere farefri, kun naar de opnaa en overordentlig Udſtrækning, foraarſage almindelig Fodſvulſt og true med Sprængning, maa der indvendig bruges Pulsatilla, Carb. veg., Lycopodium eller Sulphur, udvendigt Lærredsbind eller Snøreſtrømper. Ogſaa maa lang Sidde, Staaen og Hængen med Fødderne

undgaaes, og Fødderne bringes i horizontal Stilling.\*)

Indtræder eiendommelige Lyster og Ønsker, maa disse, dersom de paa nogen Maade synes skadelige eller betænkelige, overvindes ved eget Afkald; thi Mennesket har jo, i Modsatning til Dyret, faaet Fornuft og Villiekraft, for at modstaa Sligt; hyppigt kan ogsaa nogle Indgiuter Platina forminde Heftheden af slige forkeerte Smagsretninger og forhindre deres Gjentakelse.

Blodstyrtninger ere hos Frugtsommelige altid betænkelige, da de næsten altid ere Forløbere for eller Ledfagere af for tidlig Fødsel (Abortus), hvorfor ogsaa begge disse Tilfælde her afhandles under eet. Viser der sig som Følge af et Fald, et Stød eller en Rystelse Blodafgang eller kun en usædvanlig, veeagtig eller pressende Smerte i Underlivet hos en Frugtsommelig, saa er Arnica i gjentagne Indgiuter, saavel som et horizontalt Leie og stor Regems- og Sindsro at anbefale; skulde derimod en heftig Sindsbevægelse, saasom Skræk eller Brede, være Aarsagen, saa kan man, naar det kan skee øieblikkelig eller hurtigt derefter, bruge Aconit eller Coffea. Vedbliver Blodgangen besvæget, eller optræder den strax med Heftheden, ledsaget af skjærende Smarter om Navlen, Trykken nedad eller Stød med Krampe i hele Legemet, er som oftest Ipecacuanha det virksomste Middel, eller Chamomilla, naar den heftige Skjæren op-

\*) Jeg foretrækker elastiske Bind for elastiske Strømper. Staaen er skadeligt, hvorimod Stillesiddende med Fødderne eller Benene i horizontal Stilling, og Bevægelse ikke virker skadeligt.

træder periodisk i Forbindelse med Trængen til Vandladning og Abniug, Kulde og stor Uro. Opstaaer virkelige Beer med meget betydeligt Blodtab i store Klumper størket Blod, Trængen til Abning, Diarrhoe, Kvalme eller Opkastning, passer Sabina, hvilket Middel undertiden ogsaa endnu kan forhindre Aborten, og tillige, selv om den har fundet Sted, virke meget fordeelsagtigt, mod vedvarende Blødning og betænkkelig Svækkelse.

Bedvarer Blodafgangen ogsaa efter Aborten i høi Grad, og navnlig naar Blodet er sort, klæbrigt, blandet med Klumper, tilligemed Svækkelse og guulagtig, gulsten Ansigtssfarve, passer Crocus medens China endnu virker i de farligste Tilfælde, hvor der kan ventes Forblødning med Afmagter, Svimmelhed, Bedøvelse, Blegthed og Kulde i Ansigtet og Lemmerne. Imod de skadelige Følger af et stærkt Blodtab, vise China og Ferrum sig som de bedste Midler. Iøvrigt kan man sammenligne, hvad der er sagt angaaende Blødninger i Livmoderen under Affnittet Besværligheder og Uregelmæssigheder ved Reglerne.

Imod Anlæg til Abort, som forekommer temmelig hyppigt hos svage og pirrelige Koner i de første Maanedes af Svangerskabet, og som ingenlunde alene er afhængig af ydre mekaniske Aarsager, ere Sepia og Platina de bedste Midler. Da dette Uheld sædvanlig indtræder til den samme Tid i Svangerskabet, hvori det første Gang fandt Sted, og overhovedet Dispositionen dertil altid bliver større, jo oftere det er indtraadt, saa maa allerede nogle Uger forinden, eet af disse Midler bruges hver 2den eller 4de Dag, og Sepia især naar stærk Fuldblodighed, Besværligheder i Underlivet

og Leverlidelser maa formodes at være Aarsag dertil, medens Platina passer i de sjældnere Tilfælde, hvor overordentlig Pirrelighed, hysterisk Overspændthed og nervøs Svækkelse ere tilstede. Af denne Disposition for Svangre til Blødninger og Aborter, er det en Selvfølge, at Enhver allerede fra den første Svangerskabsmaaned strængt maa afholde sig fra alle stærkere legemlige Bevægelser og Rystelser, navnlig ogsaa fra Dans og fast Engring. Ja selv i Tilfælde, hvor disse Ulemper ikke skulle medføre de her omtalte Skader, ville de dog ikke undlade at udøve en Indflydelse paa Barnets almindelige normale Udvikling.

Under selve Fødselsacten er det fortrinsviis Beerne, som undertiden kunne udkræve Lægehjælp. Naagtet disse altid ere smertelige, og derfor Smerten ingenlunde kan betragtes som et sygeligt, unormalt Symptom, er dog samme undertiden saa overordentlig eller Ømsindtligheden ved samme saa heftig, at det kan være hensigtsmæssigt at lindre den, for at undgaa altfor stor Uro, Feber og Krampe. Det virksomste Middel er Coffea, eller, naar der mærkes betydelig Pirrelighed, Hjertebanken og Blodstigen til Hovedet, Aconit, i nogle hurtig paa hinanden følgende Indgivelser. Strider Fødselen ikke frem paa Grund af for svage Beer, er Hovedmidlet Nux vomica eller Pulsatilla, ere Beerne stærke og smertelige, men paa Grund af for lange Mellemrum uden Følger, saa hjælper Belladonna. Dphøre Beerne formedelst almindelig Svækkelse eller formedelst Livmoderens Uvirksomhed, i hvilket Tilfælde sædvanlig ogsaa betydelige Blødninger maa befrygtes, maa Coffea eller Secale cornutum anvendes

i Indgiøter hver  $\frac{1}{2}$  eller  $\frac{1}{4}$  Time; indtræder der Besvimelser, Kysten, Bedøvelse eller Krampe medens Beerne udeblive, Opium. Derksom Blødningerne efter Fødselen vedblive paa Grund af Livmoderens Elapshed, idet den er for svag til atter at trække sig sammen, passer atter Pulsatilla, eller naar Blødningen bliver noget stærk og det truer med Forblødning, Sabina. Alle andre Uregelmæssigheder under Fødselsacten, især saadanne, som bero paa Barnets urigtige Stilling eller Bækkenets Bestaffenhed, kunne her ikke komme under Behandling, da der til samme udfordres mechanisk eller manuel Hjælp og selvfølgelig maa overlades til den Fødselshjælper, som hurtigst muligt maa bringes tilstede. Kun skal med Hensyn til Efterbyrden endnu bemærkes, at dens for hurtige og voldsomme Bortffjærelse under alle Omstændigheder er skadelig, og kun maa finde Sted af Fødselshjælperen, naar en betænelig Blødning finder Sted. De hyppigste Følger af denne desværre altfor almindelige Indgriben fra Jordemødrenes Side ere Efterveer, Moderfremfald eller Indeklemmelse, Betændelse etc.

Under Barselsengen, d. e. det Tidsrum, som begynder strax efter at Barnet er født og indtil Udfløddet fra Moderen er ophørt, maa der fremfor alt drages Omsorg for legemlig og aandelig Ro. Derfor maa Barselskenen forskaaes for alle svebdrivende og afførende Midler, og man maa ikke forsøge den Transpiration, som fremkommer af sig selv ved alt for stærk Tildækning og overdreven Theedrikken; Gudens forsøgede Virksomhed ved Udbunstning vil vedblive af sig selv, naar enhver For-

kjælelse undgaaes; Abningen udebliver ofte i 3—4 Dage, og kan da befordres ved et simpelt Olie-lysteer. Er Barselkvinden selv i Stand til at give sit Barn Die, hvilket en sund og fornuftig Moder aldrig bør undlade, saa maa hun allerebe den anden Dag faae nærende, men let fordøielig Føde; finder dette ikke Sted, maa hun idetmindste i 4 Dage ikke nyde andet end saakaldet Sygemad (Vandsuppe og Hvedebrød) og i den Tid maa hun ikke nyde Mælk og Æl.

Ere, ifølge af en besværlig Fødsel, eller ved en ubehændig Behandling af Jordmoderen eller Fødselshjælperen, i Fødselsdelene stærkt udviede eller trykkede, vadskes de, hensigtsmæssigst, nogle Gange om Dagen med fortyndet Arnica-tinctur (5—6 Dele Vand til 1 Deel Tinctur). Rifter og betydeligere Saar, som let give Anledning til langvarige Forholdninger, maa som oftest overlades til Lægens Behandling.

Optræder der Efterveer, saa er ligeledes Arnica, anvendt indvendig, Hovedmidlet, især efter besværlige og kunstige Forløsninger, voldsom Bortfjernelse af Efterbyrden, eller efter langvarige, besværlige Fødsler, med rivende, lammende Smærter fra Krybset eller Lysterne langs Laarenes indvendige Side indtil ned i Lærne, med vedvarende Uro i Blodaarerne og en Fornemmelse, som om Rysdet blev løst fra Knofterne. Vise Efterveerne sig efter lette og hurtige Fødsler og ved Livmoderens langsomme Sammentrækning, passe Pulsatilla og Secale cornutum.

En anden Besværlighed, hvorover der hyppigt klages, er den saakaldte Mælkefeber. Det er



kun sjældent Tilfældet, at Dannelse af Mælken i Virkeligheden er forbunden med betydelige Symptomer, nemlig Kuldegysninger, Hæde og Fieber, og da vil Belladonna i nogle Indgivter meget hurtigt hæve alle Besværligheder. Langt oftere er den saakaldte Mælkfeber en Slags Saarfeber eller en Følge af de overstaaede Smertter, Uengstelser, eller Saar, og Aconit med derpaa følgende Arnica ere da de virksomste Lægemidler. Løser Mælken med at indfinde sig, eller affondres den kun i ringe Mængde, uden at den almindelige Legemssvækkelse, Feil i Brysternes eller Borternes Dannelse eller beslige er Skyld deri, saa bør man, foruden ved rigelig og nærende Føde, understøtte Mælkens Dannelse ved nogle Indgivter *Agnus castus* eller *Pulsatilla*. Træder Mælken pludselig tilbage efterat have flydt rigeligt, passer ligeledes *Pulsatilla* bedst, skeer det derimod som Følge af en Sindsbevægelse, *Bryonia*. Imod Mælkens Udflyden udenfor den Tid, hvor der gives Die, hvilket langt oftere er en Følge af Svækkelse i Mælkegangene og deres Udførselskanaler end af Overflood paa Mælk, passer *Calcarea* bedst. Opstaaer der Besværligheder i Brysterne i den Tid, da Barnet vænnes fra, nemlig stærk Svelst, Haardhed, Rødme og Smerte, ere *Bryonia* og *Belladonna* Hovedmidlerne derimod; herved er det ogsaa nødvendigt, at Patienten i flere Dage afholder sig fra al nærende Føde, saavelsom en hensigtsmæssig Tilbækning og Opbinden af Brysterne i Bærk og Bomuld maa tilraades. Derimod er denyndede Brug af afførende Midler aldeles overflødig og ofte endogsaa skadelig. Angaaende Hudløs hed paa Borterne og Betændelse i Brysterne er der allerede sagt

det Fornødne under Betændelse af Brystthjertlerne. Er selve Mælken daarlig, for tynd eller løber den for hurtig sammen, saa kan man forsøge at raade Bod herpaa ved nogle Indgiuter Borax, dersom ikke dybere liggende Aarsager i Moderens Organisme overhovedet gjør det nødvendigt og tilraadeligt, at Moderen fremdeles ophører med at give Bryst.

Ikke sjældent indtræder under Barselsengen, isølge af en nervøs Tilstand, Søvnløshed eller ibetmindste en meget urolig Søvn, som forstyrres af skrækindjagende og ængstende Drømme; i første Tilfælde bringer Coffea, isidste Belladonna Lindring og Hjælp. Tiltager denne Ophidselse, saaledes at den vedblivende er tilstede og navnlig er forbunden med Tilbøielighed til Graab, Fortvivelse og Dødstanker, saa er Platina og Sepia af god Virkning. Viser der sig en uforholdsmæssig Grad af Nervøsitet og Svækkelse, som trækker længere ud end 4de Dagen efter Fødselen, eller som maaskee først indtræder senere, saa passer Calcareo og China. Opstaaer der maaskee endogsaa Krampe eller Convulsioner, saa maa en Læge kaldes hurtigst muligt, og indtil hans Ankomst gives Belladonna.

Imod hvid Svulst af Laaret, en eienommeligg, yderst smertefuld, hvidglimsende eller rødstrøbet elastisk Ophoven af et af Laarene, der som oftest foranlediges af en Blodaare- og Lymfekarbetændelse, sjælden af en Cellevævs-Betændelse, ere Belladonna og Arsen Hovedmidlerne. Iøvrigt er denne Lidelse ofte paa Grund af en samtidig Optraeden af en Betændelse i Livmoderen og Barselsfeber, eller paa Grund af en efterfølgende Forholdning i Cellevævet paa Laaret saa betydelig og livsfarlig, at dens Behandling neppe tør overlades Lægmanden.

Forstoppelse, som undertiben finder Sted efter den første Stolutømmelse (paa den tredje eller fjerde Dag) hæves bedst med *Nux vomica* eller *Bryonia*, og Tilbøielighed til tyndt Liv, saavel som *Diarrhoe* med *Acidum phosphoricum*.

En meget hyppig og farlig Sygdom, af hvilken mange Barselvinder døe, er endelig Barsel- eller Puerperalfeberen. Den optræder sjældent før den tredje eller efter den tiende Dag efter Fødselen og foranlediges ofte af Forkjølelse, Undertrykkelse af Mælkeaffondringen eller Barselrenselsen, af Mavefordærvelse og Sindsbewægelse, men optræder ogsaa uden nogensomhelst tænelig ydre Foranledning af indvendig sygelig Tilstand i Blodet. De første Symptomer ere Fiebersymptomer, Smerte og Æmfindtlighed i Underlivet med Tilbøielighed til *Diarrhoe* og Forstyrrelse i eller fuldstændig Ophør af Barselfloppet (*Lochierne*) og Mælkeaffondringen. Saavel formedelst den store Fare, der er forbunden med samme, som ogsaa paa Grund af dens mange Symptomer egner den sig ikke til Behandling af Lægmand; desuagtet gives der dog to Midler, ved hvis Anvendelse i rette Tid det ogsaa undertiben kan lykkes Lægmanden ganske at forhindre dens truende Udbrud, eller ialtfald at affjære dens fuldstændige Udvikling. Disse ere *Aconit* og *Belladonna*. *Aconit* anvendes strax, saasnart der viser sig Kuldegysen eller stærkt Kulde med efterfølgende Hede, Tunghed i Hovedet, Æmfindtlighed i Underlivet, Tørst og Tørhed i den hidtil fvedende Hud; bliver Smerten i Underlivet stærkere og indskrænker den sig til et bestemt Sted, taales der ikke den mindste Berøring, ophører *Lochierne* eller Mælken at flyde, bliver Fieberheden og

Tungheden i Hovedet altid værre, saa maa der efter nogle Doser Aconit gives Belladonna. Begge Midler maa imidlertid gives i hyppige og stærke Indgioter, hveranden eller tredie Time i 2den eller 3die Fortynding. Paa denne Maade lykkes det ikke sjældent at kvæle Sygdommen i dens Opstaaen eller ialtfald at helbrede den i dens første Stadium. Er det heftigste Stadium af Sygdommen forbi, saa er som oftest Pulsatilla bedst skiftet til atter at frembringe de undertrykte Løchier.

Imod Haaraffald efter Barselsengen ere Calcarea og China de virksomste Midler, sidstnævnte kan ogsaa anvendes ubvændig i Form af Pomade \*).

### 15. Forgiftninger.

Uagtet der netop til Behandlingen af en Forgiftning fordetmeste høre ikke alene lægevidenskabelige, men ogsaa omfattende kemiske og botaniske Kundskaber, saaledes som de vel neppe kunne antages at være tilstede hos en Ikke-Læge, saa skal her dog gives nogle Anvisninger og bestemte Regler for den første Hjælp, da Forgiftninger i høiere Grad end i alle andre Sygdomme, udkræve hurtig Hjælp, og man meget ofte ved den uvirksomme Benteen paa Lægen spilder den Tid, i hvilken Redning endnu havde været mulig.

Den første og nødvendigste Opgave ved kun nogenlunde betydelige Forgiftninger, maa gaa ud paa, saa hurtigt som muligt at skaffe Giften

\*) Arnica-Saarolie er ogsaa et godt Middel.

ud af Legemet, og naar Giften, som det for det meste er Tilfældet, er kommen i Maven, skeer dette ved at fremkalde en stærk og gjentagen Opkastning. Det bevirkes bedst ved lunkent Vand, som man lader drikke i store Quantiteter; fremkommer der ikke Opkastninger herved, saa kommer man noget Sæbe eller Smør i Vandet, eller man tilbrer Ganen med en Pennefjer og lader da ved at stifte Fingeren i Halsen Opkastningen gjentage sig flere Gange. Herved opnaaes ikke alene Hovedhensigten, at bortfjerne Giften, men Mavens Indhold bliver tillige ved den store Mængde Vand stærkt fortyndet, hvad der maa være af Bigtighed, ialtfald ved skarpe, ætsende Stoffer. Optræder, som det skeer meget hyppigt, Opkastning og Diarrhoe af sig selv, som Forgiftningssymptomerne, saa maa man, ialtfald i Begyndelsen, paa ingen Maade standse disse Udtømmelser, snarere fremme dem. Er Giften, som har forarsaget Sygdommen, ikke bekjendt, og lader samme sig ikke med nogen Sikkerhed bedømme af de tilstedeværende Omstændigheder, saa er rigtignok Lægmand ikke istand til at foretage videre, ialtfald tør han paa ingen Maade paa Lykke og Fromme gjøre nogen Brug af de senere nævnte kemiske Modgifter, fordi deres urigtige Anvendelse let kan forarsage yderligere Skade; han maa lade sig nøie med efter rigelig stedsunden Opkastning at lade Patienten drikke meget Eggehvidevand eller Mælk, og søge at lindre Besværlighederne ved varme Omslag paa Underlivet, naar der følger stærke Koliksmerter, eller ved kolde Omslag paa Hovedet, hvis der viser sig Hovedsmerter eller Bedøvelse. Men tillige maa der sørges for, at en Portion af det Opkastede, saavidt muligt af det første, bliver

gjemt, for at den hidkaldte Læge eller Apotheker kan søge at opbage, hvilken Gift der maatte være tilstede.

Er derimod det Giftstof, som har foranlediget Forgiftningen, bekendt, saa anvender man saa hurtigt som muligt den passende Modgift, da det her ikke dreier sig om en homøopathisk Helbredelse, men kun om en reen kemisk Neutraliseren, i større og gjentagne Doser. De virksomste Modgifter ere følgende:

Mod Allun: Sæbevand.

Mod Alkalier (Potaske, Soda, Ammoniak, Kalk, Eddike eller fortyndet Citronsaft.

Mod Alkohol (Viinaand, Spiritus): flimebe Drikke og fortyndet Ammoniakvand (8 Draaber i et Glas Sukkervand).

Mod Antimonium (Brækviinsteen): Aftog af Galæbler (Garvesyre).

Mod Arsenik: Jernoxydhydrat (Jernrust) eller Magnesia.

Mod kulsur Baryt: Glaubersalt.

Mod Belladonna (Galnebær): Kaffe, kolde Dvergybninger.

Mod Bulmeurt (Hyoscyamus): Kaffe, kolde Dvergybninger.

Mod Syresalt (ogsaa sur Kali): Magnesia eller Kridt.

Mod Blaasyre (bitter Mandelolie): Ammoniakvand, senere Kaffe.

Mod Bly: Glaubersalt.

Mod Bræknød (Nux vomica, Strychnin): Mælk, Galæbleaftog, Garvesyre eller Beenful.

- Mod Fiskegift (Muslinger, Reier, Krebs osv.): Træfulpulver, senere Kaffe.
- Mod Helvedsteen (salpetersur Sølvite): Kog-salt.
- Mod Jod: Stivelse, Hvedemeelsklister.
- Mod Kampher: Kaffe, kolde Overgydninger.
- Mod Kobber (Spanstgrønt): Eggehvide og Sukkervand, gult Blodbludsalt.
- Mod Opium (Laudanum, Balmuefrø): Kaffe og Eddike, kolde Overgydninger.
- Mod Phosphor (Rottgift): flimebe Drikke (ikke Olie), Magnesia.
- Mod Svampe: Træful, fortyndet Ammoniakvand.
- Mod Dvissølv (Sublimat): Eggehvide og Sukkervand.
- Mod Svovlsyre (Vitriololie): Magnesia, Kridtpulver, Soda, stærkt flimebe Drikke.
- Mod spanske Fluor (Cantharider): Kampher, flimebe Drikke.
- Mod Pigæble (Stramonium): Kaffe, Eddike, kolde Overgydninger.
- Mod Pølsegift (Fedt- og Østegift): Eddike, Citronsaft, Alkalier.
- Mod Tin: Eggehvide- og Sukkervand, Mælk.

Naar nu Giften paa denne Maade saavidt muligt er skaffet ud af Legemet og den tilbageblevne Rest ved Hjælp af de nævnte Modgifter (Antidota) er bleven neutraliseret, bliver der dog altid, og selv i det heldige Tilfælde, efter at Livsfaren aldeles er hævet, Besværligheder af større

eller mindre Betydning tilbage, fordi en Deel af Gifstoffet er opsuget inden Brugen af Brækmidler eller Nødmidler har kunnet finde Sted, og saaledes er optaget i Legemet, hvorved det har havt Tid til at yttre sine specifikke Virkninger paa Organismen. Til at læge disse dynamiske, ikke chemiske Virkninger, og at forhindre deres chroniske og vedvarende Følger, egne de homøopathiske Lægemidler sig fremfor Alt, fordi deres nøagtige og specielle Symptomkjendskab gjør det meget let at vælge det passende Lægemiddel. Uagtet det nu paa Grund af den store Mængde af giftige Substantier og Mangfoldigheden af de ved disse opstaaende Sygdomssymptomer, her ikke er muligt, at opgive det homøopathiske Lægemiddel for ethvert enkelt Tilfælde, saa lader der sig dog opstille flere almindelige Bestemmelser og Anviisninger, som ere tilstrækkelige til i nogle af de sædvanligste Følger at helbrede og som i andre kunne tjene til et sikkert Holdepunkt.

De Besværligheder, der hovedsagelig blive tilbage i Mave og Tarmkanalen, saavel som i Fordøjelsen, fordre som oftest Arsen og Ipecacuanha, og navnlig det sidste ved vedblivende Lidelser, og fra Tid til anden Optraeden af Ildebefindende, Opstød, Opkastning, Appetitløshed og Tryk i Hjertekulen, Arsen ved brændende og skjærende Kolikmerter, Mathed, svækkende Diarrhoer, Tørst, Halsbrynde, Følelse af Hebe i Svælget, Mave og Underlivet. Viser der sig især Oppustethed og Ømhed i Mave og Leveregnen, passer Belladonna; indfinder der sig Diarrhoe, især efter kolde Drikke og er den forbunden med Ængstelighed, Ildebefindende, kold Sved og Ansigts-



bleghed, Veratrum. Bliver der, efterat de øvrige Besværligheder ere hævede, endnu Appetitløshed, ilde Mundsmaag, Modbydelighed for de fleste Spiser, især for Fædt og Sødte tilbage, hjælper Pulsatilla.

Indskrænke Følgerne sig især til Hovedet, viser der sig Hovedpine, Svimmelhed, Drefusen, Driensvagthed, Glimren for Øinene, Ømsindtlighed for Støi, maa der bruges Belladonna, forudsat, at ikke selve Forgiftningen er forarsaget deraf; i saa Tilfælde vil Hyoscyamus være passende. Imod Følgerne af Opium hjælper bedst Ipecacuanha, af Stramonium: Nux vomica, af Nux vomica: Coccus. Bliver der en stor Virrelighed tilbage i Nervesystemet, Søvnløshed, Hjertebanken, Ømsindtlighed, Frygtfomhed, saa passe Aconit, Coffea og Nux vomica bedst.

Imod Følgerne af Metalforgiftninger ere som oftest Sulphur og Hepar sulph. Hovedmidlerne, kun ved Blyforgiftninger maa Opium og Nux vomica foretrækkes; imod alkaliske Gifte viser Carbo veget. sig virksomt og imod blaaafsyreholdige: Camphora.

Fremkommer der ifølge skarpe, ætsende Gifte i Munden og Svælget aabne, smertende Steder og Saar paa Slimhinderne, saa passe Hepar sulph. og Mercur fortrinligt; imod de øvrige Følger af Forgiftninger med Svovlsyre hjælper derimod Pulsatilla.

Imod Chroniske Sygdomssymptomer af Arsenic passer Ipecacuanha eller Ferrum bedst; af Jod: Belladonna og Arsen, af Phosphor: Nux vom., af Mercur: Hepar sulph. og

Jod, af Alcohol: Nux vom., af Kampher: Opium.

Ved Forgiftninger med skadelige Luft- og Gasarter, saasom Kulbamp, Kulsyre, Kvælstof, Chloroformdunster etc., maa den Paagjældende fremfor Alt bringes i reen, frisk Luft, derefter maa Ansigtet oversprøites med koldt Vand eller Eddike, Chlorkalk holdes for Næsen, og hele Legemet gnides stærkt med Klæder og Børster. Mærkes der slet ingen Aandedrætsbevægelser, skal man gennem Munden blæse Luft i Lungerne, og derved søge at fremkalde et kunstigt Aandedræt, idet man afvejlende sammentrykker og hæver Brystkassen. Disse Oplivelsesforsøg maa ofte fortsættes i længere Tid. Imod de Besværigheder, som blive tilbage hjælper Cofea bedst, og senere Opium eller Belladonna.

Ved Saar af giftige Insekter, Hugorme, syge og gale Hunde, maa man søge øieblikkelig at bortfjerne Giften og forhindre dens Opsugning. Dette skeer ved øieblikkelig Udvasning af Saaret med Salmiakspiritus, eller ved at ætse det med Helvedssteen eller kaustisk Kali; skulde disse Substantier ikke være ved Haanden, ved tør glødende Hebe i Afstand. I dette Viemed holder man et glødende Jern eller et glødende Kul saa nær som muligt til Saaret, uden dog at forbrænde Huden eller frembringe Brandstørpe i Saaret; for at skaane den omliggende Hud, kan man bestrøge den med Olie eller Fedt. Dog maa denne Fremgangsmaade fortsættes uafbrudt og energisk, i omtrent en Time. Tillige maa man gjentagende trykke Saaret ud, og omhyggelig afstørre alt hvad der maatte flyde ud. Dog er den heldige Følge af denne Fremgangs-

maade altid for Størstedelen afhængig af, at den saa hurtig som mulig bliver bragt i Anvendelse.

Ved Stik af Bier, Hvepser og andre mindre giftige Dyr ere hyppige Badninger med Eddike, Brændeviin eller Arnica-Tinctur tilstræffelige.

Iøvrigt er det uundgaaeligt nødvendigt, at der ved Bid af en gal eller kun mistænkelig Hund saa hurtigt som muligt kommer en Læge tilstede, da den videre Behandling, navnlig den indvortes, kun kan foretages af denne. Imod Følgerne af saadanne Saar, som foranlediges af mindre giftige Dyr, navnlig ogsaa Stik af Fluer der have stukket Kreaturer med Miltbrand, kan ogsaa Lægmand med nogen Sikkerhed anvende Arsen og Apis. Ligeledes ere begge disse Medicamenter de bedste Lægemidler mod Saar, som ere opstaaede af forraadnende dyriske Stoffer, eller af Materie af Bylder hos syge Mennesker eller Dyr, de saakaldte materiehølbige, „ondartede“ eller „giftige Bylder“.

---

## Tillæg.

### Børnesygdomme.

De Sygdomme, som hjemløse Nyfødte, Pattebørn og større Børn, ere for Størstedelen saadanne, som sjældent eller aldrig forekomme hos Borne, altsaa eiendommelige for Barnealderen, men for en Deel væsentlig forandrede og modificerede ved visse i denne Tidssalder fremherskende Betingelser. Af denne Grund maa det synes hensigtsmæssigt, at sammenfatte de væsentligste og hyppigste af disse Sygdomme og at behandle samme adskilte fra de Borne Sygdomme.

Det ligger nu i den Barnealderen egne Hjælpe-løshed og i dens store Afhængighed og Modtagelighed for Indtryk af ydre Indflydelser, at Forældre og Barnepigens Maade at behandle, pleie og opfostre Børn paa kan bidrage meget til at undgaa eller formilde disse Sygdomme, og hos Børn er det derfor langt oftere end hos Borne muligt, at virke mere ved at undgaa skadelige Indflydelser end ved Anvendelse af Lægemidler. Men desværre er det ligesaa sikkert, at der netop i saa Henseende er udbredt en stor Mængde feilagtige Ansættelser og

Misbrug, og at der selv hos fornuftige og dannede Mennesker herse Anskuelse og Vaner, som høiligen trænge til Belæring og Oplysning. Jeg skal ikke her forsøge paa at skrive en udførlig Diætetik for Børn, men maa nøies med, indtrængende at hen-vise til de fortrinlige Bøger af Jørg, Ammon, Mauthner, Bednar, Hartmann m. fl. Kun nød-sages jeg til at forudstikke nogle almindelige Be-mærkninger og Vink, som ikke saa meget høre til Diætetiken, men bestomere egne sig til at tjene som almindelige Regler for Undersøgelsen og den rigtige Opfattelse og Erkjendelse af visse Tilstande, og derved overhovedet at muliggjøre Bedømmelsen af de sygelige Symptomer. Det maa man ikke glemme, at Sygdomme hos Børn meget ofte yttre sig ganske anderledes end hos Vorne, og at mange Symptomer hos hine høre til de abnorme, som hos disse ere normale, og omvendt. Først og fremmest maa det bemærkes, at man lettere kan undersøge syge Børn, naar de sove og ere i Ro, end naar de ere vaagne; thi den uundgaaelige Agitation og det samme ledsagende Skrig gjør ligesom visse Undersøgelser umulige. Hertil høre fremfor Alt Undersøgelser af Ansigtstrækkene, Kroppens og Lem-mernes Stillinger og uvilkaarlige Bevægelser, Pulsen, Andedrættet og Brystundersøgelsen. Disse maa altjaa foretages naar Barnet sover.

Angaaende Udtrykket i Ansigtstrækkene, maa det fremhæves, at medens sunde Pætte-børn have et fuldkomment udtrykkløst Physiognomi, faae syge Børn et bestemt Udtryk, som er af-hængigt af Svundet af Fædet i Gælleæret under Huden, tilbeels ogsaa af eiendommelige Sammentrækninger af de ellers slappe Ansigts-

mustler. Ved Diarrhoer, navnlig ved choleraagtige, forandres Ansigtstrækkene hos et ellers velnæret, buttet Barn sig paafaldende hurtigt; Øienene synke tilbage, Næsen bliver spids og Læberne blive skarprandede. Ved chroniske Diarrhoer (Atrophi) bliver Ansigtet endnu skarpere og tilsyneladende mindre og faaer et ligefrem oldingeagtigt Udseende. Desuden gives der endnu et eneste characteristisk Kjendetegn paa en bestemt Sygdom i et Pattebarns Ansigt, nemlig en Udspiling af Næseborene ved ethvert Aandedræt, et Tegn, der med Bestemthed angiver en betændelsesagtig Affection i Lungerne.

Med Hensyn til Barnets Stilling og Bevægelser maa der bemærkes, at det nyfødte Barn pleier at indtage omtrent den samme Stilling som det havde i Livmoderen: Ryggen er krummet udad, Hovedet sænker sig ned paa Brystet, og Lemmerne ere trukne ind mod Kroppen. Ligger Barnet roligt, nyder det en vedholdende og fast Søvn, bevæger det sig i vaagen Tilstand med tilbørlig Kraft og Lyft, saa kan man være vis paa, at det har det godt. Heelt forskjellig herfra er en Tilstand af Kraftløshed og Bedøvelse. I hiin ophører Barnets Bevægelighed, det henligger sløvt; ved Bedøvelse derimod ere Øinene stirrende og følge ikke mere Moderens Øine, saaledes som allerede ganske smaa, kun fire Uger gamle, raske Pattebørn pleie at gjøre, Øienlaagene bedække Halvdelen af Hornhinden, lukke sig ei heller fuldstændigt i Søvn. Raske Børnene sig uophørlig frem og tilbage, og finde de ikke No i nogen Stilling, saa tyder dette bestandig paa, at de have Feber. Ved Udsvædning i Hjernen bølge de hyppigt Hovedet tilbage, ved Hjerneatrophi, som Følge af en almindelig Atrophi (Tæring, Hensygnen) gnide de ved-

varende Baghovedet mod Buden eller bore det ind i den, og rive sig med Hænderne i Haaret og Ørene. Sunde Børn falde i Søvn naar de ere trætte, og sove rolig i enhver Stilling, men ved Lungebetændelser vælge Børnene helst at ligge paa Ryggen eller den syge Side, og vende sig, naar man lægger dem paa den sunde Side, strax om paa den anden. Ved scrophuløse Dienbetændelser lægge Børnene sig paa Anfigtet. Naar Børnene have faaet Die, maa man ikke lægge dem paa venstre Side, da de i saa Fald let blive urolige og faa Opkastning paa Grund af Leverens Tryk paa den fulde Mave. Ikke sjældent anvise Børnene directe hvor Smerten viser sig. I Tandperioden gribe de til Munden, ved Band i Hovedet og Tryk paa Hjernen trække de i Haarene, ved Strubehoste trykke og gnide de sig paa Halsen, ved Kneb paa Underlivet, ved Blæresmerter i Blære-egnen; ved Ørm bore de sig i Næsen eller i Endetarmen; udtærede Børn bise Tommelfingeren indad og knytte Haanden; stødvis Bøining og Udstrækning af Fødderne er det sædvanlige Tegn paa Tilstedeværelse af Vinde og ophøre strax ved disses Afgang.

I de fleste Tilfælde bliver altid indtil det 2det og 3die Aarsaar Barnets Skrig det første og eneste indirecte Tegn paa en sygelig Forstyrrelse; det erstatter saaledes den senere Aarsaalers tydeligere og mere talende Klagen og Jamren, og opfordrer derfor indtrængende til en omhyggelig Jagtagelse og Undersøgelse. Selve Maaden at skrig paa er ikke sjældent hos Rattedbørn characteristisk og betegnende for den Sygdom, som forarsager den. Saaledes tyder et saakaldet kvalt Skrig, ved hvilket ingen anden Lyd høres end en mere

eller mindre skarp Tone, som undertiden blander sig deri, paa Betændelseslidelser i Lungen og i Luftrørgrenene (Bronchierne), et dumpt, hæst Skrig paa en katarrhalst Affection i Luftveiene, et ufuldkomment Skrig, ved hvilket Stemmen kun høres ved Indaanding, paa Sygdom i Strubehovedet og Luftrøret; et stærkt, fuldttonende Skrig paa Smertes i Underlivet. Tillige maa der tages Hensyn til, om dette Skrig er vedvarende eller afbrudt, frivilligt eller fremkaldt ved Bevægelse eller Undersøgelsen. Et Barn, som f. Ex. føler Smerte i Øret eller Munden, kan skrig i Timen, et Barn med Smerte indvendig i Brystet udstøder kun et kort, tillige trykket Angstskrig; ved Hovedpine ligner Skriget mere et Hviin, et kort, skarpt, pludseligt Skrig; ved Smerte i Underlivet er Skriget for det meste høit og vedholdende med hyppige Pauser, i hvilke Munden luffes høit op, ligesom for at kunne frembringe den stærkest lydende Tone; et Barn, som føler Smerte i et af Lemmerne, udstøder kun af og til et Skrig, naar dette Lem tilfældigviis eller forfættigt bevæges.

Herved maa endnu bemærkes, at meget smaa Børn ved at skrig eller græde aldrig eller dog kun yderst sjældent fælde Taarer, thi Taareaffonbringen begynder først i den 3die og 4de Maaned og ophører ofte ved svære Sygdomme. Ligeledes indtræder Spytaffonbringen først i den 2den eller 3die Maaned; Spytning og Saglen iagttages først henimod den 5te eller 6te Maaned ved Tandbrudsperioden og ophører for det meste med det 1ste Aar. Den forøgede Spytaffonbring hidrører fra den Purring som foranlediges ved Patningen. Ogsaa Svøb forekommer kun undtagelses-



viis hos Nyfødte og Pattebørn; i de senere Maaneder svebe Børnene især paa Hovedet medens de sove.

Vigtigere for Jagttagelsen ere Aabning og Vandladning. Pattebørns Tarmudtømmelser skulle danne en eensartet, guulagtig Masse (undtagen i de første Dage, da der afgaaer en sortagtig Masse), som ligner lysegul Osteløbe, og som daglig udtømmes 2 til 4 Gange. Udsættes det for Luftens Paavirkning, saa lugter det slemt og bliver ikke sjældent grønagtigt. Kort efter Udtømmelsen skal det hverken lugte surt eller være grønagtigt; hos ældre Børn, som ikke alene saa Mælk, men ogsaa andre, især faste Næringsmidler, bliver Stolgangen brunagtig og fastere, ligner Børnes Udtømmelser, om end ikke ganske saa fast og formet, ogsaa indskrænke Udtømmelserne sig til 1 à 2 Gange daglig. Urinaffsondringen hos Pattebørn er forholdsvis meget betydelig, paa Grund af, at de kun tage flydende Ting til sig; i de første Maaneder skal et Barn daglig gjøre Bleerne vaade 12 til 24 Gange. Urinen faaer først i den 5te Maaned en specifikt, urinagtigt Lugt, indtil den Tid er den uden Lugt og næsten uden Farve.

Af stor Vigtighed er hos Børn Bedømmelsen af, hvorvidt de have Fieber eller ikke; de objective Fiebersymptomer bestaa rigtignok, saavel som hos Børne, i en forhøiet Hudvarme, i Pulsens Hæftighed og i Handedrættet, dog yttre disse sig i mange Retninger anderledes, især hos Pattebørn, og optræde modificerede.

Hos Pattebørn indtræder den forhøjede Varme

i Legemet uden foregaaende Pulse; istedetfor samme bemærkes der undertiden Blegghed i Ansigtet, farveløse Læber, blaa Farve paa disse og under Neglene og en Slappelse af Musklerne. Den normale Varme i den barnlige Alder udgjør imellem den 1ste og 7de Dag 30 Grader (Celsius), fra den 4de Maaned indtil det 4de Aar 37 Grader. Man undersøger bedst Temperaturen med et Thermometer i Armhulningen. Iøvrigt udvillig Nyfødt mindre Varme end fornødent, hvorfor de maa opvarmes paa kunstig Maade. Den forhøjede Varme iagttages tydeligt paa Kroppen, sjældent paa Lemmerne og Hovedet; den ledes yderst sjældent af Sved. I Nærheden af den levende Deel er Varmen ofte større end paa fjernere Steder. Det er ogsaa sjældent at Varmen er vedvarende, men den taber sig eller forsvinder aldeles til forskjellige Tider paa Dagen og med større eller mindre Mellemrum.

Pulsen, som kun hos sovende Børn kan undersøges med nogenlunde Sikkerhed, er paa Grund af forskjellige Omstændigheder langt fra et saa vigtigt og sikkert Tegn til Erkjendelsen af Feber hos Børn som hos Vorne. Fremfor alt maa derved tages Hensyn til, at netop i Forhold til Barnets mindre eller mere fremrykkede Alder hersker der allerede stor Forskel i Circulationens normale Tilstand. Til Bedømmelsen af denne Omstændighed kan følgende Angivelse af Pulsflagenes Antal i sund Tilstand tjene:

Saa Minutter efter Fødselen er Normen

140—200 Slag i Minutet.

Fra den 8de Dag indtil den 2den Maaned

96—130 Slag i Minutet.

Fra den 2den Maaned indtil den 21de Maaned

96—120 Slag i Minutet.

Fra det 2det Aar indtil det 5te Aar	92—108 Slag i Minntet.
Fra det 5te Aar indtil det 8de Aar	84—100 Slag i Minntet.
Fra det 8de Aar indtil det 12te Aar	76—96 Slag i Minntet.

Tillige maa man endnu tage Hensyn til at Pulsflaget hos smaa Børn har en langt ringere Betydning end hos Vorne, thi det bliver fremskyndet ved den ubetydeligste Foranledning, saaledes ved forøget Varme, ved Fordøielsesprocessen (hvorfor ogsaa Pulsen er hurtigere efter Patningen, end forinden) ved Bevægelse, Utaalmødighed, Frygt, Strigen, Hoste. Forøgelsen kan hos Pattebørn stige fra 15—30 Pulsflage i Minntet. Genimod Aften bliver Pulsen i sund Tilstand langsommere, og vender om Morgenen tilbage til dens normale Hurtighed; under Sønnen taber Pulsen 15—20 Slag i Minntet.

I Almindelighed kan man antage, at naar Pulsen hos et sovende Barn slaaer 130—140 Slag, har det sikkert Feber.

Undertiden er Pulsen hos Børn, som forøvrigt ere aldeles raske, uregelmæssig i Styrke og Hastighed; denne Abnormitet er ikke altid afhængig af nogen egentlig Sygdom; derimod tyder en absolut urhythmisk og uregelmæssig Puls paa Hjertefeil eller Hjernesygdomme.

Samtidig med Pulsen er i feberagtig Tilstand ogsaa for det meste Hastigheden af Respirationen (Aandebrettet) forøget; denne forholdesig hos Pattebørn til Pulsflagene som 1 til 4, i det andet Leveaar som 1 til 5 à 6. I det første Halvaar variere Respirationernes Antal i sund Tilstand fra 20—40 i Minntet, fra den 7de Maaned til det 2det Aar fra 20

til 36, fra det 2det til det 5te Aar fra 20 til 32, fra det 6te til det 10de Aar fra 20 til 28, i de følgende Aar fra 12 til 28. De Aarsager, som i sund Tilstand udøve en forøgende Indflydelse paa Pulsen, udøve den samme, kun i ringere Grad, paa Respirationen. I øvrigt er Respirationens bevægelsen hos Nyfødte og Battedørn hyppig uregelmæssig, idet den snart er hurtigere, snart langsommere, og ofte skifter; kun i sovende Tilstand foregaaer samme aldeles regelmæssig, hvorfor en hver Undersøgelse af Respirationen maa skee under Søvn. Hyppigst forarsages en betydelig Forøgelse i Respirationen (indtil 50—80 i Minutet) af Lungesygdomme, medens i senere Aar (indtil det 2det Tandfrembrud) en urythmisk Respiration tyder paa Hjernesygdomme med betydeligt Tryk paa Hjernemassen.

I øvrigt er hos Børn under eet Aar Respirationen hovedsagelig abdominal, d. e. Bugmusklerne og Mellemgulvet ere meest virksomme ved samme, medens den øverste Deel af Brystkassen hæver og udvider sig mindre.

Den naturligste Stilling for Nyfødte er den bøjede. Efter  $1\frac{1}{2}$  à 2 Maanedes Forløb begynder Barnet efterhaanden at holde Hovedet opad og uvilkaarligt at dreie det, især efter Lyset. Først i den 7de eller 8de Maaned lærer Barnet at sidde og endnu senere i den 10de til 12te Maaned udvikle Underlemmerne sig kraftigt, saaledes at de lære at staa og at gaa.

Den bedste Mæring for Nyfødte er Moder-mælken, naar den indeholder de fornødne Egenstaber, affondres i tilstrækkelig Mængde, og naar Brystvorterne ikke ere misdannede. Derfor bør under

disse Betingelser enhver Moder, som er kraftig og fri for en bestemt Sygelighedsdisposition, selv opamme sit Barn.

Man skal i Almindelighed lægge den Nyfødt til Brystet, saasnart Moderen har nydt den første Søvner efter Fødselen. Om Dagen maa dog den Nyfødt ikke faa Die uden hver 2den Time og om Natten ikke uden hver 4de Time; med Alderen bør dog for et forsvrigt vel næret Barns Vedkommende Pauserne gøres længere, og navnlig maa de natlige Mellemrum udstrækkes til 6—7 Timer, thi Barnet drækker da mere paa engang og mættes for længere Tid. Efter hver Diegivning maa Barnets Mund og Borten afvaskes med Vand og tørres; en saakaldet Sut er naturlignvis aldeles utillabelig. Den Mælk som et Barn behøver i 24 Timer vil udgjøre lidt over 1 Pot.

Indtræder Menstruationen hos den, som giver Die, saa er dette endnu ingen Grund til at ophøre med Diegivning, thi det største Antal af Børn forstyrres derved aldeles ikke i deres Velbefindende. Kun naar heftige Kolikmerter eller stærke Diarrhoer skalde vise sig, bør man gøre Forandring. Ved Menstruationen aftager Mælken, men bliver tykkere, d. e. den formindstes i Vand- og Sufferindhold, men tiltager i faste Bestanddele. Derfor skal man under denne Periode sjældnere lægge Barnet til Brystet, men til Gjengjæld give det Suffervand. Ved indtrædende Svangerskab maa Diegivningen altid ophøre. Bliver en Diegivende syg, behøver man ikke øieblikkelig at vænne fra; man maa først afvente Sygdommens Natur og dens Indflydelse paa Mælken. Først naar Sygdommen viser sig at være alvorlig eller

langvarig, naar Mælken forandrer sig og der hos Barnet viser sig heftige gastriske Anfald, er en Forandring uundgaaelig, som i og for sig ikke gjør Skade.

En Diegivendes Næring bør være simpel, men rigelig, og bestaa af Rjød, Meelspiser og Grøntsager; stærkt krydrede og sure Spiser, oppustende Grøntsager og frist Bagværk maa undgaaes, til Drikke egner svagt, afgjæret Øl sig bedst, men aldrig Viin eller Spirituosa. Keenlighed og Bevægelse i frist Luft maa ikke forsvømmes.

Kan Moderen af en af de anførte Grunde ikke selv amme sit Barn, saa bør man, naar Omstændighederne paa nogen Maade tillade det, tage en Amme. En Amme skal være sund, i en Alder af 20—30 Aar, skal have godt udviklede, men ikke for fulde (de saakaldte Rjød-) Bryster, og være nedkommen omtrent paa samme Tid som Moderen; dog ere nogle Ugers Forskjel uvæsentlig, navnlig naar Ammens Barn er disse Uger ældre. Om Ammens Mælk har den fornødne Qvalitet og Qvantitet, seer man bedst af, om hendes eget, af hende opammede Barn er godt næret, kraftigt og sundt. Det er ikke altid saa let at bestemme, om Ammens Mælk i Qvantitet og Qvalitet er tilstrækkelig for det paagjældende Barn. Med Hensyn til den nydte Mælks Mængde er den afgaaende Urins Mængde, og med Hensyn til den nydte Mælks Næringsstof er Barnets Frem- og Tilbagegang i Vægt, den bedste Maalestof. Hertil skal bemærkes, at Jnderfiden af Laarene afgiver den bedste Maalestof for Bedømmelse af en mangelfuld Ernæring, ofte gjør en utilstrækkelig Ernæring i et Par Dage, eller et Ildebefindende, især en Diarrhoe, paa nogle saa

Timer, den hidtil faste og spændte Hud paa nævnte Steder, blød og tør, snart opstaa smaa Følde og efterhaanden danner der sig istedetfor de store Fedtpuder, folderige og rystende Sække, som imidlertid ved en bedre Næring, ligesaa hurtigt atter udfyldes og blive faste.

Ifsald hverken Moderen kan give Die eller nogen Amme kan faaes, maa der anvendes en kunstig Ernæring (saakaldet Opflastning). Uagtet Gselindemælk meest ligner Modermælken, vælger man dog sædvanlig Komælk, da denne er lettest at faae. En Sammenligning af Komælk og Kvindens Mælk viser imidlertid, at Komælken indeholder mere Ostestof (overhovedet faste Bestanddele) og mindre Sukker, hvorfor man maa sætte Vand og Sukker til Komælken. Man tager derfor Vand med Sukker (bedst med Melkesukker, da dette indeholder mindst Syre, 2 Lod paa  $\frac{1}{3}$  Pot), og blander dette forinden Brugen med kogt, ikke affkummet, smørholdig Komælk saaledes, at Blandingen indeholder 2 Dele Vand og 1 Deel Mælk. Mælken skal tages af en sund, godt fodret Ko, som, om muligt, ikke savner Bevægelse i fri Luft. Overalt, hvor det er vanskeligt eller umuligt at faae saa god Komælk frisk og regelmæssigt, bør man vælge condenseret Schweigermælk, som nu kan faaes i ethvert Apothek. Den Blanding, som gives, maa stedsse være varm, ikke heed, men endnu mindre kold. Bedst gives den i en saakaldt Pottesflaske, til omtrentlig Rettefnor med Hensyn til Portionernes Mængde og Antal, kan den Omstændighed tjene, at en Nyfødt's Mave kan optage næsten 2 Unzer Mælk, som er opspædt med Vand, uden derved at udvides i nogen høj Grad,

og at den behøver lidt over 2 Timer for at fordøje Potteslaffens Indhold. Et sundt Barn behøver i 24 Timer omtrent 2—3 Kander Mælk til sin Ernæring. Selv i de senere Uger behøver et Pottesbarn ikke noget større Kvantum, men Komælken maa da fortyndes mindre med Vand, saaledes at man tager lige Dele Komælk og Vand. Hvad enten Barnet opfydes med Kvinde- eller Komælk, saa er Mælken tilstrækkelig for samme, indtil de første Tænder vise sig, og det bør derfor forstaaes for enhver anden Næring. (Skulde virkelig det Tilfælde indtræde, at et Barn paa ingen Maade kan taale Mælk, saa maa der rigtignok gribes til en anden Methode, f. Ex. til Sulfervælling eller Maltertrakt, dog kan kun en Læge dømme herom). Fremkomsten af de to Fortænder forneden i Munden er et Tegn paa, at man, foruden Mælken, kan give Barnet endnu en anden, men flydende Næring, saasom Rjødsuppe med Tvebak, Franskbrød eller fine Gryn, engang i 24 Timer. Efter Fremkomsten af de 4 øverste Fortænder kan man give denne Portion 2 Gange daglig og efter Fremkomsten af de 2 nederste Fortænder ved Siderne og de 4 første Rindtænder kan Barnet allerede godt taale kogt Riis og Suppe med fiint hakket Rjød. Saasnart de 4 Hjørnetænder (Dientænder) blive synlige, kan man vænne Barnet til blødt Biltkjød, Steg og lettere Grøntsager, og Tilstedeværelsen af de 4 sidste Rindtænder tilstøder Barnet Nybelsen af den sædvanlige Næring for Borne, med Undtagelse af Surt, Skarpt, Viin, Kaffe og Thee. Men ogsaa for ældre Børn maa Maaltiderne stedsse ordnes efter en bestemt Regel. Børn over 2 Aar bør f. Ex. snart efter at være staaede op have Mælk og Hvede-



brød, omtrent Kl. 10 enten et blødkogt Æg eller Brød og Frugt, om Middagen Bouillon, Kjød og Grøntsager eller Compot, om Eftermiddagen omtrent Kl. 4 Hvedebrød og Frugt, om Aftenen Kl. 7 Mælk eller Suppe. Som Drikke for Tørst er Vand det bedste.

Tandprocessen indtager i Børnesygdomme en saa stor, rigtignok forstørstedeleu opdigtet eller ialtfald overdreven Rolle, at det synes fornødent, her at give nogle Anviisninger om dens normale Forløb.

Den første Tandperiode indbefatter Frembruddet af 20 saakaldte Mælketænder, nemlig i hver Kjæbe 4 Fortænder, 2 Hjørnetænder og 4 Kindtænder. Hos Nyfødte er Tandkjødet fast og danner en skarp Rand ovenover Kjæbebenet, undertiden med Ophøjninger og Fordybninger af en mere hvidagtig Farve. Efterhaanden bliver Tandkjødet blødere, bredere og taber sin skarpe Rand, indtil det ved de vokende Tandkroner bliver hævet iveauet, spændt og endelig gjenembrydes. De 20 Mælketænder bryde navnlig frem i følgende 5 Grupper, som ved forskellige længere Pauser ere adskilte fra hverandre.

- 1) Imellem den 4de og den 8de Maaned komme de 2 mellemste Fortænder forneden tilsyne, hvorefter der sædvanlig indtræder en Pause paa 3 til 9 Uger.
- 2) Imellem den 8de og 11te Maaned komme de 4 Fortænder foroven, først de mellemste, derefter de ved Siden af disse; herefter er en Pause af 6 til 12 Uger.
- 3) Imellem den 12te og 15de Maaned komme de

første 4 Rindtænder og de 2 Fortænder ved Siden forneden.

4) Imellem den 18de og 24de Maaned komme de 4 Hjørnetænder (Dientænder) foroven og forneden.

5) Imellem den 30te og 36te Maaned komme endelig de 4 andre Rindtænder foroven og forneden.

Naturligvis komme Mælkætænderne ikke altid frem i denne præcise Orden og rimelige Undtagelser fra denne Regel berettiger paa ingen Maade til at antage Tilstedeværelsen af en sygelig Tilstand.

Imod Slutningen af det 4de Aar eller først mellem det 5te og 6te Aar komme endnu 2 nye Rindtænder frem i hver Kjæbe, som allerede høre til de blivende; I det 7de Aar begynder Tandskiftet. De blivende Tænder komme i Reglen frem i følgende Orden.

Imellem det	5 og 6 Aar	3die Rindtand.
—	7 og 8	de mellemste Fortænder.
—	8 og 9	Fortænderne paa Siden.
—	9 og 10	forreste Rindtand.
—	10 og 11	Hjørnetænderne (Dientænder).
—	11 og 12	2den Rindtand.
—	12 og 13	4de Rindtand.
—	16 og 24	Visdomstænderne.

Først med disse 4 Visdomstænder, som imidlertid ogsaa undertiden udeblive, har Mennesket alle sine 32 Tænder.

Et altfor tidligt Frembrud af Tænderne forekommer saavel hos kraftige som hos svagelige Børn, og har ingenlunde noget overordentligt at betyde; et seent Frembrud tyder paa en langsom Udvikling eller Sygelighed i Ernæringen, det er imidlertid heller ikke altid et betænkeligt Tegn. Meget seent

Frembrud maa som oftest betragtes som Symptom paa Rachitis (engelsk Syge).

Angaaende Tandprocessen som Disposition og Aarsag til Sygdomstilfælde, saa er dens Indflydelse vistnok bleven betydelig overbreven. Utvivlsomme og directe Besværligheder af samme ere egentlig kun Ophoven, Rødme, Hebe og Smerter i Tandkjødet, og som Følge heraf Uro, Strigen, Besværligheder ved at die, forøget Spytaffondring. Dog lader det sig ingenlunde nægte, at der under Tandperioden, og ifølge dens directe Besværligheder kan optræde en almindelig forøget Pirrelighed og Tilbøjelighed til feberagtige, krampagtige og gastriske Symptomer, saavelsom Udslet. Om disse Tilfælde vil der senere særlig blive talt.

Med Hensyn til den normale Vægt i Barnealderen kan man omtrent opstille følgende Agivelser. Et nyfødt Barns Længde udgjør i Gjennemsnit omtrent 20 Tommer og dets Vægt 7—8 Pund. Den hurtigste Vægt finder Sted i dets første Levetid: Barnet vojer i Løbet af det første Aar næsten 7 Tommer. Fra dette Tidspunkt aftager dets Vægt i det samme Forhold, som Alderen tiltager, næsten til det 4de eller 5te Leveaar; i det andet Leveaar udgjør nemlig Vægten kun Halvdelen af det første Leveaars, og i det 3die Leveaar næsten kun Trebiesdelen. Fra det 4de eller 5te Aar indtil henimod det 16de Aar er Vægten regelmæssig og udgjør aarligt næsten 2 Tommer. Fra det 16de—17de Aar tiltager Legemets Længde omtrent  $1\frac{1}{2}$  Tomme i de følgende 2 Aar ifkun 1 Tomme. Imellem det 19de til det 25de Aar er Vægten fuldbendt Utilstrækkelig Næring og kroniske Sygdomme, især Hjertelsyge og engelsk Syge, forhindre Vægten

derimod befordres den stærkest under feberagtige Sygdomme, saasom Brystbetændelse, Mæslinger, Starlagensfeber osv. At Værten forarsager Ledbesmerter, Svækkelse i Benene etc., er feilagtigt; rigtignok blive Børn som vore for hurtigt, magre og muskelsvage, og behøve mere Ro og Søv, ligesom ogsaa Brystet ikke sjældent bliver smalt og langt. I saa Tilfælde maa især anbefales Rjødspiser, kolde Bæftninger, Bade og Gymnastik. Ved altfor langsom Væxt har man Grund til Mistanke om begyndende engelft Syge. Af Fontaneller har det nyfødte Barn 4 paa Hovedet, den mindste paa Baghovedet, 2 paa Siden og den største foran ovenover Panden. De skulde hverken være indfaldne eller hvælvede. Af disse luffer den forreste sig tilsidst, fuldstændigt først i den 15de Maaned.

Disse Angivelser og Belæringer ville være tilstrækkelige og i de fleste Tilfælde kunne sætte Mødrene eller Ammerne istand til at bedømme Børnens Sundhedstilstand med temmelig Sikkerhed samt til at rette mange vidtubbede Feiltagelser.

#### A. Sygdomstilfælde i den tidligste Livsperiode (hos Nyfødte).

Netop ved Behandlingen af Nyfødte har der indsnegget sig en stor Mængde af de affsneligste Vaner og Kvassalverier, og dog skulde Indgreb netop undgaaes mere i den spæde Alder end ellers, da de just da ved den tilstedeværende Modtagelighed og Omfindtlighed maa virke dobbelt skadeligt og vedblivende. Tillige lykkes det netop her, ved

passende homøopathiske Lægemidler hyppigt let at standse Besværligheder og Sygdomme i deres Begyndelse, og derved at forhindre betydeligere Onder, saa at det maa synes særdeles nødvendigt, at give en letfattelig Anvisning til homøopathisk Behandling af disse Tilfælde.

Nysødtes Skindød indtræder hyppigst som Følge af langvarige eller uregelmæssige Fødsler, undertiden ogsaa ved for tidlige Fødsler, stærke Blødninger under Fødselen eller ved at Navlesnoren er slynget om Halsen. De almindeligste Symptomer ere: høirødt eller blaaligt Ansigt, fremstaaende Vine, svag og ufølelig Puls, Mangel paa enhver Aandedrætsbevægelse; efter stærke Blødninger er ogsaa hele Legemet blegt, slapt, indfaldent, koldt, Læberne blaalige, Underkæben hængende, og hverken Puls eller Navlesnor banke. I Almindelighed maa man i alle Tilfælde forudsætte Skindød, ikke virkelig Død og derfor anstille Oplivningsforsøg, hvor der ikke sees sikre Tegn paa at Døden er indtraadt for længere Tid siden, saasom paa begyndt Forraadnelse eller livsfarlige Bestadigelser eller Lemlæstelser. Lykkes det ikke ved Indviklen i varme Klæder, ved Gnidning og Frottering at fremkalde Aandedrættet, som maa lettes ved forsigtigt at rense Munden fra Slim og Blod, saa maa Barnet, efterat Navlesnoren er blevet gennemstaaet, bringes i et varmt Bad, hvor man maa fortsætte Gnidningen og Børstningen, forsøge at indblæse Luft og mekanisk at udvide Brystkassen med Hænderne. Tillige maa man hælde nogle Draaber Vand, hvori Tartarus emeticus er opløst, i Munden. Viser der sig herefter Aandedrætsbevægelser, bør Gnidningen endnu fortsættes nogen Tid,

indtil Aandedrættet forstærkes, og Barnet begynder at strige. Vedbliver Ansigtet at være meget rødt eller blaaligt, giver man en Indgiwt Opium og et Klyster af lunkent Vand og Olie. Ofte er det nødvendigt, at fortsætte Oplivningsforsøgene i flere Timer.

Undertiden opstaaer i det opbundne Stykke af Navlesnoren, som forresten af sig selv maa stille sig fra Navlen ved Forholdning i Løbet af 3 à 4 Dage, en ualmindeelig Forholdning og Betændelse, som endogfaa kan udbrede sig til Navlen og Underlivshuden og som kan udarte til Rosen. I saa Fald pensler man det hudløse Sted flere Gange om Dagen med en svag Blanding af Arnica-tinctur, (5—8 Draaber paa en halv Overkop Vand) og sørger for en passende Forbinding med et meget blødt Mavebind. Overklippingen af Navlesnoren maa isørigt i Almindelighed aldrig finde Sted, forinden samme har ophørt at pulsere; kun naar den Rysøgte er meget rød og Ansigtet er meget spændt som ved et Slagflob, maa det stee strax. Denne Operation steeer hensigtsmæssigst derved, at man i en Afstand af 2 Fingersbred fra Navlen binder et bredt Baand om Navlesnoren, ikke altfor fast, og derpaa gennemstjærer den omtrent 2 Fingersbred fra Baandet med en noget stump Sax (da denne mere knuser end stjærer, og de overstaarne Rar snarest lukker sig naar de ere knuste); endnu sikkrere er det, at underbinde den anden Ende af Navlesnoren, som endnu staaer i Forbindelse med Moberen eller Moberlagen, især da der ved Tvillinger ikke altid findes 2 særskilte Moberlager, og det da altsaa kunde stee, at det andet Barn kunde forbløde sig inden Fødselen ved at Arterne stode

aabne. Efter Gjennemstjæringen og Barnets tilstrækkelige Renselse i Badet bliver det nedhængende Stykke af Navlestrengen indføbt i et fint Stykke Lærred, der er byppet i Olie (Mandel- eller Valmueolie) og klippet over indtil Midten, og lægges paa den højre Side af Underlivet, hvor det befæstes i denne Stilling ved et Mavebind. Enhver Riven i Resten af Navlen eller dens voldsomme Bortfjernelse maa strængt undgaaes, da der derved let opstaae haardnakkede Blødninger og der ved en forstyrret Dannelse af Navlen kunne hidføres Broktilsfælde. Opstaa desuagtet Navleblødninger, som ikke lade sig fuldstændig standse ved Paalæg af Fyrsvamp eller ved paastrøet Gummi, maa man ikke tøve med at tilkalde en Læge, som vil vide hurtigt at stille Blodet ved Anvendelse af en gloende Strikkepind eller ved andre chirurgiske Midler.

Ikke sjældent danner der sig umiddelbart efter Fødselen, som Følge af heftigt Tryk (især ved kunstige Fødsler under Anvendelse af Tangen) paa den Nyfødtes Hoved en Svulst (saakaldet Hovedsvulst eller Forhoved). Man kan som oftest overlade den til Naturen, som, naar den kun er lille, fjerner den i Løbet af nogle faa Dage; navnlig maa ethvert Tryk paa Hjernen, der som Følge af Svulsten ofte synes skjæv eller spids, strængt undgaaes. Kun ved virkelig Hovedblodsvulst, som først viser sig 24 Timer efter Fødselen, voger Dag for Dag, indtil den i Løbet af 8 Dage har naaet sin største Udvilling, og er omgivet af en Brusstring, kan man anvende en Compres, som er befugtet med fortyndet Arnica tinctur (8 Draaber i en halv Overkop Vand). Den samme Fremgangsmaade anvendes ved Svulster eller Knuder paa

andre Dele af Legemet. Tiltager Svulsten paa Hovedet og bliver blød, og viser det sig ved Berøring, at den indeholder Vædske (Blod eller Materie) saa maa man anvende nogle Indgiuter Silicea Morgen og Aften; formindstes den ikke i Løbet af 3 Dage, men bliver den blødere og mere farvet, maa man aabne den ved et Indsnit og bortfjerne Indholdet ved et let Tryk, samt vedblive med Silicea endnu i nogle Dage. Kun naar Barnets Kræfter synes at svinde stærkt, og der skulde indtræde Appetitløshed og Diarrhoe, maa der gives China istedetfor Silicea.

Ophoven og Forhærdelse i Brystvorterne hos Nyfødte fremkommer sædvanlig kun som Følge af sammes Bestadigelse eller de ufornuftige Forsøg paa at trykke samme ud; sjældent er en slig Betændelse ikke af mechanisk Oprindelse, men alene forarsaget af indre Årsager. I førstnævnte Tilfælde er Arnica altid Lægemidlet, og anvendes ubvendigt (8 Draaber i en halv Overkop Vand); i sidste Tilfælde Belladonna, navnlig naar Rødmten er stærk og udbredt over en Deel af Brystet. Bliver Svulsten større og indeholder den Materie, saa maa Hepar sulph. anvendes i nogle Indgiuter. Desuden maa naturligtvis ethvert ydre Tryk strengt undgaaes og der maa drages Omfjorg for en meget blød Bandage.

Hudløshed er i de fleste Tilfælde ikke nogen Sygdom, men den naturlige Følge af den Nyfødtes overordentlig ømfindtlige Hud, naar den udsættes for Gnibning, Tryk og Fugtighed; derfor forekommer den især hos fede og velnærede Børn, og navnlig under Armene, imellem Laarene, paa Halsen, i Bagdelen og i Lyskerne. Ofte er den rigtig-



nok kun forarsaget af Efterladenhed og Ureenlighed, naar Sved, Urin og Smuds ikke bliver fjernet ved omhyggelig Bæst og Tørring. Det bedste Middel til at undgaa og helbrede disse Tilfælde er derfor større Reenlighed og en omhyggelig Hudpleie; hos fede Børn er det ogsaa hensigtsmæssigt at pudde de paagjældende Steder; hertil maa dog kun bruges fiint Kartoffelmeel, paa ingen Maade andre medicinse Pulvere. Denne Puddren er imidlertid vel at forstaa kun et Forhindrengsmiddel, imod Hudløshed, ikke noget Lægemediel derfor. Tværtimod maa man vogte sig for at anvende det, hvor Overhuden allerede er gaaet af, og hvor der er Bæst; thi denne forener sig med Pulveret og danner haarde, store Skorper og forøger derved betydeligt Betændelsen i Huden. Overhovedet er Puddren kun nødvendig hos fede Børn, og selv da kun med tilbørlig Forsigtighed og Opmærksomhed; dersom de paagjældende Hudsteder ikke forinden omhyggeligt renses, er Pudderet ikke fiint nok, eller trænger det ind i de udvendige Rjænsdele, saa bliver Huden pirret og netop derved Hudløsheden fremfaldt. Hos magre Børn er den derimod, som alt bemærket, ganske overflødig, og en omhyggelig Hudpleie alene istand til at forhindre Hudløshed. Hvor der imidlertid trods den fornødne Reenlighed dog fremkommer hudløse og bæstende Steder, eller hvor det som Følge af Efterladenhed i Hudpleien opstaaede Onde ikke bedrer sig efterat den skadelige Indvirkning er ophørt, eller maaske endogsaa forværrer sig, der maa man gribe til Anvendelsen af directe Lægemedier. Dette finder imidlertid kun Sted hos sygelige Børn, meest som Følge af Diarrhoer, og indskrænker sig derfor sæd-

vanligt til Bagdelen, Rjønndelene og Laarene. Det virksomste Lægemiddel er sædvanligt Chamomilla 3—4 Dage i Rab een Indgiot daglig. Kun hvor det allerede er misbrugt som Bad eller Thee, eller hvor der ikke viser sig nogen væsentlig Bedring efter 4 Dages Forløb, er Lycopodium mere hensigtsmæssig. Gaa de hudløse Steder over i Forbolbning eller forbydes Saarfladerne og afsondre de en stor Mængde ildelugtende, materieagtig Fugtighed, som tærer paa Barnets Kræfter, maa der anvendes Mercur 1—2 Gange daglig. Tillige maa det samvittighedsfuldt paasees, at Moderen eller Ammen omhyggeligt afholder sig fra alle skarpe, stærkt saltede, sure og fede Spiser og Drikke, og at der iagttages den største Reenlighed og Hudpleie, navnlig ved daglige Bade. Udvendig er det i saadanne Tilfælde tillige tjenligt, at indgnide de vædstende Steder med lidt frisk Dretalg, efter at en forsigtig Aftørring har fundet Sted. Indtræder der efterat Mercur 4—5 Dage er givet 2 Gange om Dagen ingen Bedring, saa giver man en Indgiot Hepar sulph. derimellem og vedbliver da atter med Mercur. I meget haardnakkede og ondartede Tilfælde, især hvor dette Onde viser sig navnlig eller ubelukkende i Bagdelen og paa Rjønndelene, kan en syphilitisk Smitte ligge til Grund derfor; ogsaa i dette Tilfælde er Anvendelsen af sidstnævnte Midler hensigtsmæssig, uagtet det er tilraadeligt da at overlade en Læge Afgjørelsen og Behandlingen.

Ikke sjældent indtræder der Urinbesværligheder hos Pattedørn, og da især Urinstandsening, den saakaldte Blærekrampe. Enten bestaaer denne Lidelse kun deri, at Barnet før Vand-

ladningen viser stor Uro med Strig og med at træffe Benene op under sig, eller Urinen bliver saa længe opholdt i Blæren, at denne ved Underføgelsen viser sig udspændt og sm for Tryk. I første Tilfælde forarsages det hele Onde af hudløse Steder ved Udgangen af Urinrøret, som svie ved Urinens Afgang og forarsager Barnet Smerte, saaledes at dette frivillig holder Urinen tilbage, saalænge som muligt eller ialtfald lader den løbe under Strigen. I dette Tilfælde er der altsaa ingen Sygdom i Blæren eller Blærehalsen, og derfor maa kun sørges for saa hurtigt som muligt at beskytte og læge de hudløse Steder. Bliver derimod Urinen holdt tilbage i Blæren og opsamles der paa Grund af Krampe i den Muskel, som lukker for Blæren, hvilket for det meste kun foranlediges ved Vinde eller Kolik, skal man snarest mulig benytte et Omslag af Hørfrø paa Blæreegnen og give nogle IndgiFTER Chamomilla eller Pulsatilla. Skulde der som Følge af Blærens stærke Udvidelse indfinde sig stor Ømsindtlighed og Smerte i Blæreegnen med Feber, med Træksninger og Krampe eller endogsaa udvikle sig betændelsesagtige Symptomer, saa maa der først gives nogle IndgiFTER Aconit eller Belladonna. Ikke sjældent opstaaer der efter Anvendelsen af et spant Flueplaster, hvilket rigtignok er i høi Grad usornuftigt hos Pattedørn, en meget heftig Urinstandsning med Smertes; en saadan læges hurtigt ved nogle IndgiFTER Camphora.

Et Barn under eet Aar skal have Aabning 2 Gange om Dagen, og fra det første til det tredje Aar mindst een Gang om Dagen; er dette ikke Tilfældet, saa bliver Excrementernes Consistens for

haard, og der indtræder Forstoppelse. Mær-  
sagerne hertil ere enten mangelfuld eller for seig  
Tarmslim, saaledes som det er Tilfældet i de fleste  
feberagtige Sygdomme eller ved forøget Sved og  
Urinaffondring, eller ogsaa for faste, altfor stivelse-  
holdige Næringsmidler. I sjældne Tilfælde kunne  
ogsaa for svage peristaltiske (sammentrækkende) Be-  
vægelser i Tarmene som Følge af andre Organ-  
sygdomme, især i Hjernen eller endnu sjældnere  
mechaniske Hindringer, saasom Tarmeslyngninger,  
Tarmbrok, Lukning af Endetarmen, være Skyld deri.

Hos Nyfødte hæves Forstoppelsen som oftest  
lettest ved et Klysteer af lunkent Vand med en  
Skeefuld Olie i, som i fornødent Fald bliver gjen-  
taget efter 24 Timers Forløb; samtidigt hermed  
maa da, dersom Barnet opammes kunstigt, Næringen  
indrettes tyndere og lettere. Hos Bælebørn, som  
ere flere Uger gamle, optræder Forstoppelsen ikke  
sjældent mere haardnakket, og oftest i Forbindelse  
med andre Fordøielssbesværigheder. I saa Til-  
fælde kan dette Onde sjældent bekjæmpes alene  
ved Klysterer, men det nødvendiggjør Lægehjælp.  
Navnlig ere her *Nux vomica*, *Bryonia* og  
*Opium* af god Virkning; deres specielle Anven-  
delse er omtalt under Forstoppelse. I Tilfælde af  
en meget haardnakket og ofte tilbagevendende For-  
stoppelse er ogsaa *Lycopodium* et meget godt  
Lægemiddel.

Imod Besværigheder af Vinde og Mave-  
pine er *Chamomilla* for det meste det Mid-  
del, som hjælper bedst; kun hvor det allerede er an-  
vendt massenvis, maa *Coffea*, eller ved sam-  
tidig Forstoppelse *Nux vomica* bruges. Er  
Barnet meget uroligt, skrider det og trækker Be-

nene op og ere Udtømmelserne vandagtige, er Jalappa det hensigtsmæssigste Middel. Iøvrigt maa herved stedsse tages Hensyn til Moderen eller Ammen, idet der hos Pattebarnet ofte gennem Mælken foraarsages Anfald af Binde og Kolik med gastriske Besværligheder hos Moderen; ogsaa have Sindsbevægelser, navnlig Urgrelse og Stræk, ikke sjældent en skadelig Indflydelse paa Mælken. Derfor er det nødvendigt, at en Diegivende strængt maa undgaa oppustende og svært fordøielige Spiser, saavel som enhver Umaadelighed og Uregelmæssighed; kan desuagtet en Sindsbevægelse ikke undgaaes, saa maa hun ialtfald ikke strax give Bryst, og maa, før hun gjør det, ved Hjælp af et Sugelas lade den første Mælk udsuges. Denne Slags Indflydelser paa Mælken ere saa vigtige, at de ogsaa have en væsentlig Indflydelse paa Behandlingen; saaledes lade undertiden Følgerne af Urgrelse eller Brede sig hæve med Chamomilla eller Coffea, af Stræk og Ophidselse med Aconit eller Opium, af Sorg og Græmmelse med Ignatia. Ved længere Vedvaren og gjentagende Tilbagevenden af slige skadelige Indflydelser paa Moderermælken er det hensigtsmæssigt, ikke alene at give disse Lægemidler til Pattebarnet, men ogsaa til den Diegivende.

Meget ofte indtræder der Brækning hos Pattebarnet. Denne er aldeles farefri, saalænge kun en Deel af den i rigeligt Maal nydte Mælk kommer op snart efter Nydelsen af samme og dette navnlig foraarsages ved heftig Bevægelse, eller ved at Barnet bæres i en Stilling, hvorved dets Mave trykkes. Derfor Brækningen finder Sted umiddelbart efter at Mælken er drukket, saa er

denne aldeles uforandret, har den derimod været i Maven en halv Time eller længere, saa seer den oftest og sammenløben ud. Derimod er det skadeligt for Barnets Ernæring og et aabenbart sygdeligt Symptom, naar Opkastning af Mælken forekommer hyppigt og regelmæssigt, naar den ikke opstaaer som en Følge af Overfyldning af Maven eller af mechanisk Tryk paa samme, men naar den forarsages af svag Fordøjelse eller en sygelig Virrelighed. I saa Tilfælde fremkommer Opkastningen ikke umiddelbart efter Nybelsen, men først længere Tid derefter, og forud for samme gaaer da Opstød, Hikke, Uro, Skrigen og Tegn paa Ildebefindende og Kvalme, saasom Ansigtsbleghed, kold Sved, svag Puls, uregelmæssigt Aandedræt. Det opkastede lugter ofte fyrligt, er mere eller mindre oftest eller blandet med Sliim; næsten altid viser sig samtidig Uregelmæssigheder i Aabningen, Barnet affondrer mindre, som oftest mørkere Urin, og bliver svagere og slappere. I de fleste Tilfælde ere nogle Indgiwter Ipecacuanha tilstrækkelig til at hæve Brækningen, især naar vandagtige Diarrhoer staa i Forbindelse dermed; mangle disse og ogsaa andre betydeligere Symptomer, som ellers følge med, saa hjælper Aethusa Cynapium ofte endnu hurtigere. I meget haardnakkede Tilfælde med stærk Afmagring og Svækkelse ere Kreosot og Arsen virksomme. Opstaaer Brækningen efter Hoste som Følge af Mavens Rystelse, passe bedst Tartarus emeticus eller Ferrum, særlig naar det Opkastede indeholder meget Sliim. Det er meget ofte naturligt, navnlig hos Børn, som opammes kunstigt, at Brækningen alene foranlediges ved upassende Levnetsmidler, ved for haard, for svær eller forfalsket

Mælk, overdaadig eller utidig Ernæring, syrlig Sut og beslige; hvorfor der til Helbredelse af Brækningen ikke behøves andet end en Regulering af Diæten. Herved maa endnu bemærkes, at hos diende Børn er Tungens Belægning langt fra saa vigtig og characteristisk, som hos ældre Børn og Vorne. Ofte viser der sig hos Pattebørn en hvidlig Belægning, uden at man paa Grund deraf bemærker nogensomhelst Fordøielseforstyrrelse. Rigtig nok bliver ogsaa ved de fleste Mave- og Tarmsygdomme hos smaa Børn Tungen hvid belagt, men dette kan vare længe efter at Appetiten atter er vendt tilbage. Virkelig tyk Belægning forekommer næsten aldrig. Desuagtet fordrer Tungen og Mundhulen en vedvarende omhyggelig Opmærksomhed, for at Dannelsen af smaa Svampe og andre Uordener ikke skulle oversees.

Et lettere og som oftest ganske ligegyldigt Symptom er Hikke, der ofte forekommer stærkt og vedvarende efterat Barnet har druffet. Som oftest ville nogle Draaber Sukkervand eller et Stykke tørt Sukker være tilstrækkelige til at standse den, skulde dette ikke hjælpe, eller den viser sig ofte og regelmæssig efterat Barnet har druffet, giver man en eller nogle Indgioter Ignatia.

Imod Diarrhoe, som er den Lidelse, hvoraf Pattebørn hyppigst ere plagede, ere de vigtigste Lægemidler Chamomilla, Colchicum, Ipecacuanha, Mercur, Rheum, Secale corn., Sulphur og Calcareo acetica, hvis specielle Symptomer senere skulle angives.

Snue og Hoste angribe gennemsnitlig ikke hyppigt Pattebørn, kun en Slags fuldstændig Forstoppelse i Næsen gjør undertiden Patningen meget

besværslig. Nogle Indgivter *Nux vomica* og gjentagen Bestrygning af Næsen indvendig og udvendig med Mandelolie hæver som oftest denne Besværslighed meget hurtigt. Er Næsen forstoppet med en tyk, seig Sliim og farer Barnet pludselig op af Søvne, som om det skulde kvæles, saa hjælper *Sambucus*. Imod Hoste hjælper bedst nogle Indgivter *Aconit*, men samtidig maa enhver Forkjølelse omhyggelig undgaaes og Badene opsættes, saalænge Hosten er af nogen Betydning.

Al Hudsygdomme forekomme især følgende hos Nyfødte og Pattebørn. De saakaldte Hudorme (*Comedoner*) ere meget hyppige, især i Ansigtet og i Nærheden af Ørene, men ogsaa paa det øvrige Legeme; de opstaae ved Forstoppelse af Udsørfelseskanalerne fra Hudens Talgkjertler, og kunne undertiden ophørne i betydelig Grad og gaae i Betændelse og Forholdning. Ved behørig Renselse af Huden, især ved gjentagen Baden og lemsfældig Gnibning med Sæbe og Hvedeklid fjernes de efterhaanden aldeles og behøve saaledes ikke nogen Lægebehandling. Ligesaa lidt behøver Arp, et skjælagtigt Lag paa Isen, noget indvendigt eller udvendigt Medicament, da det kun er Følgen af at Hudtalg og andet Smuds klæber sig fast, og da det ved gjentagen Badstning eller ved Indgnibning med Olie eller Smør let lader sig bortfjerne. Enhver voldsom Afstrafsning eller Afkæmning maa ganske undgaaes, alene af Hensyn til det mulige Tryk, som derved forarsages paa Hjernen, der netop paa dette Sted endnu ikke er beskyttet af noget Beendække, men som i det første Aar kun er bedækket af Hud og bløde Dele. Vigtigere er en Hudsygdom der benævnes *Pemphigus neonatorum*;



det er Blærer af Størrelse som en Vrt indtil en Hasselnød, som ere fyldte med en lys Vædske, og enten briste eller tørre hen, og derefter danne et hudløst Sted eller en tynd Skorpe. De fremkomme uden Orden over hele Legemet, især paa Hænder og Fødder, snart i større, snart i mindre Antal. Ved Rlsen og Brænden, saavelsom derved at Linnedet klæber fast ved dem, forarsage de let Uro og Søvnløshed, og kunne, naar de ere tilstede i større Mængde, foranledige Feber og Afmagring. Omhyggelig Reenlighed ved gjentagen Badning og ved at bestrø de vædskende Steder med Kartoffelmeel, saavelsom nogle Indgioter *Rhus toxicod.* bevirke næsten altid i nogle Dage fuldkommen Helbredelse; skulde de derimod paa nogle Steder gaa over i Boldenskab, maa der gives nogle Indgioter *Merc. sol.* Frislinger og Hedetøi ere kun en Følge af overdreven Opvarmning og Sved og forsvinde uden nogen Besværlighed ved en bedre Hudpleie og flittig Badning; hvis der ifølge samme yttres sig betydelig Uro, hjælper nogle Indgioter *Aconit* hurtigt. Mælkeskorpe og Skurv skal specielt blive omtalt.

Rosen udvikler sig hyppigt hos Nyfødte, som allerede omtalt, ved en Betændelse og Forholdning af Navlen eller ved Hudløshed paa Rjønssdelene, og udbreder sig ikke sjældent over Underlivet og Brystet, undertiden endogsaa over en Deel af Ryggen og Lemmerne. Men ogsaa uden saadan Foranledning viser denne Sygdom sig sandsynligviis forarsaget af Hudens Omfindtlighed, af Ureenlighed og deslige, dog maaske ogsaa af indre Aarsager. I det mindste har man i Hittébørnshospitaler endogsaa gjentagende seet den optræde epidemisk. I denne Sygdom er Huden glindsende rød, tør, haard, op-

spulmet og sm for Berøring; i sværere Tilfælde bliver Huden blaalig og træagtig, Ansigtet fortrukket, Lemmerne kolde, Patienterne tørste og ere søvnløse, og dø langsomt af Svækkelse, eller Rosen bliver brandagtig, undertiden allerede efter faa Dage og medfører da Døden. Saalænge der kun er en rosenagtig Betændelse af Navlen og dens nærmeste Omgivelser tilstede, kan man læge Betændelsen og Forholdningen ved en Forbinding med Arnicaopløsning (6 Draaber Tinctur i  $\frac{1}{2}$  Kop Vand); men saasnart den virkelige Rosen udbreder sig, maa man strængt undgaa vaade Omslag, og stiftetvis give Aconit og Belladonna indvendig hver 2.—3. Time. Udvendig bedækkes Stederne med Vat eller man bestrøer dem i Tilfælde af heftig Kløse med Hvede- eller Kartoffelmeel. Udbreder Rosen sig alligevel eller bliver Huden endog blaalig og haard, maa man give Lachesis, eller ved hurtig Afkræftelse Arsen. Men er det nogensunde muligt, bør man ikke forsømme strax i Begyndelsen at tilkalde en Læge.

En vis Lighed med Rosen har Sklerom, Gelledævsforhærdelse, en Lidelse, som kun forekommer hos Nyfødte i de første Uger. Der fremkommer først paa Benene en rød, haard Svulst med Formindskelse af Temperaturen, denne træagtige Haardhed forplanter sig efterhaanden over hele Legemet, kun Brystet bliver, forunderligt nok, forstaaet, medens Ansigtet som oftest aldeles vaskes ved Læbernes, Kindernes og Vienlaagenes Opsvulmen. Dens første mørkerøde Farve gaaer snart over til en guulagtig og Huden bliver aldeles tør. Temperaturen falder betydeligt, ikke alene paa Huden, men ogsaa i Munden. Børnene patte ikke

mere og aande aldeles overfladist. Åbning og Vandladning ophøre næsten aldeles og Stemmen bliver svag og flyktende; Puls- og Hjerteslag blive stedse svagere og Huden aldeles føleløs. Indtræder der ingen Bedring tiltager Kulden stedse mere og mere, Åndedrættet bliver svagere, der flyder blodigt Vand ud af Næse og Mund, og Døden kommer rolig og uden Krampe.

Denne Sygdom betinges sandsynligvis af en utilstrækkelig Virksomhed i Hjertemusklerne. Ved Behandlingen af denne heldigvis sjældne Sygdom kommer det fremfor Alt an paa at forhøje Legemets utilstrækkelige Varmefrembringelse ved Varmeflaster, varme Tæpper og deslige, og saa vidt muligt at opretholde Kræfterne ved at give Mælk, naar Patningen ikke kan finde Sted. Indvendig anbefales gjentagne svage Indgioter af Arsen, maastee kan i forvovlede Tilfælde endnu Lachesis eller Chininum arsenicosum bringe Hjælp.

Gulsot hos Nyfødte adskiller sig hyppigst fra samme Sygdom hos Borne derved, at hos hine er Urinen ganske lys, Udtømmelserne derimod ere mørke og galdefarvede. Aconit er her i Almindelighed det bedste Middel; kun naar Åbningen er slimet, hæftet og diarrhoeagtig, maa der tillige bruges Mercur og Chamomilla, og i meget haardnakkede Tilfælde Lachesis.

En overordentlig hyppig og navnlig for Mødre og Ammer høist besværlig Tilstand er endelig Søvnløshed hos Børn og deres Uro og Skrigesyge om Natten. Næsten altid bliver disse Tilstande et virkeligt sygeligt Symptom, thi ethvert Barn behøver til dets successive Udvilling megen Søvn og netop jo yngre det er, desto mere, saaledes

at f. Ex. et Barn paa faa Dage, selv Uger, næsten altid maa sove, og at et Barn paa 6 Maaneder endnu skal sove 14—18 Timer i Døgnet. Derfor, og ikke alene til Rettelse for Omgivelserne, maa enhver Forkortelse af Barnets Sovetid saavidt muligt undgaaes, og enhver Foranledning og Aarsag dertil med Omhyggelighed undersøges og fjernes. Hyppigst er uhenigtsmæssig og overdreven Næring Aarsag til at Sønnen forstyrres. Børn, som faae formeget Chamille-, Baldrian- eller andre Theesorter, for megen Bælling eller daarlig Mælk, eller hvis Moder eller Amme nyde megen Kaffe, Vin eller anden upassende Kost, ville snart komme til at lide af Søvnløshed. Ligeledes forkortes Sønnen ved for fast Svøb, for høit Leie med Hovedet, for varme Fjerdynner, forbærret Luft i Værelset, Ureenlighed, hudløse og fløende Steder paa Legemet, Utøi etc. Først naar alle slige Omstændigheder ere afhjulpne, bør man stride til Anvendelse af Lægemidler, fordi man først da kan antage, at den vedvarende Søvnløshed hidrører fra indre sygelige Tilstande. Er der Fordøielseforstyrrelser tilstede, navnlig Vinde, Kneb og Diarrhoe, virke næsten altid Chamomilla og de allerede tidligere nævnte Lægemidler meget hurtigt. Hvor disse Symptomer enten slet ikke vise sig eller kun i en ringe Grad, og en sygelig Uro og Pirrelighed saaledes synes at være tilstede, er Coffea et udmærket Middel, men har Barnet tillige Hæde og Rødme i Ansigtet, eller pludselig vaagner skrigende op om Natten efter en kort Søvn, maa Belladonna anvendes; Aconit derimod, naar Uroen og Søvnløsheden ogsaa viser sig om Dagen. Bemærkes endvidere tillige om Natten en ualmindelig Lyst og Begjærlighed til at drikke, med Tørhed i

Læberne og Munden, skal der gives Bryonia; viser Søvnløsheden sig uden paafaldende Symptomer, saasom utidig Munterhed, ved hvilken Børnene ere rolige, maaste endogsaa vise Lyst til at lege og lee, saa hjælper Hyoscyamus eller Ranunculus bulbosus. Et affstyeligt Middel er Buggen og Rysten af de urolige Børn, som aabenbart er en slem og farlig Ting, naar man betænker, at den Ro, som derved søges opnaaet, kun er en Svimmelhed og Bedøvelse, foraarsaget ved en Hjernerystelse. Rigtignok er det endnu mere utilgiveligt at give Børnene Opium eller Balmuesaft for at dæmpe Uroen, eller at lade Ammerne nyde betydelige Portioner af Viin og andre spiritusøse Drikke, for at frembringe en hurtig Ro, d. e. en Beruselse og Bedøvelse af Hjernen.

Alt hvad her er sagt, passer ligeledes mod usædvanlig Strigen Dag eller Nat. Det kommer ogsaa her fremfor Alt an paa at opdage Aarsagen til Strigningen, thi et Barn under et Aar striger aldrig af saakaldet Arrighed, men af en eller anden Grund. Selv om det ikke er muligt at udfinde og bortfjerne Aarsagen dertil, eller at berolige Barnet ved de ovenfor anførte Lægemidler, vil det dog altid være bedre at lade det strige, end at anvende de nævnte skadelige Midler og Vaner, thi Strigningen i og for sig, selv om den vedblev i flere Timer, vilde ikke foraarsage nogen saa umiddelbar og sikker Fare, som Bedøvelsesmidler frembringe.

---

## B. Sygdomme hos Pattebørn og ældre Børn.

Rigtignok kunne flere af de nylig omtalte Sygdomme hos Nyfødte ogsaa forekomme i senere Uger og Maanedes, selv i senere Aar, ligesom ogsaa enkelte af de Sygdomme, som vi nu skulle afhandle, kunne iagttages i de første Levedage eller Uger; men i det Hele maa dette dog betragtes som en Undtagelse og man kan oftest opstille den Regel, at enhver Livsperiode har sine eiendommelige Sygeligheder, eller ialfald giver særdeles gunstige og hyppige Anledninger til sammes Forekomst.

### 1. Hjernebetændelse.

Naar denne Sygdom her omtales, saa er dette langt mere for at give nogen Forklaring om dens Fremkomst, Bæsen og Symptomer, end for at overlade dens Behandling til en Lægmænd, thi det er desværre altfor vist, at der med Hensyn til denne farlige Sygdom netop hersker store Feiltagelser, og at den ligesaa hyppigt antages at være tilstede, hvor en Lungebetændelse, Mæslinger, Tyfus etc. er i Begreb med at udbryde, som omvendt, at den oversees og ikke kjendes. Heldigviis forekommer Hjernebetændelse ikke hyppigt hos Børn, ialtfald ikke hyppigere end hos Vorne, og som oftest lader dens Aarsager sig udfinde med stor Bestemthed.

For det meste er det den bløde Hjernehinde som er Stedet for Betændelse og Udsvedning, uagtet ogsaa de andre Hjernehindes og selve Hjernen undertiden ere sygeligt angrebne. Aarsagen dertil kommer

enten udenfra, saasom et Fald, et Stød, Beskadigelse af Jæsen, Solstik, overordentlig aandelig Anstrængelse, eller Sygdommen udvikler sig ved Udbredelse af Betændelser i nærliggende Organer, navnlig som Følge af Betændelse og Flob i Ørene, af Skarlagensfeber, Ansigtsrosen, saavel som af uforsigtig Forbrivelse af Udslet i Hovedet og Ansigtet etc. De væsentligste Symptomer ere følgende: naar den forreste Fontanelle ikke allerede er lukket, er den spændt, hævet og pulserer stærkt; heftig Hjerne-hovedpine i Sygdommens Begyndelse, indtil der indtræder Forstyrrelser af Bevidstheden og Sovesyge; Forstyrrelser i Aandsfunctionerne, først Angst og Uro, derpaa Delirier, tilsidst Sovesyge (Sopor) og Bevidstløshed; Ansigtet er i Begyndelsen rødt og livligt, derpaa blegt, indfaldent, udtryksløst, Pinene ofte stirrende, Ømfindtlighed for Støi og Berøring; strax fra Begyndelsen Feberhede i høi Grad og uden Afbrudelser, Pulsen meget hurtig, næsten ikke til at tælle, sjældent Sved, i det høieste paa Panden; Tørst og Mangel paa Appetit, Opkastning og Forstoppelse, og trods denne Forstoppelse paafaldende baadformigt indtruffet Underliv, som er ømfindtligt for Tryk; Krampe, navnlig i Ansigtet, forekommer ikke sjældent strax hos Pattebørn, hos ældre Børn forbedneste senere; ogsaa Skelen, Krampe i Kæbebenene, Stivkrampe og Lammelse vise sig undertiden, naar Sygdommen udvikler sig videre.

Sygdommen forekommer hyppigst i det første og imellem det 5te og 10de Aar, den optræder som oftest pludselig; hos Nyfødte dræber den undertiden i Løbet af 1—2 Dage, sædvanligt er dog dens Varighed 9 Dage, sjældent længere. Ved et gunstigt Forløb mildnes Symptomerne efterhaanden,

der indtræder da som oftest en meget stærk Afmagring og undertiden efterlader den en livsvarig Kandsvækkelse.

Af det Anførte fremgaaer, at denne Sygdom kun lidet egner sig til at behandles af Lægmand. Hvor en Læge ikke hurtigt, eller maaske slet ikke kan hidkalde, maa der fremfor Alt drages Omsorg for absolut Ro, Bortfjernelse af stærkt Lys og den strængeste Diæt. I de fleste Tilfælde passer bedst i Begyndelsen Belladonna eller Bryonia; viser der sig Sovesyge og Bedøvelse, saa giver man Opium eller Apis, og ved Kramper eller vilde Uro og Delirier strax Stramonium.\*)

Viser der sig efter et Fald eller et Stød paa Hovedet nogle af de nævnte Symptomer, navnlig Svimmelhed, Opkastning eller Skelen, saa er det meget sandsynligt, at der er en Hjernerystelse tilfede, og at der kan indtræde en Hjernebetændelse; i saa Fald er det tilraadeligt, indtil man kan faa en Læge hentet, strax at give nogle Indgiøtter Arnica og at lægge Omslag af fortyndet Arnica-Tinctur paa Hovedet.

## 2. Vand i Hovedet.

Man betegner hermed en rigelig Mængde vandagtig Vædske i Hjernehulerne. Denne kan enten

---

\*) Homöopathisk Læge, Dr. Rastka sen. i Prag anbefaler i Forsøberstadiet Kali hydrojodicum 1ste eller 2den Forthynding. Det skal ofte kunne hindre Sygdommens Udbrud. Jeg har anvendt det flere Gange med Held ved tidlige Tegn paa Sygdommen.



være medfødt eller kommer senere tilstede og kan forløbe chroniskt eller acut.

De væsentligste Symptomer ved chroniske Vand-samlinger ere følgende:

Forstørrelse af Hjerneballen, især i Forhold til det lille Ansigt med forældede Træk, forhindret Beendannelse i Fontanellerne, som trods almindelig Afmagring dog blive stærkt spændte og fremragende og hverken hæve eller sænke sig ved Andedrættet, men tydelig angive Pulsslaget ved at hæve sig, Hovedpine, idetmindste i Førstningen, Svimmelhed eller ialtfald stor Frygt for at falde og for enhver Bevægelse, Sovesøge afveglende med Uro og Opvaagnen i Skræk, først Opvækthed, senere Sløvhed i Sandserne; Intelligentsen i lang Tid uforstyrret; i Sygdommens videre Forløb stirrende, uimodtagelige Dine med Slaphed i Dienlaagene, Stelen, usikre Bevægelser, automatisk Griben med Hænderne, Tyggen og Synkebevægelser; Krampe, Lammelser; ubetydelig Feber og Hede, ikke nogen hurtig Puls, snarere formindsket Varme; Underlivet for det meste indtruffet eller fladt; Opkastning, ofte ufrivillige Udtømmelser.

Sygdommen kan vedvare i flere Aar, men ogsaa i Løbet af 1—3 Uger ende med Døden. Ved medfødt Vandsamling i Hovedet i større Omfang, ere Udsigterne kun sørgelige, ligesom ogsaa denne Sygdom hører til de farligste, hvad enten den er medfødt, eller selvstændig har udviklet sig af andre Sygdomme. Den acute, altsaa ikke medfødt, bestaaer i Miliærtuberkulose i den indre Hjernehinde med Forøgelse af Hjernehulernes flydende Indhold og tiltagende Blødhed af de nærliggende Hjerne-partier, den træffes hos Børn, hvor allerede anden

Tuberkelaflejring (mest i Lungerne) er bleven bemærket, som ogsaa tilsyneladende hidtil sunde. Ved denne Slags Vand i Hovedet er naturligvis Hjernens Misforhold lidet eller slet ikke synligt; Børnene begynde at blive vrantne, uartige, usikre i Gangen, stifte ofte Farve, miste Appetiten, lase undertiden op, faae Forstoppelse, med indtruffet Underliv, Svimmelhed, Bedøvelse, Hovedpine, blive lysst, sove uroligt med Opvaagnen i Stræt etc. indtil efterhaanden de ovenomtalte Symptomer indfinde sig.

Ogsaa Behandlingen af denne Sygdom egner sig ikke for Lægmand, den er kun beskrevet her for hurtigst muligt at foranledige Forældrene til at tilkalde en Læge, thi som oftest er Hjælp kun mulig naar den bruges strax.

I Begyndelsen er det hensigtsmæssigt at anvende nogle Indgiuter Belladonna, undtagen i Tilfælde, hvori en Rystelse eller Bestäubigelse af Hovedet har foranlediget Sygdommen; i saa Fald vil Arnica passe bedre. Hvor Sygdommen er længere fremskreden kan man vente Hjælp af Bryonia, Opium, Apis, Sulphur. Imod medfødt Vand i Hovedet anbefales især Helleborus og Jod.

### 3. Mælkeskorpe.

Dette Ansigtssubstlet hjemsøger, som bekjendt, ikke sjældent forøvrigt sunde Børn, og i særdeleshed i det første Leveaar. Den derved forarsagede Vanskabning, saavel som Skarpheden af den Fugtighed, som udsøndres, og den af den heftige Brænden og

Alse forarsagede Urolighed er som oftest saa betydelig, at denne Sygdoms. som oftest temmelig godmodige Character gjør den hurtigst mulige og sikke Helbredelse meget ønskelig. Denne opnaaes let ved homøopathisk Behandling og med Undgaaelse af alle skadelige ydre Midler, og som oftest ved Anvendelse af *Rhus toxicodendron*, *Viola tricolor* eller *Sassaparilla*. Ere Omgivelserne stærkt betændte og Barnet meget uroligt, saa er det hensigtsmæssigt, først at give nogle Indgiuter *Aconit* og derpaa *Rhus*. Skulde der efter *Rhus* iffe snart vise sig Bedring, bruger man *Viola tricol.*, og om nødvendigt *Sassaparilla*. Ophører Bedringen, eller er Ondet haardnakket, saa maa der gives nogle Indgiuter *Sulphur*. Udbreder Udslettet sig til Ørene og banner der sig ved samme vædskende Ringorme med Skurv og Øreflod, saa passe især *Mercur* og *Hepar sulph.*

Udvendigt maa der i Almindelighed Intet bruges, ved heftig Alse og uimodstaaelig Lyst til at rive sig kan man gjentagende let bestrøge de paagjældende Steder med *Glycerin* eller frisk Dretalg. Derimod maa alle tørrende Zink- eller Blysalver strengt undgaaes, da samme undertiden afstedkomme stor Skade.

#### 4. Skurv i Hovedet.

Til Helbredelse af dette meget ubehagelige Onde, som characteriserer sig ved smaa Blærer i Hovedhaaret, som vædsk og danne Skorpe, er i de fleste Tilfælde *Rhus toxicodendron* i gjentagne Indgiuter tilstræffeligt. Før man bruger

denne Medicin, kan man, naar der samtidig viser sig Svulst i Kjertlerne paa Halsen og Nakkens, først give nogle Indgiver Sulphur. Ydre Midler maa ganske undgaaes, kun maa man for Renlighedsskyld og for at fjerne den sædvanligvis skarpe Fugtighed affjære Haaret tæt hver Dag og vaske Hovedet omhyggeligt med Sæbe og Vand. I de sjældne Tilfælde, hvori der ikke følger betydelig Bedring efter Rhus, vil en saadan indtræde efter Brugen af Hepar sulphuris, Graphit, Staphysagria og Spongia.

Foruden denne Slags Hovedfuro forekommer endnu en anden, den saakaldte Honningstivesturo, denne bestaaer ikke i Blærer eller Skorper, men characteriserer sig ved en fortsat Dannelse af en Slags Svampe ved Haarrødderne, som ligne Krebsene og have en eiendommelig Lugt af Museexcrementer. Hovedmidlet herimod er foruden daglige Sæbevaskninger, Staphysagria og Hepar sulph. Og saa maa det anbefales, i de Tilfælde, hvor der findes faste og tykke Skorper, og disses Sammenklæbninger indbyrdes og med Haarene ere betydelige og haarde, da at blødgjøre disse Masser ved gjentagne Indgnidninger eller Omslag af Balmue eller Olivenolie.

I meget haardnakkede og forældede Tilfælde anbefales desuden endnu Spongia og Cotyledon.

### 5. Dienlidelser.

Der er navnlig toende Arter af eiendommelige Betændelser, som hyppigt hemsøge Børns Dine, og som derfor her skulle omtales. Disse ere den

saakaldte Dienbetændelse hos Nyfødte og Dienbetændelse hos Rjertelsyge. Begge ere ikke alene meget hyppige, men have ogsaa altfor ofte meget flemme Følger.

#### a. Dienbetændelse hos Nyfødte.

Ikke sjældent opstaaer der hos den Nyfødte i de første Dage eller Uger, paa Grund af uforfigtig Indvirkning af Lyset, af Støv eller mechanisk Pirring en Dienbetændelse, som viser sig ved Ryskyhed, let Rødme, stærk Ophoven af Dienlaagene og Affondring af tyk Sliim. Strængt at undgaa disse Misligheder og omhyggelig at vaske den udslydte Sliim ud af Vinene med en Svamp, der er dyppet i lunkent Vand, ere Grundbetingelser for Helbredelsen. Ved de første Spor af Sygdommen er det hensigtsmæssigt først at anvende nogle Indgiøter Aconit; affondrer der sig imidlertid allerede en større Mængde Sliim, saa er Ignatia strag Hovedmidlet, men hjælper det ikke i Løbet af nogle Dage, tager man i Stedet derfor Hepar sulph. eller Arsen. Tager Sygdommen imidlertid ikke af, eller forsøges Sliimaffondringen og bliver den materieagtig, saa maa der kaldes Læge da den kan foraarsage en Uklarhed, ja endog saa et Gjennembrud af Hornhinden og derved en Svækkelse eller Tab af Synet for Livstid, saavel som Banstabning af Diet.

#### b. Dienbetændelse hos Rjertelsyge.

Ogsaa denne Betændelse er fortrinsvis eienbommelig for Barnealderen, (især mellem det 2det

og det 12te Aarear) og er overhovedet den hyppigste af alle Diensygdomme. Den hjem søger især Børn, som allerede vise andre Tegn paa Kjertelsyge, saasom Kjertelsvulst og Bylder, Hovedskurn, Udslet i Ansigtet, Øreflod og lignende, og karakteriserer sig isærdeleshed ved en paaafaldende Lysfky, Svulst og sammenklæbende Dienlaag, saavelsom en Tilbøielighed til Dannelsse af Blegner og Pletter paa Hornhinden. Den udvikler sig langsomt og vender ofte tilbage. Hovedmidlet mod den sædvanligste Form af denne Sygdom er Aurum; dog maa dette Middel anvendes i længere Tid. I friske Tilfælde, især hvor der er betydelig Rødme, Svulst og Smerte tilstede, er det hensigtsmæssigt først at anvende nogle Indgiver Aconit eller Belladonna.

Lysfkyheden, som især strag efter en Opvaagnen er det ubehageligste Symptom, fordrer ikke sjældent ganske særdeles Hensyn, da det undertiden næsten er det eneste tilbageblivende Symptom, og undertiden ogsaa gjør en Undersøgelse af Dinene ganske umulig. I de fleste Tilfælde bedres det meget hurtigt ved Belladonna, men isald det indtræder saagodtsom uden synlig Betændelse af Dinene og Dienlaagene, ved Conium. Ikke sjældent hæves dette yderst besværlige Symptom ved *Viola tricolor*.

I en anden, sjældnere Form af Dienbetændelse, i hvilken Smerten, Svulsten og Inflammationen er stærkere, og hvor dens hele Forløb er mere acut, udmærker Mercur, navnlig Mercur sublimatus sig fremfor alle andre Lægemidler. Er Taareaffondbingen meget skarp, saaledes at den gjør Kinderne hudløse, og viser der sig overhovedet Ud-

flet i Ansigtet, paa Hovedet og Ørene, saa er Rhus toxicod. det hensigtsmæssigste Lægemiddel.\*)

Er Sygdommen meget haardnattet eller vender den ofte tilbage, maa der fortrinsviis anbefales Arsen i hyppigere Indgioter. .

I friske Tilfælde er Mercur, Conium og Cannabis de bedste Midler mod Ur, Pletter og Formørkelser af Hornhinden, der hyppig blive tilbage; i meget forældede og fleraarige Tilfælde ere foruden de nævnte, endnu Apis, Sulphur, Calcareo, Hep. sulph., Silicea og Colchicum fornødne.

Imod Bygkorn paa Kanterne af Vienlaagene er Pulsatilla det bedste Middel; bliver der haarde Svulster tilbage, som brænde og affondre klæbrig Slim, saa hjælper Staphysagria, Graphit og Calcareo. Imod hyppig Tilbagevenden af disse Bygkorn anvendes Sulphur eller ogsaa Thuja.

Foruden disse tvende Betændelser er ogsaa Skelen en hyppigt forekommende Abnormitet ved Børnenes Dine. Samme kan deels være medfødt, deels være en slem Vane eller fremkomme ved Efterabelse, men ogsaa tildeels være et Symptom paa en eller anden indvendig Sygdom, især paa en Hjernesygdom eller paa Drm. Fremkommer den som Følge af en Hjernesygdom, saa har den kun Betydning som et Symptom paa en saadan farlig Sygdom,

\*) Franke homöopathiske Læger anbefale Ipecacuanha i lave Dosisninger og jeg har flere Gange benyttet det med udmærket Resultat. Dr. S.

og kan ikke betragtes og behandles alene for sig selv. Ere Ormbesværligheder Årsagen, saa maa de Midler anvendes, som svare til Tilstanden i det Hele, navnlig Belladonna, Hyoscyamus, Spigelia, Cina, Marum verum.

Er den medfødt eller Følge af en Bane, maa man søge ved fortsat Agtpaagivenhed og Tiltale at raade Bod derpaa eller man maa en Tidlang binde noget for det sunde Øie, og bringe det i den rigtige Retning. Skete begge Dine udad, saa hjælper det undertiden at klæbe et sort Plaster paa Næsetippen.

J forældede og betydeligere Tilfælde maa man henvende sig til en Læge, da der i saa Tilfælde ofte kun kan staffles Hjælp ved en Operation.

## 6. Svampe, Trødske.

Denne Sygdom, som hovedsagelig viser sig hos Nyfødte og Battede, bestaaer i, at der dannes sig smaa hvide, skimlede Pletter paa Tungens og Mundens Sliimhinde, og er som oftest Følgen af Ureenlighed, idet der bliver Rester af Mælk, Sukker, Bælling og deslige tilbage i Munden, og ved at gjære og forraadne pirre og angribe de da Sliimhinden. Undertiden foraarsages de ogsaa af slet Fordøielse, især af Mavesyre. Saltald maa den største Reenlighed iagttages og navnlig maa Brugen af Sut aldeles undgaaes; dernæst ville nogle Indgiuter Borax, eller naar Mavesyre har Skylden, Acid. sulphuricum være tilstrækkelige til i nogle Dage at hæve dette Onde. Mercur er kun da det bedste Lægemiddel, naar der, som det



meget hyppigt skeer, følger Diarrhoe af slimet, grønagtig Bestaffenhed med.

Ikke sjældent udvikler der sig af denne funktatarrhalske Betændelse i Mundens Slimhinde en virkelig Stjorbug, om hvilken der allerede er talt under Sygdomme i Munden. Denne giver sig strax tilkjende ved dens eiendommelige raadne Lugt, og finder i Kali chloricum sit bedste Lægemiddel.

Herved maa iagttages, at dette Onde meget let smitter andre Børn ved directe eller indirecte Berørelse, og navnlig overføres ved Kys, Drikkeglas, Kopper, Brystvorter. Det er derfor nødvendigt at have sin Opmærksomhed henvendt derpaa.

## 7. Tandbesvær.

Uagtet der ofte bliver drevet meget Uvæsen med denne Betegnelse og der feilagtig bliver bragt mange Besværligheder i Forbindelse dermed, saa er dog Frembruddet af de første Tænder ikke sjældent forbundet med Smertes, Betændelse i Tandkjødet og andre Tilfælde, som ved Efterladenhed kunne give Anledning til virkelig Livsfare. Det er derfor godt itide, hvor det overhovedet er nødvendigt, at kunne lette Gjennembruddet og at kunne fjerne de sygelige Symptomer.

Efterat Tandkjødet paa det Sted, hvor senere de to mellemste Fortænder komme frem, allerede før har viist sig bredere, ophovnet og hvidagtigt, bliver Munden sædvanlig i 5—6. Maaned heed, og hos Barnet mærkes Uro, Spytslob og Lyft til at føre Alt ind i Munden og bide derpaa. Bliver denne Uro meget stærk, saaledes at Barnet slet ikke er

til at berolige og ikke kan sove, saa er det godt at give nogle Indgiwter Coffea, eller dersom Moderen eller Ammen er vant til at nyde Kaffe, Aconit.

Have Børnene desuden tør Hoste, vise de om Ratten Uro, Tørst, Hebe, Rødme i Huden, Jamren, Stønnen og et kort, støiende Nandedbræt, grøn, hæftet Abning og Sittren eller Trækning i Lemmerne, saa maa man først give Chamomilla og dernæst Belladonna. Herved maa dog gøres opmærksom paa, at Børnene ved den megen Savlen og Spyttten meget let gjenneembløde de Klæder, som bedække Brystet og alene derved fremkalde Forkjølelseshoste og Katarrh; man maa derfor simpelthen lægge et Guttaperchastykke under denne Brystbeklædning, og derved beskytte Børnene for Følgerne af denne Giennemblødning. Den samme Forsigtighed bør man ligeledes anvende ved Trødsfe, Svampe og Stjørbug.

Dersom Diarrhoen bliver voldsom, slimet, grøn og hæftet, saa passer Mercur.

Faaer Barnet Krampe, uden at de anførte Symptomer forinden have viist sig, saa er Ignatia det bedste Middel.

I Tandperioden sove Børnene ofte med halvt aabne Øine, Øieæblet vendt opad, saa at man gennem Øielaagenes Spalte kun seer det Hvide i Øiet, ligeledes viser der sig i deres Sønn et eiendommeligt Smil og lette Trækninger i Ansigtsmusklerne. Imod disse Symptomer, der som oftest ere uden Betydning, kan man give nogle Indgiwter Chamomilla. Dersom Børnene derimod pludselig fare op af Søvn som af Skræk, see sig ængstelig omkring med et vildt Blik og med udvidede Pupiller, ere bange, blive stive, medens Hoved og Hænder

ere brændende hebe, saa er Belladonna det rette Middel.

Derfor der i Tandperioden viser sig røde Pletter eller væbsfende Steber og Blegner i Ansigtet, bør man give Sulphur i nogle Indgivter.

Forstoppelse i Tandperioden maa man have hurtigt og skaffe en regelmæssig daglig Afføring ved Hjælp af Vandklysterer.

Derfor Tænderne vente længe med at bryde igjennem, eller hvis Barnet bliver 9—12 Maanedes gammelt, uden at der paa Tandkjødet viser sig Tegn dertil, medens Fontanellen ovenover Panden slet ikke eller kun meget langsomt formindskes, kan man give en Indgibt Calcareo carb. hver 2den Dag.

#### 8. Ondartet Halsbetændelse, Diphtheritis.

Denne Sygdom, som i en Række af Aar er optraadt epidemisk i Nordamerika og England har ogsaa i de senere Aar indfundet sig i Tydskland, og ved sin Ondartethed krævet mange Offre, og det synes derfor nødvendigt, at den ikke forbigaaes her. Rigtignok har dette Onde i enkelte Tilfælde ogsaa truffet Børn, og kan derfor i snevrere Forstand neppe regnes til Børnesygdommene; dog ere Børn utvivlsomt særdeles disponerede til og truede af den, saa at det er rimeligt og rigtigt at omtale den her.

Sygdommen karakteriserer sig ved en Betændelse i Slimhinden i Svælget, Ganen og Hal-

fen med et eiendommeligt hvidligt, læderagtigt Udsvedningsproduct, som har Tilbøielighed til at blive koldbrandsagtigt og forårsage Døden ved almindelig Svækkelse eller ved Kvælning. Som oftest begynder den som en almindelig Halsbetændelse (Inflammation af Mandlerne) med Smerte og Bæmskelighed ved at synke, snart viser der sig paa den mørkerøde Sliimhinde nogle hvide, hindeagtige Papper, som synes at sidde ganske løse og see ud som om der laa et Stykke tyk Fløde paa Sliimhinden; tillige medfølger der strax fra Begyndelsen en heftig Feber og som oftest megen Mæthed. Falde disse Papper ikke snart af, hvorved de efterlade overfladiske, let helbrekelige Saar, og griber denne Hindebæmskelse om sig, navnlig nedad, saa bliver deres Farve mere smudsig, næsten sortagtig, Smertene og Bæmskelighederne ved at synke forøges, Feberen og Svækkelsen bliver stærkere, Nanden ilde lugtende; ofte bevirker Sygdommen fuldstændig Hæshed og gjør det umuligt at tale og at synke, og Patienten dør enten af Svækkelse eller Læmskelse i Synkeorganerne, eller der indtræder en koldbrandagtig Udelæggelse i de angrebne Dele og successive Kvælning eller typhøs Hændsen. Helbredelsen finder næsten altid meget langsomt Sted, og det er paafaldende, at der meget hyppigt viser sig en temmelig vedvarende Læmskelse i et enkelt eller i alle Lemmer. I enkelte heftige Tilfælde, især hos smaa Børn, forløber Sygdommen saa hurtig, at Døden strax paafølger ved Indtrædelsen af en stærk Svækkelse og en lille, traadagtig Puls i Forbindelse med Ligbleghed som Følge af Svækkelsen, medens der dannes Hinder. I andre Tilfælde begynder Sygdommen aldeles

pludselig med Brækning, heftig Halsmerte, stærkt Feber, Sovesygge, og Tungen lammes; Hindebannelsen følger rask derpaa, og udbreder sig samtibigt over hele Mundhulen og Svælget, lige op til Næsen og ned til Vanddebrætsorganerne. Overhovedet udstrække Membranerne sig undertiden indtil Strubehovedet og Luftrøret og Patienten bærer da under lignende Symptomer som ved Strubehoste (see næste Artikel.)

Bestrivelsen af dette Sygdomsbillede vil allerede tilstrækkeligt vise, at denne Lidelse ikke egner sig til Behandling af Lægmand. Jeg skal derfor kun tilføje Noget om de Midler, som maatte være at anvende i Fald en Læge ikke strax eller maaste slet ikke skulde kunne skaffes tilstede, forat man da ikke skal staa aldeles raadvild eller hjælpeløs. I dens sædvanlige Form kan man ved de første Symptomer, endnu før man kan være vis paa, om det er Diphtheritis, bruge Belladonna som det meest passende Middel. Saasnart imidlertid de mistænkelige Hinder eller andre truende Symptomer vise sig, saa bør man efter min Anbefælselse anvende Merc. sublim. strax og i hyppige Indgiver, (hver 2—3 Time).\*) Kan det ikke standse Sygdommen, eller viser der sig endog stærkt raadden Lugt, skal man strax give Acidum carbolicum (1—2 Draaber af 1.—2. Fortynding i en Theefkefuld Vand hver 2—1— $\frac{1}{2}$  Time) et Middel, som synes at virke godt, saafremt Strubehovedet

---

\*) Mercur cyanatus er meest anbefalet og har givet meget gode Resultater. Jeg anvender det i 12.—15. Fortynding.

og Luftrøret ikke ere angrebne. Ved Angriben af Strubehovedet og Luftrøret giver man Jod eller Brom, ved typhøs Svækkelse Arsen.

Endnu maa jeg med nogle Ord omtale den sædvanlige Cuurmethode ved Anvendelsen af stedlige Utsninger med Helvedssteen, Chlorkali, Chlorjern etc. Jeg troer at have Grund til at holde disse for mere skadelige end nyttige. Noget egentlig Nytte har vel Ingen seet af dem, de fleste Læger bruge dem, fordi andre have brugt dem. Da Diphtheritis sikkerlig ikke er noget localt, men en almindelig Sygdom, saa er det à priori usandsynligt, at Udryddelsen af det stedlige Product, som tilmed er en stor Plage for Patienten, skulde kunne bedre den egentlige Sygdom. Maaskee lod Bortfjernelsen af Membranerne fra Slimhinden, som en ønskværdig midlertidig Lættelse, sig endog i værdsætte ligesaa sikkert og vistnok mere uskadeligt ved hede Vanddampe og Gurglen eller Penslen med varmt Vand eller ved Badninger med Jis. Mange homøopathiske Læger have iagttaget en afgjørende heldig Virkning paa disse Membraner ved Penslinger og Gurglen med fortyndet Alkohol (Viinaand) eller Rødvin, og anbefale indtrængende disse. I Forhold til Barnets Alder fortyndes Viinaanden saaledes, at den forarsager en Brænden, men ingen heftig Smerte paa Mundens Slimhinde. Ogsaa skal Indblæsning af fint Svovlpulver i Sygdommens Begyndelse i flere Tilfælde have forhindret dens fulde Udvikling.

## 9. Group, Strubehoste.

Denne af Forældre med Rette meget frygtede Sygdom hjem søger næsten ubelukkende Børn i en Alder af 1 til 8 Aar og navnlig synes fjertelsyge Børn at have særlig Disposition til samme. Fugtigt og koldt Veirlig, men især nordlige og østlige Vinde begunstige dens Fremkomst.

Efter ubetydelige katarrrhalske Symptomer, men undertiden ogsaa uden alle forudgaaende Tegn optræder der som oftest i de første Nattetimer en eiendommelig, tør, ru, gjænde Hoste, som bestaaer af enkelte, heftige Stød, med betydelig Uro, Angst, Hæshed og med større eller mindre Smerter i Strubehovedet. Sædvanlig falder den Syge efter det første Anfald atter i Søvn, af hvilken han imidlertid snart atter vækkes ved et endnu heftigere Anfald; Hosten bliver da mere huul, skratende, mere klangløs, efter ethvert Hostestød følger et kort, hvislende eller pibende Aandebdrag og Stemmen bliver aldeles hæs, ru og uden Klang. Imellem Hosteanfaldene hører man ved hvert Aandebdrag en Piben eller Saven i Lustrøret. Undertiden er Hosten forbunden med en frugtesløs Anstrængelse for at tvinge eller brække Noget op fra Lustrøret, men for det meste finder der ingen Opspytning Sted, og først senere opkastet der undertiden slimede Masser og endelig mindre eller større Stumper af en fast, ofte rørformig Materie. Aandebdrætsbesværlighederne forøges mere og mere, Barnet sætter sig ængstelig overende, klamrer sig fast, griber efter Struben og bøjer Hovedet bagover. Afstortes Sygdommen ikke i rette Tid med Lægemidler, blive Kvælningssanfaldene hyppigere og stærkere,

man mærker tydeligt, at en Forhindring standser Luften i Strubehovedet, Ansigtet bliver oppustet, blaaligt og bedækket med en kold Sved, Lemmerne blive kolde, Pulsen er næsten ikke til at føle, og Patienten kvæles efterhaanden med Tegn paa den skræffeligste Angst. Ofte forsvinder ogsaa Sygdommen tilsyneladende henad Morgenens med Undertagelse af nogen Hoste og Hæshed, og Patienten bedrer sig hurtigt i Løbet af Dagen, medens Anfaldene i Løbet af den næste Nat vende tilbage og som oftest i heftigere Grad. I enkelte sjældne Tilfælde kan Døden ogsaa indtræde langsommere og mindre voldsomt derved, at Lunge-, Hjerter- eller Hjernebetændelse træde til.

Saa farlig end denne Sygdom er, lykkes det dog næsten altid, ved Anvendelsen af henfigtsvarende homøopathiske Lægemidler, at helbrede den fuldstændig i kort Tid, dog kommer det i denne Sygdom fremfor i alle andre an paa at gribe ind i rette Tid, og ikke at lade Sygdommen udvikle sig til dens Hødepunkt. Da Sygdommen udvikler sig saa hurtigt, er Muligheden af Redning ofte afhængig af Timer, og det kan derfor ikke noksom indprentes Forældre, aldrig at behandle en Katarrh hos deres Børn, som er forbunden med Hæshed og en usædvanlig Tone i Hosten, med Ligegyldighed og Efterladenhed. Talrige Erfaringer har i Spongia fundet et Middel mod denne Sygdom, som har staaet sin Prøve, og som, anvendt i rette Tid og i passende Indgift, kun yderst sjældent har svigtet. Saa snart derfor de ovennævnte Symptomer vise sig, maa man ikke forsømme at anvende det. For at det kan virke saa hurtigt og kraftigt som muligt, maa man anvende en for-



holdsviis stærkt Indgiwt, 1—2 Draaber af 1.—2. Fortynding efter Patientens Alder, og gjentage denne Indgiwt hver 2—1 Time, ja i Tilfælde, hvor Sygdommen allerede er fremskreden, eller i meget heftige Tilfælde hver  $\frac{1}{2}$  eller  $\frac{1}{4}$  Time. Den energiske og i visse Tilfælde konsekvente Anvendelse af Spongia i rette Tid har allerede i saa uendeligt mange Tilfælde havt den mest velsignelsesrige og overraskende Virkning i denne med Rette frygtede Sygdom, at Homöopathiens Fortrin i Modsatning til den sædvanlige Behandling med Igler, Salver, Trækplastre etc., alene derved maa være tilstrækkelig bevist, og netop en saa farlig Sygdoms sikke og hurtige Helbredelse har tilført Homöopathien talrige Tilhængere og Venner. Ere Symptomerne ved Strubehoste stærkt Hebe, rødt Ansigt og stærkt Feber, eller optræder denne samtidig med Næslinger, Røblinger eller Skarlagensfeber, saa er det nødvendigt, før Brugen af Spongia at give en Indgiwt Aconit 1—2 af Draaber 2den Fortynding eller fremdeles at give dette stiftetvis med Spongia. I Tilfælde, som optræde meget heftigt og farligt, med stærk Tilbøielighed til Dannelse af faste, rørformige Udsvedningsprodukter i Strubehovedet og Luftrøret, saavel som i alle Tilfælde, hvori Sygdommen er skreden videre frem, maa man istedetfor Spongia vælge Jod i 2.—3. Fortynding. Dette Lægemiddel er nøie beslægtet med Spongia men virker endnu mere hurtigt og energisk.

Har dette Middel saa overvundet Faren for Kvælning, formindsket Hosten og Hæshedens og befriet Barnet fra al Smerte og Uro, maa man dog ikke lade Barnet forlade Sengen i de første

24 Timer og i denne Tid fremdeles give Spongia hver 3—4 Time, indtil Hæsheden er aldeles forsvunden og Hosten atter har antaget en aldeles fataralst Character. Skulde der vise sig fornøiede Anfald i Løbet af den paafølgende Nat, saa maa Medicinen atter gives med kortere Mellemrum.

Viser der sig i Anfaldet megen Tilbøielighed til at kaste op, og lyder det, som om der var samlet megen Slim i Halsen, er det hensigtsmæssigt, ofte at lade Patienten drikke nogle Mundfulde heft Suffervand, hvorved Slimen meget snart vil være ophøstet. Ligeledes er det hensigtsmæssigt at lægge varmt Grødomslag paa Strubehovedet, kun maa samme ikke være for svært eller voluminøst, da det i saa Fald kun vilde forøge Uroen og Aandedrætsbesværligheden. I Fald Behandlingen har været meget efterladende, saa Aandedrættet næsten er umuliggjort ved Ansamling af Slim, og Kvælning maa befrygtes ved den mechaniske Lukning af Luftrøret og Strubehovedet, er det, for at forskaffe homøopatiste Lægemidler Tid til at virke, undertiden nødvendigt at anvende et simpelt Brækmiddel, for ved denne mechaniske Brækning for en Tid at fjerne Tilstopningen i Luftrøret, og derpaa ved Anvendelsen af det homøopatiste Lægemiddel at fjerne Tilbagevenden af disse livsfarlige Symptomer. For at opnaa dette Diemed opløser man 1—2 Gr. af Tartarus emeticus (Brækvinsten) i 1 Unze Suffervand, og giver Patienten en theefuld ad Gangen deraf, indtil der er rigelig Brækning.

Bliver nu ved denne Fremgangsmaade Hosten lettere (om end hyppigere) og Aandedrættet kun besværet af den løse Slim i Luftrøret, saa anvender

man Heparsulphuris i 2. Rivning 1—2 Gram, et Middel, som selv maa foretrækkes fremfor Spongia, naar der strax fra Begyndelsen er megen Slimrallen tilstede, naar Hosten er hyppig, løs og fugtig, og der kun er lidt Aandedrætsbesværighed og ringe Uro.

Luftrørsoperationen (Tracheotomie) har indtil nu givet saa ugunstige Resultater, at den næsten kun fortjener at gøres for en let og hurtig Døds Skylb, rigtignok bliver denne Operation kun foretaget i det yderste Dieblis og i aldeles fortvivlede Tilfælde.

## 10. Righoste.

Denne eiendommelige Bryst-Katarrh angriber meest Børn, dog forstaanes Børne ikke altid for samme, ligesom den ogsaa optræder epidemisk, og da upaatvovelig (ligesom enhver Katarrh) kan blive smitsom. Sædvanligt begynder den som en almindelig Hoste og Snue; men snart viser Hosten sig mere i Anfald, den bestaaer i flere korte, rystende Udaandinger (Expirationer) i Stød uden nogen fuldkommen Indaandning, hvorpaa der pludselig følger een dyb, pibende og hivende Indaandning, og saaledes fremdeles. Et saadant Hosteanfald varer ofte flere Minutter og gjentager sig i Forhold til Sygdommens Heflighed i Pauser af 1—4—8 Timer; i Pauserne spores Sygdommen saagodtform aldrig. Tre Anfaldene heftige, saa indfinder der sig kort før samme Uro og Uengstelighed, Barnet trykker Hænderne og Hovedet imod et eller andet, bøier Hovedet fremad og synes nær ved at kvæles, medens Ansigtet er

mørkerødt, sædvanligt ender Anfaldet med Opkastning af Sliim eller Mad. Sygdommens Forløb er som oftest meget langsomt, fra 3—12 Uger, seilagtig Behandling kan let fremkalde Lunge- eller Luftrørsbetændelse, hvorved Sygdommen ikke sjældent kan blive dødelig.

I det første Stadium, hvor der endnu ikke viser sig krampagtige Høsteanfald, maa Behandlingen være som ved en almindelig Høste. Kun naar der viser sig enkelte Symptomer, eller naar en almindelig Udbredelse af Righøste begrunder Mistanke om dens snarlige Udvikling, tør det være tilraadeligt, at søge dens fuldkomne Udbrud forhindret ved Anvendelse af de specifikke Righøstemidler. Er Righøsten fuldkommen udviklet, lykkes det kun yderst sjældent at helbrede den hurtigt, men ved Anvendelse af passende Lægemidler vil den altid betydelig forlænges, og Anfaldene gøres mildere og faresfri. Hovedmidlerne ere Belladonna, Veratrum, Ipecacuanha, Cuprum, China, Drosera, Sambucus og Bryonia.

Belladonna passer i de fleste Tilfælde, hvor der er en heftig, gjænde, tør Krampehøste tilstede, medens der kun affondres lidt eller slet ingen Sliim, Ganen og Halsen ere røde, Synkebesvær, Ansigtet og Vinene ere røde og der er Tegn tilstede paa Hjernelidelse, Congestion og Sovesyge.

Ved Anvendelse af dette Middel 2—4 Gange om Dagen ville i de for samme passende Tilfælde Anfaldene ikke alene meget snart formildes, men den hele Sygdom være fuldstændig helbreddet i Løbet af 14 Dage.

Ved meget heftig, kvælende Høste og blaaligt

Ansiget, Næseblod og Opkastning af Mad, er *Ipecacuanha* bedst; *Veratrum* derimod ved hyppig Opkastning, blegt, indfaldent Ansigt med kold Sved og tydelige Tegn paa Uro med Engstelighed før Høsteanfaldet, ved Tørst og Kulde, samt Afgang af Urin under Hosten.

*Cina* hjælper, naar Børnene under Hosten blive stive, og der efter samme gaaer en klukkende Lyd gennem dem fra Halsen til Underlivet, ligeledes naar der indfinder sig stærk Sult efter Opkastningen, medens Børnene see blege ud og faae Rande om Øinene, naar de bore sig stærkt i Næsen og overhovedet have Drumbesværligheder.

*Drosera* passer bedre ved lettere Tilfælde med stærk Sliimaffondring, Hæshed og pibende rallende Aandedræt, *Cuprum* derimod mod en høiere Grad af denne Sygdom, naar Aandedrættet under Hosten ganske udebliver, naar der indtræder Stivhed eller Træninger i Legemet, naar Patienten kun langsomt kommer til sig selv efter længere Tids Forløb, og der foruden Hosten lader sig høre Snorken og Rallen af Sliim i Brystet.

*Sambucus* passer mod løs Sliimhøste med Piben i Brystet, hyppig Opkastning med blivende Aandebesvær, let Oppusten af Ansigtet, rigelig Urinafgang og gjentagen Trængen til Vandladning.

Ved Righosteanfald, som især om Natten ere hyppige, passer *Mezereum* og *Conium*.

Optræder Hosten især efterat Barnet har spist og druffet, og da med Opkastning, saa hjælper ikke sjældent *Bryonia*. Ved smertefri, deigagtig Svulst i Ansigtet eller ogsaa i Lemmerne, som undertiden indtræder efter heftige Anfald, gives *Rhus tox.* eller *Kali carbonicum*, *Arsen*,

**Digitalis.** Som oftest vil dog denne Svulst forsvinde af sig selv, saasnart Hosteanfaldene bedres.

Tillige maa det under Sygdommen strengt overholdes, at Patienten saavidt muligt opholder sig i en eensartet Lufttemperatur, for at der ikke skal opstaa nogen virkelig Fare ved en tiltrædende Lungebetændelse. Patienten maa derfor helst holde sig inden Døre og kun gaa ud i varmt mildt Veir. Ogsaa er det tilraadeligt at give letfordøielig men nærende Kost, og at denne, især hvor der er Tilbøielighed til Opkastning, gives i meget smaa Portioner, men desto oftere.

## 11. Brystkrampe hos Børn (Asthma Millari).

Denne Sygdom har ofte megen Lighed med Strubehoste, men adskiller sig hovedsagelig fra samme derved, at alle betændelsesagtige Strubehoved-Symptomer aldeles mangle, og at Anfaldene optræde uden nogensomhelst forangaaende Symptomer. Børnene vaagne som oftest op af en aldeles rolig Søvn med fuldstændig Kvælningsskrampe, som ikke er ledsaget af nogen, eller ialtsald kun af en ringe, tør, ru Hoste, men derimod af et savende Andedbræt, ingen Smerte i Strubehovedet, men ofte en sammensnørende Fornemmelse i den øverste Deel af Brystet. Medens der om Dagen ikke er det mindste Sygdomssymptom at opbage den følgende Dag, vender et nyt, ofte stærkere Anfald som oftest tilbage den næste Nat. Lykkes det ikke at hæve denne Sygdom, indtræder Døden under selve Anfaldet ved Kvælning.

Lægemidlerne mod denne Sygdom ere Sambucus nig., Ipecacuanha og Moschus. Ipecacuanha fortjener Fortrinet, naar Asthmaen er ledsaget af en eiendommelig Trængen og Pressen af den indaandede Luft imod Strubehovedet, som om der sad et fremmed Legeme i dette, eller som om det blev krampagtigt sammensnøret, hvorved Luften bliver udstøbt med en skrigende Tone, medens Indaaendingen er aldeles fri, desuden kold Sved, indfaldent, ængsteligt Ansigtsubtryk, gjentagen Urintrang og ubetydelig Afgang af bleg Urin.

Sambucus anvendes, naar Krampen om Natten vækker Barnet, naar det ikke har Hoste, derimod almindelig tør Hæde uden Tørst, blaaligt og ophovnet Ansigt, blaalige Hænder og Underarme, stærke Bevægelser med Armene, lille, standsende Puls, meget hurtigt, pibende Mandedbræt.

Moschus har viist sig hjælpsomt, naar der pludselig indtræder en Fornemmelse foroven i Struben som af Svovldamp med Sammensnøring af Luftrøret og krampagtige Bevægelser og Trækninger i Arme og Been eller krampagtig Stivhed i Legemet.

## 12. Drumbesværligheder.

Mange Børn, ja endogsaa mange Vorne, have Orme i deres Indvolde (Spring- eller Spolorme); men de volde intet eller ialfald kun meget ringe Besvær og vise sig kun Lid efter anden i Nabningen. Kun naar Ormene formere sig stærkt eller naar de pirres ved en sygelig Bestaffenhed af Tarmkanalen eller ved en

overdreven Pirrelighed i Tarmenes Slimhinde, fremkommer bekjendte Besværligheder og sygelige Symptomer, som imidlertid ibetmindste for en Deel ere en Følge af en almindelig Sygdom og ikke alene en mekanisk Pirring af Ormene. Overhovedet maa det ikke lades ude af Betragtning, at uagtet alle Indvoldsorme kun kunne komme udefra ind i Menneskets Mave og Tarme som Eg, Overgangsdyr, Moderdyr etc., saa maa vedkommende Mave dog vistnok være særlig gunstig disponeret for at kunne udvikle, huse og mangfoldiggjøre disse Dyr. Dette alene forklarer blandt Andet, at nogle Børn stadig have Orm, medens Andre under samme Forhold ikke kende til samme. Man har ogsaa gjort den Erfaring, at de Børn, som spise meget Brød, Kage, Bælling, Meelspiser, Kartofler og Mælk, som blive holdte meget varme og som have ringe legemlig Bevægelse, lide meget af Orm og Ormbesværligheder, og disse Omstændigheder maa derfor ikke oversees ved Behandlingen af dette Onde. At bræbe og fordrive Ormene er saaledes ikke tilstrækkeligt til at læge disse Besværligheder radicalt og vedblivende, men den eieneommelige Disposition, som befordrer Ormedannelsen og holder den igang, maa hæves. Og dette finder lettest Sted ved Anvendelsen af en passende Diæt og de i det Følgende nævnte homöopathiske Lægemidler.

De Besværligheder, som fremkomme ved Springorme (Dryurer), ere næsten altid af mekanisk Natur; disse Orme opholde sig nemlig for detmeste i Tyndtarmen og foranledige da til visse Tider en utaalelig Kløe og Kriblen i Endetarmen saaledes at sømfindtlige Børn undertiden, og navnlig om Natten, ere ude af sig selv. Hos



Pigebørn krybe de ikke sjældent ud af Bagdelen og ind i Rjønndelene og foranledige ved den opstaaende Kløe ogsaa let hvidt Flob, ligesom der ved Kløen ogsaa let gives Anledning til Onani (Selvbesmittelse). Da disse Orme næsten altid opholde sig i Endetarmen, kunne de temmelig sikkert bortfjernes ved Anvendelsen af Klysterer; dertil bruger man et let Afkog af Løg. — Men da disse Klysterer ere ubehagelige paa Grund af deres stærke Lugt, anbefaler jeg nu dertil et let Afkog af Valnødderblade. Ja, det er endogsaa en Kjendsgjerning, at rene Koldt-vandsklysterer næsten ere ligesaa virksomme, kun maa de ofte gjentages (2 Gange daglig i 2—4 Uger), lykkes det ikke at fordrive disse Springorme ved Klysterer, og bliver der navnlig Kløen og Birren tilbage, saa maa man anvende indvendige Midler. Ignatia er Hovedmidlet, og som oftest ere nogle Indgioter istand til, ganske eller dog for længere Tid at bringe Kløen til at forsvinde. Fremkommer Kløen meest om Natten med feberagtig Uro, maa Aconit anvendes. I langvarige Tilfælde, hvor Kløen vender tilbage i regelmæssige Mellemrum, som oftest ved Nymaane eller Fuldmaane, er det hensigtsmæssigt at give nogle Indgioter Sulphur. Endnu skal nævnes som virksomme Midler mod Springorme: Calcareæ, Ferrum, Marum og Mercur.

De Besværligheder, som forarsages af Spolorme (Askarider), ere mangfoldige, de opholde sig især i Tyndtarmen, ofte i store Mængder, og trænge derfra ikke sjældent ind i Maven og Spiserøret. Almindelige Symptomer ere: blegt Ansigt med blaa Rande om Pinene; pludselig opstaaende og ligesaa hurtig forsvindende Albebefindende og Smerte i Underlivet,

Band i Munden eller Opkastning, Modbydelighed imod visse Spiser, navnlig mod alt Sædt; Kløe og hyppig Boren med Fingeren i Næsen etc. Dog bliver Diagnosen først utvivlsom naar Orme vise sig i Abningen. Ikke sjældent fremkomme ogsaa Symptomer, som tilsyneladende have en meget farlig Character, saasom Stelen, Tilbøielighed til at sove, Krampe. Hovedmidlerne mod disse Besværligheder ere; Cina, Mercur, Sabadilla, Spigelia, Aconit, Sulphur og Calcare.

Cina er sædvanlig det bedste Middel hos Børn med tyk Mave, blegt Ansigt, udvidede Pupiller, hyppig Boren i Næsen, Ulvehunger afvejlende med Appetitløshed, mild Opkastning, Urinflod i Sengen, urolig Søvn. Har Barnet dertil stærk Uro eller Feber, saa er det rigtigt, forud at give en Indgiwt Aconit, og naar der er Trængen til Abning tilstede eller der indfinder sig gjentagne smaa, slimede Udtømmelser, maa der anvendes Mercur i nogle Indgiwter. Spigelia hjælper ofte ved gjentagne pludselige Mavesmerter, Ulvehunger, periodisk Hovedpine, Urinflod i Sengen, udvidede Pupiller eller Stelen, Sliimafgang fra Endetarmen uden Abning, medens Sabadilla ogsaa passer i meget besværlige Tilfælde, hvor der opkastes Spolorme, eller hvor der idetmindste indfinder sig en Følelse af Ildebefindende og Kvalme med en Fornemmelse af, at der er et fremmed Legeme i Halsen.

Er Ormebesværlighederne forbundne med stor Nervepirring, Hjernetilsfælde, Frygtsomhed og Sammenfryn i Halsen i Søvn, saa passer Belladonna eller Lachesis.

Iøvrigt veed man med Sikkerhed, at Spol-

ormene hovedsagelig næres ved amylumholdige (stivelseholdige) Spiser, altsaa trives bedst hos Børn, som nyde megen Bælling og meget Brød, hvorfor der maa tages Hensyn hertil ved Diæten.

Tilbøielighed til Ormebannelse, samt den almindelige, særlig dertil meest disponerede Legemsconstitution, modarbeides i mange Tilfælde sikkrest og varigst med Calcarea i sjældne Indgiver, undertiden skifteviis med Sulphur.

Spad det nu angaaer, directe at fordrive og dræbe disse Orme, saa er dette rigtignok i mange Tilfælde ligesrem nødvendigt. Thi uagtet netop disse to Slags Indvoldsorme i og for sig ere af temmelig ustyldig Natur, saa forekommer der dog Tilfælde, i hvilke Spolormene samle sig i saa utrolige Mængder, at Tarmen aldeles opfyldes deraf og næsten bliver impassabel og at der heraf kan fremkaldes betydelige Besværligheder. Paa den anden Side findes der ikke ganske sjældent saa ømsindtlige Børn, at de ved Ormenes Pirring, navnlig ved den Krablen og Kløe, som afstedkommes ved de smaa Springorme, blive ganske ude af sig selv og faae Krampe eller Hjernetilfælde. De sidstnævnte, Dyrurer, lade sig næsten altid let udrydde ved de ovenomtalte Klysterer og fordrives for længere Tid, medens Spolormene bedst fordrives ved en Latwærg, som laves af Ormesrø (Cina) og Sirop. Ormesrøet, som det rigtignok er vanskeligt at faae Børn til at tage paa Grund af dets affkyelige Smag, kan vel bedst loffes ned i Form af Santonin (det virksomme Stof i Ormesrø) der faaes i Apothekerne tilberedt i Suffer eller Chokolade under Navnet „Ormesager“. Imidlertid er

For drivelsen af Spolorme ikke tilraadelig uden at man benytter en Læges Raad, navnlig med Hensyn til Bestemmelse af Størrelsen af den Dosis etc., som skal anvendes.

De Besværligheder, som Bændelormen kan foranledige, ere omtalte under Drmbesværligheder ved Sygdommene i 2det Affnit.

### 13. Diarrhoe og Svindstot (Atrophi).

Ved Diarrhoe, der hos Pattebørn er saa hyppig, maa man fremfor Alt undersøge, om denne ikke skulde være en Følge af uhenfigtsmæssig Næring. Først efter Undersøgelse og Regulering af denne Omstændighed kan man tænke paa de meest passende Lægemidler. Iblandt disse ere de meest virksomme: Chamomilla, Ipecacuanha, Mercur, Rheum, Calcareia, Arsen, Secale corn., Colchicum, Argentum nitricum, hvis specielle Symptomer allerede ere nævnte under Diarrhoe i 2det Affnit.

Hvor et Barn i længere Tid har haft Diarrhoe, med Brækning og andre Symptomer paa en forstyrret Fordøjelse, faaer det ofte den saakaldte Atrophi (Tæring), en Lidelse, som netop forarsages ved Organismens vedvarende mangelfulde Ernæring, og som characteriserer sig ved en stedse tiltagende Afmagring, Svækkelse, Sønsløshed, et indfaldent, oldingeagtigt Ansigt, fremtrædende, haardt Underliv og Tærefeber. Et ganste eiendommeligt Tegn bemærker man paa slige atrophiske Børns Baghoved. Baghovedets Been skyder sig nemlig ind under Tindingebenene, saaledes at der danner sig et Slags Trin. Denne Formindstelse af Beenhulen betinges af et Svund af Hjernemassen.

I dette Tilfælde er det naturligtvis Hovedopgaven at foreskrive en hensigtsmæssig Kost, og i mange Tilfælde er en sund Amme det eneste Redningsmiddel for slige Børn, saavel naar Barnet allerede er vænnet fra, som ogsaa naar det er blevet kunstigt opammet. Altsaa paa denne Maade og ved fortsatte Indgioter af *Calcarea acetica* kan det lykkes at redde og efterhaanden atter at styrke saadanne Børn. Viser *Calcarea* sig uden Virkning eller er der allerede indtraadt en høi Grad af Afmagring og Fordøielssvækkelse, saa kan Arsen endnu undertiden bringe Hjælp. Desuden passer *Calcarea* fortrinligt mod hvide, slimede, og Arsen mod mørke, stinkende Udtømmelser. Viser der sig Krampe hos et saabant Barn, der er en Følge af Hjernens utilstrækkelige Ernæring paa Grund af vandagtigt og mangelfuldt Blod, saa kan Bedring kun ventes af China og Phosphor. Undertiden hjemssøges forøvrigt ogsaa sunde Børn af den Slags Krampe som Følge af et kortvarigt men meget heftigt Tilfælde af Diarrhoe eller Brækning; i saa Tilfælde er ligeledes det store Tab, som Organismen lider af flydende Blodbestanddele, Aarsagen til Krampen, og China det fortrinligste Lægemiddel.

Hos ældre Børn er Diarrhoen sædvanlig en Følge af en Mavefordærvelse eller Overfyldning eller af en Forkjølelse, og er da et mindre farligt Tilfælde, til hvis Behandling de under Diarrhoe anførte Lægemidler ere tilstrækkelige.

## 14. Urinflod.

Denne Besværlighed, som langt hyppigere forekommer hos Drengene end hos Piger, kan naturligvis kun betragtes som en Sygelighed hos de Børn, som allerede have vænnet sig til at udtømme Urinen til bestemte Tider; den er sædvanligvis ikke afhængig af en organisk Sygdom i Urinorganerne eller af en Forstyrrelse i Rygmarven, thi i saa Tilfælde vil den vise sig saavel om Dagen som om Natten, men her viser den uvilkaarlige Urinafgang sig ifkun i den 1ste eller 2den Sovetime medens Barnet godt kan tilbageholde Urinen hele Dagen og ogsaa Natten.

Istedetfor alle unyttige og ufortjente Straffe bør man bruge følgende Fremgangsmaade; Barnet bliver bragt tilfængs som sædvanligt, efterat det kort forinden har ladet Vandet; man lader det sove ind. Omtrent 3 Kvarteer eller en Time derefter vækker man det, lader det staa op og lade sit Vand. Næste Nat venter man 5 Minutter længere med at vække det og saaledes vedbliver man den ene Nat efter den anden, indtil man kan lade den første Søn vedvare 2 à 3 Timer. Derpaa vækker man det ikke mere, eller i det høieste een Gang i Løbet af Natten. Forøvrigt maa man drage Omhu for, at Patienten ikke faaer noget at drikke i flere Timer før Sengetid.

Samtidig, eller ialtfald i det Tilfælde, at denne Methode ikke ganske opfylder Hensigten, giver man Pulsatilla eller Belladonna, Sulphur, Cina. Ved en virkelig Svækkelse i den Muskel,

som luffer for Blæren (hvilket da ogsaa viser sig ved ufrivillig Urinafgang om Dagen), maa Nux vomica anbefales.

Et Middel, som i alle Tilfælde af Urinflod meget maa anbefales, naar denne ikke er afhængig af Drumbesværligheder, er Plantago.

Med Hensyn til andre Urinbesværligheder er det Fornødne anført i 2det Udsnit af Bogen.

### 15. Mæslinger.

Denne smitsomme, men som oftest godartede Sygdom begynder stedsse med Feber og katarrhalste Symptomer, især er Hosten meget tør med Skildren, Kradsen og Brænden i Halsen, sædvanlig ere ogsaa Vinene angrebne, røde og smfindtlige for Lysen. Først efter en eller flere Dages Forløb viser Udslettet sig paa Huden, dette bestaaer af røde, uregelmæssige, noget ophøiede Pletter, som sædvanlig bliver staaende i 3—5 Dage. Efter 8—14 Dage følger en flidagtig Afstølning af Huden, som i nogle Tilfælde kan være høist ubetydelig.

Hovedmidlerne i denne Sygdom ere Pulsatilla og Aconit; i de fleste Tilfælde ville nogle Indgioter Pulsatilla i de første Dage være tilstrækkelige til at give den hele Sygdom et mildt og gunstigt Forløb. Er Feberen meget stærk, navnlig før Udslettet bryder ud, maa Aconit foretrækkes, hvortil kan føies nogle Indgioter Belladonna, naar der er betydeligere Hjernetilfælde med Vildelser tilstede og Lysstykeden og Dienbetændelsen tiltager.

Lader Udslettet længe vente paa sig, saa be-

fordrer nogle Indgioter Sulphur dets Frembrud, eller ved samtidig Brystbeflemmelse Ipecacuanha.

Hosten kræver undertiden, naar den er meget heftig, tør og frampagtig, Hyoscyamus eller Ipecacuanha, og naar den stiger til Lungebetændelse, Aconit og Bryonia. Forsømt Mæslingehoste kan ikke sjelden gaa over til Lungevindsot.

Viser der sig slimede Diarrhoer, saa er Pulsatilla, Mercur og China de bedste Midler.

## 16. Rødblinger.

Hudpletterne ved denne Sygdom ligne snart meest Mæslings: snart Skarlagens-Udslet, og det samme finder Sted med de ledsagende Symptomer, kun saaledes, at naar Udslettet ligner Skarlagensfeberens, saa have Symptomerne meest fælles med Mæslinger (Hoste og Katarrh) og omvendt, dog stedse i ringere Grad. Sygdommen behøver overhovedet sjelden Lægehjælp; kun hvis Feberen skulde være heftig, ere nogle Indgioter Aconit paa sin Plads, og ved Betændelse i Halsen Belladonna. Ved megen Uro, Ømfindtlighed og Sønsløshed er ofte Coffea meest virksomt.

## 17. Skarlagensfeber og Frislinger.

Det er hverken muligt eller nødvendigt, strængt at kunne skjelne mellem disse to Slags Sygdomme, da de ved en Epidemi ofte begge vise sig, ligesom de ikke sjældent optræde paa engang



blandede hos samme Person, og overhovedet de dem ledsagende Symptomer og de Sygdomme, som følge af samme pleie at være eens for begge Ogsaa med Hensyn til Behandlingen er Forskjellen ikke af nogen væsentlig Nytte, undtagen at det med Hensyn til Bestyttelsen for Smitte (Preservation) turde være mere hensigtsmæssigt mod den glatte Skarlagensfeber at anvende Belladonna, og mod Skarlagensfrislinger Aconit.

Hudubsløttet bestaaer saaledes i denne Sygdom enten i en storplet, glat, ilbsfarvet Hudrødme, som forsvinder ved et Tryk med Fingerspidserne, eller i purpurrøde, med mørkerøde Frieselforn besatte Pletter, eller ogsaa i en Blanding af begge Dele. Med samme er der imidlertid altid, sædvanlig under eller forinden Udsløttets Udbrud, forbundet en større eller mindre heftig Betændelse (Rødme, Svulst og Smerte) af Ganen og Halsen, som undertiden ogsaa foranlediger en Ophvoen af de ydre Halskjertler.

Men Udsløttet er i enkelte Tilfælde meget svagt og flygtigt, undertiden kun bemærkeligt i faa Timer, medens det i andre Tilfælde kan være meget intensivt, og vedvare uforandret i 3—5 Dage. Overhovedet er Skarlagensfeberen en meget foranderlig og lumsk Sygdom, som fordrer en fortsat Opmærksomhed og Pleie i Løbet af 4—5 Uger; eensartet Temperatur, Forebyggelse af Træd og Forkjølelse er rigtignok en Hovedsag, men det buer ingenlunde at udsætte Patienten for en saa stærk Varme, som det tidligere var almindeligt; 14 à 15° Reaumur er det Høieste. Kun vil det være hensigtsmæssigt, ikke at lade dem forlade Sengen for tidligt (sjelvent før efter 3—4 Ugers Forløb).

Ved Mæslinger kan Temperaturen være endnu lavere, og saa kan man da lade Patienterne forlade Sengen længe før (efter 5—10 Dage), naar ikke katarrhalske eller betændelsesagtige Tilstande i Luftrørgrenene eller Lungerne nødvendiggjør særdeles Forsigtighed.

Derimod er Skarlagensfeber paa Grund af Symptomernes Mangfoldighed, og de Sygdomme, den har i sit Følge, ofte saa ondartet og farlig, og dens Behandling som oftest saa vanskelig og compliceret, at der her kun kan gives nogle saa og almindelige Antydninger og Regler for dens mere normale Forløb. Hovedmidlet er sædvanligvis Belladonna og dette er meget ofte istand til alene at gjøre den regelmæssig og godmodig; ickun i Tilfælde, hvor Feberen og den almindelige Hede er meget stærk, og hvor den trods Belladonna vedbliver, er det rigtigt, imellem at give nogle Indgioter Aconit. Viser der sig desuden stærk Uro og Svønløshed, og tøver Udslettet med at vise sig, saa er for det meste Coffea og ved meget stærk Uro Sulphur, at anbefale.

Udvikler Halsbetændelsen sig i en overordentlig Grad, anbefales næst Belladonna især Mercur, Lachesis og Baryt; truer den med at blive koldbrandsagtig, Arsen og Acid muriaticum. Imod Ørefjertelbetændelse virker Bellad., Hepar sulph., Mercur og Rhus tox.

Ved Sovesygge, Bedøvelse og Hjernebetændelse passe Belladonna og Opium bedst; naar Udslettet træder tilbage Bryonia, Ipec., Phosph. eller Sulph.

Imod Bandfot, som ofte følger efter, ere Hovedmidlerne Hep. sulph. og Merc. sol., for-

uden disse endnu Arsen, Colchicum, Helleborus, Lycopod. og Rhus tox., navnlig maa Colchicum og Lycopodium anvendes, naar Urinen ikke alene viser sig sparsomt og uklar, men meget mørk og fortagtig.

Med Hensyn til den Maade hvorpaa Smitte undgaaes ved denne Sygdom er Følgende at bemærke: Overalt, hvor Skarlagensfeber eller Frislinger optræde epidemisk, navnlig naar de vise sig ondartede, bør man give alle Børn, som ikke have gennemgaaet denne Sygdom, ja endog saa Børne, som frygte samme, hver Dag en Jndgiwt Belladonna. Udbryder denne Sygdom i Huset eller endog i Familien, saa skal man give en saadan Jndgiwt 2 Gange daglig. Pattede Børn og Smaabørn maa man hellere give Strøfugler. Græsferer der udelukkende Skarlagensfrislinger, saa bruger man stiftetviis Aconit og Belladonna. Ved denne Fremgangsmaade vil man i de fleste Tilfælde aldeles forhindre Smitte, eller ialtfald give Sygdommen et ualmindelig mildt og godartet Forløb.

### 18. Kopper.

Skalkopper (Vindkopper, Varicellae) behøve næsten aldrig Lægehjælp da de næsten altid forløbe uden Bysymptomer. Kun naar der indtræder Febersymptomer er det hensigtsmæssigt, i Begyndelsen at give nogle Jndgiwter Aconit; medfølger der Hjernetilfælde, Belladonna, og ere Blærrerne meget store og materieholdige, Mercur og Sulphur. Ligesaa lidt udfordres der ved Vaccinationskopper (Kokopper) nogen særegen Behandling.

Ro og Bestyttelse af de vaccinerede Steder er som oftest tilstrækkeligt; i det Højeste kan stærk Feber forbre nogle Indgiuter Aconit og ved Udslet omkring Indpobningsstederne passer Sulphur.

Ligesaa godmodige ere i mange Tilfælde Varioloiderne (de ved Rokoppeindpobningen mildnede Kopper); kun at den forinden eller samtidig med Udbuddet optrædende Feber som oftest fordrer nogle Indgiuter Aconit. Sulphur efter Pustlernes Fremkomst bringe næsten altid disse til hurtigt at modnes og til at læges uden videre Symptomer; indfinder der sig dog betænkkelige Bysymptomer, saa er Behandlingen aldeles som ved de naturlige Kopper.

De virkelige Kopper ere næsten altid ledsagede af en stærk Feber før eller medens Pustlerne bryde frem. I Begyndelsen er Aconit det meest passende Lægemiddel, men i Tilfælde af stærk Uro, Virrelighed og Spønløshed kan det afløses af Coffea, og ved Hjernetilfælde af Belladonna. Tre Kopperne kjendelige paa Huden, saa ere Hovedmidlerne Mercur subl., Tartarus emet., Thuja og Sulphur. I lettere Tilfælde vil Thuja som oftest bringe Sygdommen til hurtigt at forsvinde, og den vil da ingen Ar efterlade eller ialtsald kun ganske ubetydelige; kun naar Inflammationen er stærk og vidt udbredt, bliver det nødvendigt, at anvende nogle Indgiuter Mercur og Sulphur. Viser der sig betydelige Besværligheder i Brystet og Halsen, saa fortjener Tartarus emeticus at foretæffes. Bliver Kopperne smudsige og sorte og Materien ilbelugtende, saa maa Arsen anvendes. Ved

Spyttflod, stor Omfindtlighed i Dinene eller Diarrhoe er Mercur meest at anbefale.

Med Hensyn til Behandlingen af de undertiden tilbageblivende Dienlidelser, maa man sammenligne, hvad der paa det paagjældende Sted er sagt derom.

Jøvrigt maa ingen Moder forsømme, at lade sit Barn vaccinere med Koppelymfe af en samvittighedsfuld Læge i det første Halvaar af dets Liv. Den sidste Tid's Erfaringer med dens heftige Koppeepidemier har ret tydeligt beviist Vaccinationens store Fordeel for Enhver, som ikke forsætlig vil lufte sine Børn derfor. Selv i Tilfælde, hvor der ikke opnaaes fuldkommen Sikkerhed derfor, er et let og farefrit Sygdomstilfælde i al Fald det sikke Resultat.

### 19. Hosteledsbetændelse.

Denne Lidelse træffes ikke sjældent hos Børn, uden at man har kunnet bemærke nogen Grund dertil. Uden at klage over nogen farlig Smerte, begynde de at halte, og at trække det ene Been op; ved Efterladenhed og Anlæg til Rjertelsvagthed kan denne Sygdom naa en meget høi Grad, idet der kan opstaa Betændelse og Boldensstab i Hosteledet; hvoraf der da udvikler sig Beenedder og Stivhed i Ledet, saaledes at Benet vedvarende kan blive for kort og ubrugeligt. Ved det første Spor af denne Lidelse er ofte nogle faa Indgioter Belladonna, som man efter 24—48 Timers Forløb lader efterfølge af nogle Indgioter Mercur, tilstrækkelige til, i Forening

med fuldstændig Ro, aldeles at hæve denne Sygdom uden skadelige Følger. Er Ondet allerede ældre, saa vil kun en Læge være istand til at behandle det hensigtsmæssigt, ligesom det i lettere Tilfælde er tilraadeligt, itide at raadspørge en Sægtindig, for at det ikke skal forverles med et Brud eller en Forvridning.

## 20. Kjerterlsvulster og Kjerterlsyge.

Meget hyppigt forekommer hos Børn Svulst af Kjerterlerne, som undertiden ledsages af heftige Smerter og andre Betændelsessymptomer og gaa over i Forboldning; men undertiden uden nogen som helst, eller ialtfald ubetydelig Smerte forbliver staaende uforandret og efterhaanden forhærdes. Hovedsagelig fremkomme de paa Halsen, i Nakken, ved Ørene, i Armhulningen og i Lyskeegnen. Foruden disse Kjerterlsvulster kan man hos saadanne Børn ogsaa hyppig iagttage andre Lidelser, saasom Dreflod, Udslæt, Skurv i Hovedet, Chronisk Snue etc., og der maa saaledes ved Behandlingen tages Hensyn hertil (hvorum der er talt udførligere nedenfor ved Behandlingen af Kjerterlsyge). Hvad selve Kjerterlsvulsterne angaaer, saa er Hovedmidlet ved friske, smertefulde Tilfælde med Rødme, Smerte og Tilbøielighed til Forboldning (som kjendes paa en tilstedeværende Blødhed) Mercur; kun naar den rosenagtige Rødme og Smerten udbreder sig langt ubover Svulsten, er det hensigtsmæssigt, i Forvejen at give nogle Indgivter Belladonna. Er der gaaet Hul paa Bylben og Materien udtømt uden at den læges, men

den vedblivende bolner, saa maa der, efter nogle Indgivter *Hepar sulphuris*, i længere Tid, og lige indtil den læges og danner *Ur*, bruges *Silicea*.

Mod haarde, smertefrie Kjertelsvulster ere *Baryta muriatica* og *Brom* Hovedmidlerne; men er Ondet meget gammelt, maa man først anvende *Sulphur* og *Calcarea flistevis*. Ved Kjertelforhærdelser i Lyskeegnen maa *Carbo animalis* anvendes, og dersom et Stød eller en Knusning er Anledningen til Svulsten, *Conium*.

Kjertelsyge er hos Børn en Udviklings sygdom og hovedsagelig betinget af en nedarvet Disposition eller ogsaa foranlediget af urigtig og upassende Ernæring. En hensigtsmæssig Behandling af denne overordenlig udbredte Sygdom, som tilmed giver Foranledning til de sorgeligste fremtidige Sygdomme, og ved hvis Behandling Ordningen af Diæten og den hele Levevis høre til de vigtigste Momenter, bør i Reglen kun ledes af en sagkyndig Læge, saa meget mere, som Symptomerne ere ligesaa talrige og afvejlende som haardnakkede og farlige. Derfor skal der her kun gives nogle Antydninger for enkelte Tilfælde.

Foruden Kjertellidelserne og de ovennævnte Symptomer, karakteriseres denne Sygdom især ved en eiendommelig Legemsdannelse, især ved et stort Underliv, tynde og svage Been, opsvulmet Næse og Læber, bleg Hudfarve, saavelsom ved Fordøjelsesbesværligheder, navnlig Tilbøielighed til Diarrhoe, glubende Sult, eiendommelig Lyst til Kridt, Kalk, Kul etc.; saadanne Børn have ligeledes ondt ved at løbe, ligesom overhovedet deres hele Beenbygning er svag og uden Kræfter og viser en vis Tilbøielighed til Beenedder.

Foruden en meget omhyggelig Diæt, som navnlig maa bestaa i let og nærende Kost (Kjød og Bouillon), med streng Afholdelse fra enhver Overlæsning med Brød og Kartofler, og forøvrigt styrkende Midler i Forening med Reenlighed, sund, frisk Luft, Bade og passende Muskeløvelser, ere de virksomste Midler Calcareo, Mercur, Silicea og Sulphur.

Calcareo passer især ved betydelig Svækkelse i Venene, Krumninger i Knoklerne, Vanskelighed ved at løbe, haardt og oppustet Underliv, almindelig Afmagring, Tilbøielighed til Diarrhoe, haarde Kjertelsvulster, langsomt og vanskeligt Tandbrud, ophorret Næse og Læber, magert og rynket Ansigt, stort Hoved med aabne Fontaneller.

Mercur ved Svulst og Forboldning af Kjertlerne, Dreflod, Dienbetændelse, Sturv i Hovedet, Udslæt i Ansigtet, Tilbøielighed til Sved, grøn eller slimet Nafning, kronist Snue, Svulst i Leddene, Beenedder.

Silicea ved Beenedder, Rhachitis, Leddebetændelse, uvilkaarlig Halten, Forboldning af Kjertlerne, stinkende Dre- og Næseflod.

Sulphur især i Behandlingens Begyndelse og ved Hududslæt, Ringorme, Hovedsturv, forældede Kjertelforhærdelser, Dienbetændelser.

Foruden disse 4 Midler udfordres der til Behandlingen af denne symptomrige Sygdom naturligvis endnu andre, saasom Arsen, Baryt., Belladonna, Brom., Hepar sulphuris., Jod, Rhus tox., Staphysagria. Men det vilde føre for vidt, at give udførlige Forrifter for alle enkelte Former og Tilfælde.



## 21. Rhachitis (eng. Syge) og Forkrumninger.

Man antog tidligere, at denne Sygdom kun var en Form af Kjørtelsyge, ved hvilken Sygdomssymptomerne enten slet ikke, eller mindre vise sig i de kjortelagtige og bløde Dele, men derimod isærdeleshed concentrerede sig i Knofterne og Leddene. Nyere Undersøgelser have godtgjort, at dette ikke er Tilfældet; Rhachitis udvikler sig ofte hos Børn, som aldeles ikke ere scrophuløse. Den bestaaer i Forstyrrelse i Udvillingen af Beenmassen, som ved Mangelen paa kalkagtige Bestanddele bliver blød og porøs. Den udvikler sig altid fra sidst i første Leveaar, fordetmeste temmelig acut, først i Baghovedet, senere i Ribbenene og tilsidst i Lemmerne, Bækket og i Rygraden. Dens første Kjendetegn er Hovedsved, bestandig Uro, som tyder paa smertelige Fornemmelser, naar Baghovedet hviler paa Noget, og Tab af Haarene paa Baghovedet fordi dette stadig bliver gnedet og boret ned i Buderne. Slige Børn blive strax rolige, naar man bringer dem i opreist Stilling og befrier Baghovedet for ethvert Tryk. Disse Tegn bør vække Forældrenes Opmærksomhed; en nøiagtigere Undersøgelse og Bedømmelse vil kun være mulig for Lægen. Efterhaanden fremkommer der ogsaa Blødgjørelse og Krumninger af Knofterne og Beenmassen, især i den nederste Deel af Benene; Gangen bliver derved enten umulig eller ialtfald meget besværlig og vakkende. Naar Sygdommen en høiere Grad, da kan den udvikle sig til Opsvulmen og Krumninger af Rygraden, Beenebber etc. Hovedmiblet i denne Sygdom er Calcareo og da

isærdeleshed *Calcare phosphorica*. Ogsaa *Silicea* og *Acid. phosph.*, *Aurum*, *Asa foet.* og *Staphysagria* kunne undertiden yde Hjælp. Fremfor Alt er ogsaa Levertran paa sin Plads, i denne Sygdom. Med Hensyn til Diæt og Ordning af Levemaaden gjælder det samme som er sagt ved Hjertesyge.

Uagtet Forkrumningerne ingenlunde altid ere en Følge af *Rhachitis*; men ogsaa ofte ere en Følge af andre, navnlig ydre og mekaniske Aarsager, kunne de dog passende omtales her. Disse angaa deels Lemmerne, navnlig Fødderne (saasom Pladfod, Klumpfod og Hestefod), deels Rygraden. — De førstnævnte udkræve meget ofte kirurgiske Operationer (Senegjennemskjæring) eller ialtfald Bind og Maskiner. Rygradskrumninger udfordre næst efter Bortfjernelsen af Aarsagen fremfor Alt den hensigtsmæssigste Holdning (som oftest en liggende Stilling), Gymnastik og undertiden Understøttelse ved Snørlov etc., altsammen Midler, om hvis Hensigtsmæssighed kun en duelig Læge kan dømmes. En saadan maa derfor uden Opsættelse raadspørges, saasnart kun den ringeste Afvigelse fra Normen bemærkes, thi Forældrene kunne ikke indtrængende nok gjøres opmærksomme paa, at en Forkrumning kun da kan ventes afhjulpen eller radikalt helbredet, naar den tages i Begyndelsen og ikke er for vidt fremskreden.

## 22. Rampe.

Som allerede bemærket, er Barnealderen overhovedet, især saalænge Barnet faaer Die, paa

Grund af Nervesystemets Virrelighed, overordentlig disponeret til Krampe. Denne kan fremkaldes ved forholdsvis ringe Omstændigheder, saasom Tand- og Ormebesværligheder, Fordøielssbesvær, Stræk og Frygt. Hovedmidlet mod Kramper, som fremkomme før, efter og under Tandperioden er Zincum; det virker imod de fleste Anfald af dette Onde virkeligt specifikt og vidunderligt, kun maa det anvendes i ikke for smaa og efter Omstændighederne i hurtigt paa hinanden følgende Indgiver. I lettere Tilfælde, i hvilke Pattebørn, som Følge af Forkjølelse faae Diarrhoe, Kneb i Maven og Opkastning, megen Uro, vedvarende Samren og Træksninger i Arme og Been med Ansigtsbleghed, halvtluftede eller opad breiede Dine, er imidlertid Chamomilla næsten altid det bedste Middel, og kun naar Kamille-, Fennikel- eller anden Tøce har været brugt, er det tilraadeligt, efter en Indgift Aconit at give flere Indgiver Ipecacuanha. Ere Tandbesværlighederne den aabenbare Anledning til Krampen, og denne kjendes da paa stærk, tør Hæde, Ansigtssvøme og Svøme i Mundhulen tilligemed urolig, ængstelig Svøvn og Opfaren af samme, saa viser Belladonna sig virksomt; hvor Stræk har givet Anledning til Krampen, og Barnet ryster over hele Legemet, sparker med Arme og Been og skriger, ere Opium og Ignatia meget hjælpsomme. Optraeder Krampe hos sygelige og smfindtlige Børn uden slige Foranledninger og Tilfælde, saa er det raadeligt, i Begyndelsen at anvende Coffea, dog er det i saa Fald bedst, snarest muligt at tilkalde en Læge, ligesom ogsaa ved de Krampetilfælde, som hjemløge Pattebørn og Børn efter langvarige og svækkende Diarrhoer eller heftige Bræk-

ninger, og som meget ofte helbredes ved China.

Ere Orme Aarsagen til Krampe, hvilket rigtig nok langt sjældnere er Tilfældet end man sædvanlig antager, saa er Cina Hovedmidlet; dog maa Ormenes Tilstedeværelse være godtgjort ved deres Afgang Tid efter anden og tillige andre Symptomer paa samme forefindes, saasom Ansigtåblegthed, Rande om Vinene, Kløe i Næsen og Endetarmen, Ildebefindende, Vand i Munden etc. Krampe under Strubehoste, Righoste, Lunge- eller Hjernebetændelse ere stedse et Tegn paa Fare, og deres Behandling kan ikke overlades til Lægmand, og saaledes ikke her omtales tilfredsstillende, da den oprindelige Sygdom altid maa tages i Betragtning ved Valget af Lægmidlet.

### 23. Veitsbands.

Om denne Sygdoms Behandling gjælder det samme, som er sagt om Behandlingen af Epilepsi (Ligfald); den maa i de fleste Tilfælde overlades til Lægen. Derfor gives her kun nogle aldeles bestemte og ved Erfaringen bekræftede Symptomer for tre Hovedmidler, som passe for Veitsbandsens sædvanlige Former, nemlig Ignatia, Stramonium og Hyoscyamus.

Angaaende Ignatia maa man erindre, hvad der er sagt med Hensyn til Epilepsiens almindelige Symptomer og Aarsagerne til dens Fremkomst. Det passer mere for de lettere Grader, som især vise sig ved en fortsat almindelig Uro i Musklerne og Bevægelighed. Særdeles characteristiske Tegn ere navnlig, at Bespørlighederne fortrinnsviis vise

fig efter Middagsmaaltidet, at de ophøre ved at ligge paa Ryggen, og den vakkende Gang med Snublen og Tilbøielighed til at falde over ubetydelige Gjenstaade.

Stramonium er Lægemidlet mod fuldt udviklet og stærkt Veitsbands; denne medfører stærke, krampagtige Bevægelser i Lemmerne, meget ofte overfors, f. Ex. foroven den højre Arm, forneden den venstre Fod og omvendt, eller dreierende Bevægelser med Hænder og Arme, som ved at spinde, eller forceret Løben og Springen; dermed afvejler undertiden Krampe i Kroppen, Tilbagebøjning af Legemet eller Stivkrampe, eller Synkekrampe med Umulighed i at drille Vand. Efter dette Stadium indtræder der ofte stor Udmattelse og No med Phantaseren eller Sang, Latter, Graad og deslige.

I lignende Tilfælde passer ogsaa Hyoscyamus, især naar Patienten vrider og slaaer om sig med Lemmerne, gjør mange Grimasser, og der ogsaa i den rolige Tid viser sig en Tilstand af Overilelse, Travlhed og Snakkesalighed, saavelsom en Tilnærmelse til Aandsfvagthed og Dumhed.

Med Hensyn til Stivkrampe og Krampe i Kjæbebenene, saavelsom Epilepsi (Sigfald) hos Børn, maa der eftersees, hvad der er sagt angaaende disse Sygdomme hos Vorne.

---

## Alfabetift Register.

### A.

Aandedrætsbesværligheder; 118,  
see Asthma.

Aarefnuder hos Svangre, 234,  
(Carb. v., Lyc., Puls., Sulph.  
Bindog Snæreftrømper see Aa-  
refnuder og Hæmorrhoider).

Aarefnuder, 198, see Saar paa  
Venene eller Fødderne.

Abortus, 235, (Acon., Arn.,  
Cham., Coff., Croc., China,  
Ferr., Ipec., Plat., Sab.,  
Sep.

Abscesser, see Bylder.

Afmagring hos Pattebørn, 261.

Afmagt, 226, (Acon., Bell.,  
Chi., Coff., Ferr., Ip.,  
Op., Puls., Ver.).

Ammer, 261.

Ansigtsfinner, 184, see Fub-  
orm.

Ansigtsmerter, 57, (Acon.,  
Bell., Chi., Col., Merc.,  
Mez., Nux v., Puls., Spig.,  
Stann., Stram., Verb.

Ansigtsvulst, ved Rigboste,  
308, (Ars., Dig., Kal. c.,  
Rh. t.)

Ansigtsudtryk, hos Børn, 252.

Antidot, (Modgift), 245.

Apoplexi, 227, Arn., Bar.,  
Bell., Op.).

Appetitløshed, see Mavefa-  
tarrh.

Asthma, 118, (Ars., Bell.,  
Coff., Ipec., Nux v., Puls.,  
Ver.).

Asthma, hos Børn, 309, (Ipec.,  
Mosch., Samb.).

Atrophie, see Diarrhoe hos  
Børn.

### B.

Barselseber, 242, (Acon., Bell.,  
Puls.).

Barselskvinde, 241, deres  
Sygdomme.

Barselseng, 238.

Beenbrud, see Brud.

Beenebber, (Caries,) 200,  
(Asa, Calc., Jod, Merc.,  
Pho., Sil., Staph.).

Bæltrosen, see Helvedsild.

Beskædigelser, 203 see Rnus-  
ninger og Saar.

Besvimelse, see Afmagt.

- Bid af giftige og syge Dyr, 249 (Apis., Ars., Arn.),  
 Badsftning med Brændeviin og Eddike, Gløbbebe.  
 Blegfot, 219 (Calc., Chi., Ferr., Ign., Natr. m., Pho., Plat., Puls.).  
 Blodbræfning, 129 (Acon., Arn., Ars., Bell., Bry., Ip., Millef., Nux v., Plumb., Tart. em., Ver.).  
 Blodfattigdom, 219 (Calc., Chi., Ferr., Puls.).  
 Blodbylber, 194 (Arn., Bell., Hep. s., Merc., Sulph.).  
 Blodflod, 177 (Arn., Bell., Calc., Cham., Chi., Croc., Ferr., Ip., Kreos., Puls., Plat., Ratanh., Sab., Sec. c.).  
 Blodgang, 148 (Acon., Ars., Caps., Colch., Col., Ip., Merc., Nux v., Puls.).  
 Blodpletfygdom, 213 (Chi., Kreos., Merc., Pho., Sulph. ac.).  
 Blodcongestion til Hovedet, 49, (Acon., Arn., Bell., Bryo., Gels., Glon., Nux v.).  
 Blodftigning til Hovedet, hos Frugtommelige, 234 (Bell., Nux v., Sul. ac.).  
 Blodftigning i de Klimatterifte Aar, 176 (Ac., Bell., Sulph. ac.).  
 Blodhoft, 102 og 106 (Arn., Bell., Chi., Ferr., Ip., Nitr. ac., Pho., Puls.).  
 Blodfpytning, fee Blodhoft.  
 Blodfpytning, fee Blodbræfning og Blodflod.  
 Blodfpytning, hos Frugtommelige, 235 (Acon., Arn., Cham., Chi., Coff., Croc., Ip., Ferr., Plat., Sab., Sep.).  
 Blod, underløbet, 203 (Arn.).  
 Blødning, fra Livmoderen, fee Blodflod.  
 Bløfelyd, 219.  
 Bløreframpe, hos Battedørn, 273 (Acon., Bell., Camph., Cham., Puls.).  
 Blørofen, fee Rosen.  
 Bløfolif, 140 (Nux v., Op.).  
 Brand, i Bylber, fee Roldbrand.  
 Brand, i Underlivet, fee Roldbrand.  
 Brof, Larm- 159 (Acon., Ars., Caps., Cocc., Lach., Nux v., Op., Plumb., Sul., Sul. ac., Thuj.).  
 Brud af Been, 204 (Arn.).  
 Brøftftigning, 260.  
 Brøftftjertelbetændelfe 121 (Arn., Bell., Bry., Carb. an., Chi., Con., Hep. s., Merc., Pho., Sil.).  
 Brøftvortebetændelfe, hos Ryfede, 271 (Arn., Bell., Hep. s.).  
 Brøftbetændelfe, fee Lunge- og Lungehindebetændelfe.  
 Brøftframpe, fee Åftma.  
 Brøftframpe, hos Børn, fee Åftma.  
 Bræfning, 128, fee Optafning, (Acon., Ars., Bell., Bry., Cham., Cocc., Ferr., Ip., Kreos., Lach., Nux v., Pho., Puls., Tart. em., Ver.).

Bræfning hos Pattebørn, 276  
(Aethus., Ars., Ferr.,  
Ip., Kreos., Tart. emi.).  
Bræfning hos Frugtsommelige,  
233 (Ip., Kreos., Nux  
v., Sep.).

Bræfning og Diarrhoe, see Cho-  
lerine.

Brændte Saar, 197 (Acon., Ars.,  
Caust., Ign., Ip., Sulph.,  
ubvendigt: Canth., Caust.,  
Urtica).

Bughindebetændelse, see Un-  
derlivsbetændelse.

Bugforn, 294 (Calc., Graph.,  
Puls., Staph., Sulph.,  
Thuj.).

Blyder, 195 (Arn., Bell.,  
Hep. s., Merc., Sulph.).

Bandelormsbefærligheder,  
161 (Calc., Fil., Cicuta,  
Sabad., Sulph., Granat.,  
Koussou).

Børn, Underfølgelse af syge,  
252.

Børnesygdomme, 251.

C.

Carbunkler, 194 (Ars.).

China, Misbrug af, 216 (Ars.,  
Ip.).

Chlorosis, 219 see Blegfot.

Cholera, 151 (Ars., Camph.,  
Colch., Cupr., Hydro-  
cyan. acid., Ipec., Tab.,  
Ver.).

Cholérine, 150 (Ipec., Ph.ac.,  
Ver.).

Congestioner, see Blodstigning.  
Contracturer, 209 (Calc.,

Caust., Colch., Led., Pho.  
ac., Rhod., Sulph.).

Convulsioner, see Krampe.

Croup, 302, see Strubehoste.

D.

Diarrhoe, hos Børn, 143  
(Arg. nitr., Ars., Bry.,  
Calc., Cham., Chi.,  
Colch., Coloc., Dulc.,  
Ferr., Ip., Merc. Pho.  
ac., Puls., Rhe., Sec. c.,  
Sulph., Ver.).

Diarrhoe, hos Børn, 315  
(Ars., Calc., Chi., Pho.).

Diarrhoe, hos Nyfødte, 278  
(Calc., Cham., Colch.,  
Ip., Merc., Rhe., Sec. c.,  
Sulph.).

Diarrhoe, hos Frugtsommelige,  
234 (Pho. ac., Ver.).

Diarrhoe, hos Barselvinder,  
242 (Pho. ac.).

Diegibning, 260.

Diphtheritis, 298 (Ars., Bell.,  
Brom., Carbol. ac., Jod,  
Merc. subl.).

Diæt, homøopatisk, 30, 43.

Diæt, hos Børn, 262

Diæt, hos Frugtsommelige,  
233.

Diætetik, hos Børn, 252.

Dobbeltlyn, 64 (Aur., Bell.,  
Dig., Hyos., Jod, Petrol.,  
Sec. c., Sep., Stram.,  
Ver.).

Dobbelte Lebde, see engelsk  
Syge.



Dysenteri, see Blodgang.  
Døvhed, 70 see Tunghør-  
hed.

## E.

Efterblyd, 238.  
Efterveer, 239 (Arn., Puls.,  
Sec. c.).  
Engelst Syge, 328, see Rha-  
gitis.  
Epilepsi (Eiigfalb), 223 (Bell.,  
Calc., Cupr., Ign., Lach.,  
Op., Sulph.).

## F.

Faarefyge, 66 (Aur., Bar.,  
Bell., Calc., Merc., He-  
par s., Puls., Sil.).  
Falb, Besværligheder efter, 48,  
203 (Acon., Arg. nitr.,  
Arn., Bell., Calc., Cic.,  
Con., Rh. t., Symph.).  
Faldsyge, 223, see Epilepsie.  
Farvesyn, 64, 65 (Alum., Ars.,  
Aur., Bell., Canth., China,  
Cina, Con., Dig., Eu-  
phorb., Hyosc., Merc.,  
Spig., Sulph., Ver.).  
Febersymptomer, hos Børn,  
257.  
Fingre, holbne, 195 (Hep. s.,  
Merc., Sil.).  
Finner, see Fuborm og An-  
figtsfinner.  
Fistelsaar, 200 (Calc., Pho.,  
Sil.).  
Fluesyn (mouches volantes),  
64 (Agar., Bell., Hyosc.,  
Lact., Merc.).

Fodskaar, 198 (Ars., Carb.  
veg, Lach., Merc., Mez.,  
Puls., Sil., Sulph.).  
Fontaneller, hos Børn, 267.  
Fnat, 187 (Merc., Sulph., ud-  
ven vendigt: Perubalsam, Pe-  
troleum, Svoel og Styrax).  
Fnatlignende Udslet, 190 (Ant.  
cr., Ars., Caust., Carb. v.,  
Graph., Lyc., Merc., Mez.,  
Puls., Ran. b., Rh. t.,  
Sulph.).  
Forbrændinger, 197 see brændte  
Saar.  
Fordsielfessvækkelse, 123. see  
Mavelatarrh.  
Forgiftninger, 243.  
Fortrumminger, 328.  
Forslæstelser, see Forstuvninger.  
Forrivning, af Medicinpulver,  
56.  
Forstoppelse, 153 see haardt  
Liv.  
Forstoppelse, hos Pattedbørn  
275, see haardt Liv.  
Forstoppelse, hos Barselskvinder,  
233, 242 see haardt Liv.  
Forstoppelse, i Næsen, 76,  
see Snue, kronist.  
Forstuvninger, 203 (Arn.) og  
Forvridninger.  
Fregner, 203 (Lyc., Ver.).  
Fremtræden af Endetarmen,  
147 (Ars., Colch., Ign.,  
Merc., Nux v., Ruta,  
Sulph.).  
Fremtræden af Steden og  
Livmoderen, 179 (Arn.,  
Nux v., Puls., Sep.).  
Frislinger, hos Ryfsbte, 280  
(Cham., Hep. s., Lyc.,  
Merc.).

Frieslinger, 185 (Ars., Bry.,  
Ip., Val.).  
Grost, 196 (Arn., Ars.,  
Hamam., Nitr. ac., Petrol.,  
Puls., Sulph., Thuj., ub-  
vendigt: Arn., Nitr. ac.).  
Grosne Femmer, see Grost.  
Frugtsummelighedsbesvær-  
heder, 232.  
Furunkler, 194, see Blodbyl-  
der.  
Fødselsacten, 237.

G.

Galdebrækning, 129 (Bry.,  
Cham., Ip., Pho., Ver.).  
Galdesteenskolt, 134 (Bell.,  
Carlsbad).  
Gastrisk Feber, see Maveka-  
tarrh.  
Gemytsophibiselse, se Ophid-  
felse.  
Gemytsophibiselse, hos Frugt-  
sommelige, 232.  
Gemytsophibiselse, hos Fruen-  
timmer, som give Bryst,  
276 (Acon., Op.).  
Gemytsophibiselse, hos Varsel-  
tvinder, 241 (Bell., Coff.).  
Gjennemliggen (Decubitus),  
194 (Ars., Kreos., Nitr.  
ac.).  
Gistblegne, 250 (Apis., Ars.).  
Gjentagelse af Medicinind-  
givter, 29, 38.  
Gigt, 210 (Acon., Arn.,  
Bell., Calc., Caust., Colch.,  
Ferr., Led., Merc., Puls.,  
Pho. ac., Rhod., Rh. t.,  
Sulph.).  
Grippe, 104 (Acon., Bell.,

Caust., Jod, Merc., Nux  
v., Pho.).  
Grædeframpe, 223 (Hyosc.,  
Plat., Stram.).  
Græmmelse, dens Følger,  
276 (Ign.).  
Gnulsot, 132 (Bry., Chi.,  
Merc.).  
Gnulsot, hos Rygsbte, 133, 282  
(Acon., Cham., Lach.,  
Merc.).

S.

Saardt Riv, 133 (Bry., Chi.,  
Graph., Natr. m., Nux v.,  
Op., Plumb., Sulph.), Rlv-  
sterer, Gymnastik.  
Saardt Riv, hos Pattedørn,  
275 (Bry., Lyc., Nux v.,  
Op.).  
Saardt Riv, hos Frugtsumme-  
lige, 233 (Bry., Nux v.,  
Sep.).  
Saartab, efter Varselseng, 243  
(Calc., Chi.).  
Sahnemanns Optraeden, 4.  
Salsbetændelse, 94 (Acon.,  
Bar., Bell., Cham., Hep.  
s., Lach., Merc., Nux v.,  
see Diphtheritis).  
Salsbrunde 127 (Bell., Bry.,  
Calc., Caps., Chi., Nux v.,  
Pho., Sulph. ac.).  
Salsbrunde, hos Frugtsumme-  
lige, 127 (Bell., Nux. v.).  
Salten, frivillig, 324 (Bell.,  
Merc.).  
Sebe, flyvende, 176 (Acon.,  
Bell., Sulph. ac.).  
Sedetsi, hos Pattedørn, 279  
(Acon.).

- Hektift Feber, 121 (Ars., Bry., Calc., Chi., Ferr., Sulph.).  
 Helbredelseslære, homøopathift, 6.  
 Helvedesild, 184 (Merc., Rh. t.).  
 Herestub, 211, see *Sold i Ryggen*.  
 Hjernebetændelse, 285 (Arn., Ap., Bell., Bry., Op., Stram.).  
 Hjernerystelse, 48, 287 (Acon., Arn., Arg. n., Bell., Calc., Cic.).  
 Hjernerstalsvulst, 270 see *Hovedsvulst* ogsaa *Rachitis*.  
 Hjernevandsot, see *Band i Hovedet*.  
 Hjertebanken, 116 (Acon., Ars., Asa, Bell., Cact., Cham., Chi., Coff., Dig., Ferr., Naja., Natr. m., Nux v., Pho., Plat., Spig., Ver.).  
 Hjertebetændelse, 115 (Acon., Bell., Colch., Puls., Spig., Ver.).  
 Hjertefeil, see *Hjertebanken*.  
 Hille, 127 (Hyosc., Ign., Nux v.).  
 Hille, hos *Battebørn*, 278 (Ign., Sufferband).  
 Hostebetændelse, 324, see *Salten*, frivillig.  
 Hostesmerte, 211 (Bell., Colch., Puls.).  
 Sold i *Ryggen*, 211 (Arn., Led., Nux v., Rh. t., Sulph.).  
 Homøopathi, dens Grundsatninger, 1.  
 Hornhindepletter, 294 (Apis, Cann., Calc., Con., Hep. s., Merc., Sil., Sulph.).  
 Hoste, 97 (Acon., Bell., Bry., Cham., Euph., Hyosc., Ip., Merc., Puls., Tart. em.).  
 Hoste, langvarig, 99 (Ars., Calc., Carb. veg., Kal. c., Pho., Pho. ac., Sulph.).  
 Hoste, hos *Rysbde*, 278 (Acon.).  
 Hovedpine, af *Blodfattigdom*, 49 (Calc., Ferr., Pho., Natr. m., Puls.).  
 Hovedpine, af *Blodsigning*, 49 (Acon., Arn., Bell., Bry., Gels., Glon., Nux v.).  
 Hovedpine, gastrift, 49 (Ant. cr., Ip., Nux v., Puls., Ver.).  
 Hovedpine, Gigt-, 51 (Acon., Bry., Calc., Coloc., Ign., Nitr. ac., Sep.).  
 Hovedpine, halvsidig, 50 Arg. n., Ars., Bell., Calc., Coff., Coloc., Ip., Merc., Nux v., Plat., Sanguin., Sep., Spig.).  
 Hovedpine, hysterift, 50 (Aur., Cocc., Ign., Val.).  
 Hovedpine, katarrhalst, 49 (Acon., Bell., Euph., Merc., Nux v.).  
 Hovedpine, af mekaniske *Årsager*, 48 (Acon., Arg. n., Arn., Bell., Calc., Cic.).  
 Hovedpine, af *Rattevaagen*, 48 (Nux v., Sulph.).  
 Hovedpine, nervens, 50, see *halvsidig*.  
 Hovedpine, reumatift, 50 (Acon., Cham., Merc., Nux v., Puls., Spig.).  
 Hovedpine, af *Frådseri*, 49 (Ars., Carb. v., Nux v.).

Hovebpine, hos Fruktfommelige, 234 (Bell., Nux v.).  
 Hovebpine, af Stillefribden, i Bærelse, 48 (Nux v., Sulph.).  
 Hovebpine, fupphilitift, 51 (Aur., Jod., Merc., Lach., Mez., Nitr. ac.).  
 Hovebfvulft, hos Ryfobte, 270 (Arn., Chi., Sil.).  
 Hovebfvur, 290 (Cotyl., Graph., Hep. s., Rh. t., Spong., Staph., Sulph.).  
 Hudløshed, 193 (Arn. ndvendig).  
 Hudløshed, hos Pattedørn, 180, 271 (Cham., Hep. s., Lyc., Merc.).  
 Hudløshed, hos Pattedørn, dens Undgaaelfe, 272 (Kartoffelmel, Reenlighed).  
 Hudløfe, 191 (Ars., Calc., Caust., Carb. veg., Cocc., Ign., Lyc., Merc., Mez., Nitr. ac., Nux v., Natr. m., Plat., Petrol., Puls., Rh. t., Sep., Sulph.).  
 Hudfvulfter, 200 (Calc., Sil.).  
 Hudfygdomme, 182.  
 Hudfygdomme, hos Børn, 289.  
 Hudfygdomme, hos Pattedørn, 279.  
 Hudvarmen, hos Pattedørn, 256.  
 Hundegalfkab, fee Bantftræk.  
 Huusapotheker, deres Tilberedelfe og Opbevaring, 34.  
 Hvidt Flod, 179 (Alum., Arg. n., Arn., Ars., Calc., Chi., Ferr., Graph., Jod, Kreos., Merc., Mez., Natr. m., Nitr. ac., Nux v., Puls.,

Sab., Sep., Sil., Sulph., Thuja, Sædebade).  
 Hydrocele, 174, fee Bantfbrof.  
 Hypochondri, 156 (Ars., Aur., Calc., Chi., Ferr., Nux v., Pho. ac., Sulph.).  
 Hysteri, 156 (Plat., Puls., Sep.).  
 Hæmorrhoider, 168 (Acon., Bell., Caps., Cham., Ip., Kreos., Nux v., Puls., Sulph.).  
 Hæshed, 104 (Acon., Bell., Brom., Carb. v., Caust., Hepar s., Jod, Mang., Merc., Nux v., Pho., Puls., Spong, Sulph.).

### I.

Icterus, fee Gvulftot.  
 Iidebefindende, Kvalme, 128 (Acon., Ant. cr., Ars., Bell., Bry., Cham., Cocc., Ip., Nux v., Pho., Puls., Ver.) fee ogsaa Optafning.  
 Iidebefindende, hos Fruktfommelige, 233 (Ip., Kreos., Nux v., Sep.).  
 Indgiwt, af de homøopatifte Lægemedler, 34.  
 Indgiwternes Størrelfe, 24, 38.  
 Influenza, fee Grippe.  
 Infektift, 249 (ubvendig Arn., Brændevin, Eddife).  
 Intermittens, fee Koldfeber.  
 Iod Misbrug, 97.  
 Iſchias, fee Hoftefmerter.

## R.

Ratarrh, 97, see Softe.  
 Rjertelsuge, 325 (Bar., Bell., Brom., Calc., Carb. an., Con., Hep. s., Merc., Sil., Sulph.).  
 Righofte, 306 (Bell., Bry., Cina, Con., Cupr., Dros., Ip., Mez., Samb., Ver.).  
 Rjæbebeenstrampe, 226 (Bell., Camph., Hyosc., Ign., Ver.).  
 Rjse i Endetarmen, 192 (Calc., Caust., Ign., Lyc., Sep., Sulph.).  
 Rnoffellibelser, 201, 204, 328 (Asa, Aur., Calc., Pho. ac., Sil., Symph., Staph.).  
 Rnusninger, 203 (Arn., Con., Rh. t., Symph.).  
 Rnusninger, under Fødselen, 239 (Arn.).  
 Rnæftalsvulst, 202 (Sil.).  
 Røberubflet (Røbernæse), 185 (Ant. cr., Arn., Carb. v., Nitr. ac., Sulph.).  
 Rotorpeindpobning, 323 (Acon. Sulph.).  
 Roldbrand, i Bylber, 200 (Ars., Carb. veg., Chi., Lach., Sec. c., Sil.).  
 Roldbrand, i Underlivet, 139 (Ars.).  
 Roldfeber, 214. (Ars., Caps., China, Cina, Ferr., Ign., Ip., Nux. v., Natr. m., Puls. Ver.).  
 Rolit, 139 (Ars., Bell., Cham., Chi., Colch., Coloc., Merc., Nux. v., Plumb., Puls., Rh. t.).  
 Rolit, hos Pattedørn, 275

(Acon., Cham., Coff., Jal., Ign., Nux. v., Op.).  
 Rolit, hos Frugtformelige, 140 (Bell., Bry., Nux. v., Puls., Sep.).  
 Ropper, 323 (Acon., Ars., Bell., Coff., Merc., Sulph., Tart. em., Thuja).  
 Rortaaendethed, 118 see Asthma.  
 Ramper, 221 (Hyosc., Ign., Op., Plat., Sec. c., Stram., Sulph.).  
 Ramper, hos Børn, 297, 329 (Acon., Bell., Chi., Cina., Cham., Coff., Ign., Ip., Op., Stram., Zinc.).  
 Ramper, hos Nyfødt, 330 see Ramper hos Børn.  
 Ramper, hos Barfelfvinder, 241 (Bell.).  
 Rampearter, 198, see Baricose Saar paa Fødderne.  
 Rampearter, hos Frugtformelige, 234 (Carb. v., Lyc., Puls., Sulph., Sind).  
 Rampegagb, 223 (Hyosc., Plat., Stram.).  
 Rampehofte, see Righofte og Strubehofte.  
 Rrop, 96 (Brom., Calc., Jod, Hep. s., Sil., Spong.).  
 Rummer, dens Følger, 276 (Ign.).  
 Rvalme, see Ildebestandenbe.  
 Rvælning, ved giftige Luftarter, 249 (Bell., Coff., Op.).  
 Rvælningstilfælde, 118, 268, 310, see Asthma.

## S.

Saarfsvulst, hvib, 241 (Ars., Bell.).

Sammelfer, 227 (Arn., Bell., Caust., Cocc., Dulc., Rh. t., Sulph.).  
 Sammelse, i Ansigtsmuslerne, 228 (Bell., Caust., Graph., Stram.).  
 Sammelse, i Blæren, 229 (Bell., Camph., Canth., Nux v., Puls.).  
 Sammelse, i Overlemmerne, 228 (Cocc., Ferr., Nux v., Rh. t.).  
 Sammelse, i Tungen, 228 (Bell., Caust., Lach., Mur., ac.).  
 Sammelse, i Underlemmerne, 228 (Bry., Plumb., Rh. t., Sec. c., Ver., Zinc).  
 Sammelse, i Dienlaagene, 64, 228 (Bell., Plumb., Sep., Spig., Stram., Ver.).  
 Sangsynethed, 65.  
 Satterframpe, 223 (Hyosc., Ign., Op., Plat., Stram.).  
 Leddekrumninger, 210, 328, see ogsaa Rheumatisme.  
 Leddesmerter, see Gigt og Rheumatisme.  
 Legemsvarme, hos Pættedøgn, 257.  
 Leverbetændelse, 133 (Acon., Bell., Bry., Chelid.).  
 Leverpletter, 203 (Sep., nb. vendigt Ver.).  
 Litigfalt, see Epilepsi.  
 Litighedsblære, 6.  
 Lustarter, giftige, Forgiftning ved, 249 (Bell., Coff., Op.).  
 Luftrørslibeller, see Hæshed og Hoste.

Luftrørssnit (Tracheotomi), 306.  
 Lungebetændelse, 108 (Acon., Arn., Bell., Bry., Jod, Kali hydr., Pho., Sulph., Tart. em.).  
 Lungeløbning, see Blodhoste.  
 Lungelindebetændelse, 112 (Acon., Arn., Bry., Hep. s., Squill., Sulph., Tart. em.).  
 Lungesygge (Svindefot, Tæring), 120 (Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Chi., Ferr., Jod, Kalc. c., Merc., Pho., Puls., Stann., Sulph.).  
 Lysstød, 293 (Bell., Con., Viol. tric.).  
 Lyster, hos Frugtommelige, 235 (Plat.).  
 Lægeframpe, 223 (Ferr., Sec. c., Sulph., Ver.).  
 Lægeframpe, ved Cholera, 153 (Camph., Cupr., Sec. c.).  
 Lændesmerter, see Smerter i Rygsøjlet.  
 Læren om de homøopatiske Doser, 22, 34.

## M.

Maanedsflod, see Regler.  
 Mandelbetændelse, see Halsbetændelse.  
 Mareridt, 231 (Acon., Nitr., Nux. v., Op., Puls., Sep., Sulph.).  
 Materieblegning, 191 (Hep. s.).  
 Maveblødning, see Blodbrætning.

Mavesforbærrelse, 126 (Acon.,  
 Ars., Bell., Bry., Calc.,  
 Carb. v., Cham., Chi.,  
 Cocc., Ferr., Ip., Nux v.,  
 Op., Puls., Ver., Kaffe,  
 Spir. nitr. d.).  
 Maveskatarrh, 123 (Bry., Calc.,  
 Cham., Chi., Hep. s., Ip.,  
 Nux v., Pho., Sulph. ac.,  
 Tart. em.).  
 Mavesrampe, 129 (Arn., Bar.,  
 Bell., Bism., Bry., Carb.  
 v., Cham., Chel., Chi.,  
 Cocc., Ign., Nux v., Pho.,  
 Puls.).  
 Mavepine, 139, 275, see Kolik.  
 Mavesvækkelse, see Maveska-  
 tarrh.  
 Mavesyre, 127 (Calc., Hep.  
 s., Nux v., Pho., Sulph.  
 ac.).  
 Mel, dens Bestaendighed, 262.  
 Meltebrænding, hos Bættebørn,  
 276 (Aethusa, Ars., Ferr.,  
 Ip., Kreos., Tart. em.).  
 Meltesfeber, 239 (Acon., Arn.,  
 Bell.).  
 Melteskub, 240 (Calc.).  
 Meltemangel, 240 (Agn. c.,  
 Puls.).  
 Meltesekretion, anomal, 241  
 (Agn. c., Bell., Bry., Calc.,  
 Puls.).  
 Menstrualbesværligheder, 174  
 see Regelbesværligheder.  
 Menstrualkolik, 176 (Bell.,  
 Cham., Cocc., Coff., Cupr.,  
 Kali. c., Nux v., Plat.,  
 Puls., Sec. c., Sep.).  
 Medicin, Prøver, 16.  
 Medicin, Virkninger, 14.  
 Migraine, 50 (Arg. n., Ars.,

Bell., Calc., Coff., Coloc.,  
 Ip., Merc., Nux v., Plat.,  
 Sanguin., Sep., Spig.).  
 Miltsting, og Svulst, 135 (Arn.,  
 Ars., Bry., China, Ferr.).  
 Misere, see Tarmslængning.  
 Modgift, 245.  
 Mundinflammation, 78, (Bor.,  
 Carb. v., Kal. chl., Merc.,  
 Mur. ac., Nitr. ac., Staph.).  
 Mundinflammation, hos Børn,  
 296, (Bor., Kal. chl., Merc.,  
 Sulph. ac.).  
 Mundlugt, 80 (Aur., Merc.,  
 Nux v., Puls., Sep., Sil.,  
 som Mundvand en Opløs-  
 ning af Kal. chl., Rødn.  
 Vand, Viinaand).  
 Næslinger, 318 (Acon., Bell.,  
 Bry., Chi., Hyosc., Ip.,  
 Merc., Puls., Sulph.).

## N.

Natten, Sandbladning om (i  
 Sengen), 171 (Bell., Con.,  
 Nux v.).  
 Nattervandring (Søvgjænger),  
 231 (Bry., Op., Pho., Sil.).  
 Navelstreng, dens Afstjærning  
 og Behandling, 269 (Arn.).  
 Negleboldenskab, 195, see  
 Fingre, boldue.  
 Nefesfeber, 185 (Apis., Ars.,  
 Bell., Bry., Calc., Cop.,  
 Dulc., Lyc., Nux v., Puls.,  
 Rh. t., Sulph., Urt.).  
 Nervesmerter (Neuralgi), 50, 57  
 see Hovedpine og Ansigtss-  
 merter.

Røring, Børns, 259.  
 Rørsynethed, 65.  
 Rysfødte, deres Sygdomme, 267.  
 Rvresteen, see Urinsteensbesværligheder.  
 Røseblod, 77 (Acon., Arn., Bell., Bry., Carb. v., Cina, Con., Croc., Ip., Kreos., Merc., Nux v., Pho., Puls., Sec. c., Sulph.).  
 Røseholdenskab (Ozaena), 76 (Aur., Merc., Puls., Sil.).  
 Røseforstoppelse, 76 (Calc., Puls., Sil.).  
 Røseforstoppelse, hos Rysfødte, 76 (Nux v., Samb.).  
 Røsepolyp, 76 (Calc., Hep. s., Puls., Sep., Sil., Teucr.).  
 Røserødme, 76 (Ars., Bell., Carb. v., Petrol., Pho. ac., Rh. t.).  
 Røsevulst, 76 (Arn., Bell., Bry., Merc.).  
 Røseublet, 76 (Ant. cr., Arn., Calc., Hep. s., Merc., Sulph., Thuja).

**D.**

Dpbevaring, af homøopathiske Lægemidler, 24.  
 Dpflastning, af Børn, 262.  
 Dphibse, dens Følger, 276 (Acon., Op.).  
 Dpflastning, 102 (Acon., Ars., Arn., Bell., Bry., Calc., Carbo v., Cham., Chi., Jod., Ferr., Kali. c., Lyc., Merc., Natr. c., Nux v., Pho., Puls., Sep., Stam., Sulph.).

Dppustethedsbesværligheder, 157, 276 (Ars., Aur., Asa, Carb. v., Caust., Cham., Chi., Colch., Graph., Hep. s., Nux v., Lyc., Pho., Puls., Sulph., Ver.).  
 Dppustethedsbesværligheder, hos Battebørn, 275 (Cham., Coff., Ial., Nux v.).  
 Dpstøb, 127 (Bry., Cocc., Calc., Hep. s., Nux v., Phosph., Plat., Puls., Sulph. ac., Tart. em., Ver.).  
 Ormebesværligheder, 160, 310, see ogsaa Bændel-, Spring- og Spolorme.  
 Overbeen, 201 (Calc., Pho., Sil.), see Seneknuder.  
 Ozaena, see Røseholdenskab.

**B.**

Barotitis, see Gaarefyge.  
 Battebørn, deres Sygdomme, 267, 285.  
 Battebørn, deres Indpudbring, 272.  
 Battebørn, deres Bænnen fra Brystet, 241.  
 Bthifis, see Tøring og Lungefyge.  
 Bodagra, 210, see Gigt.  
 Botensferingslære, 24, 35.  
 Buerperalsfeber, 242, see Barfelseber.  
 Pulsen, hos Børn, 257.

**R.**

Regelbesværligheder, 174, see Menstrualkolik.



Regler, stærke, 177 (Arn., Bell., Cham., Chi., Croc., Ferr., Ip., Kreos., Plat., Puls., Ratanh., Sab., Sec. c.), see Blodstob.

Regler, svage, 176 (Bell., Cocc., Puls., Sep.).

Regler, udeblivende, 175 (Bell., Bry., Puls.), see ogsaa Bleg-sot.

Respiration, Børns, 258.

Rhachitis, 328 (Asa, Aur., Calc., Pho. ac., Sil., Staph., Seyertran).

Rheumatisme, 206 (Acon., Arn., Bell., Bry., Colch., Cham., Merc., Puls., Rh. t., Spig., Tart. em., Zinc.).

Rheumatisme, kronisk, 209 (Caust., Ferr., Lach., Rh. t., Sulph.).

Rheumatisme, flyvende, 207 (Bry., Puls., Zinc.).

Rheumatisme, med Fortrum-ninger, 209 (Bry., Caust., Lach., Rh. t., Sulph.).

Rheumatisme, med Sammelse, 209 (Arn., Chi., Ferr., Rh. t., Ruta).

Rheumatisme, med Fedde-svulst, 209 (Acon., Arn., Bell., Chi., Nitr., Puls., Rh. t., Tart. em., Zinc).

Ribbeenshindebetændelse, 112 see Lungehindebetændelse.

Rindende Dine, 63 (Euphras., Merc., Puls., Rh. t.), see ogsaa Taarefistel.

Rivende Smerter, see Rheu-matisme.

Rosen, 182 (Apis., Arn. Bell.,

Camph., Graph., Lach., Rh. t.).

Rosen, Blære-, 183 (Euphorb., Rh. t.).

Rosen, hos Rygsbte, 183, 269, 280 (Acon., Arn., Ars., Bell., Lach.).

Rugrabsstrumninger, 328.

Rygsmertter, 212 (Arn., Bry., Led., Nux v., Rh. t., Sulph.).

Ræben, sure Opstød, Hals-brunde 127 (Bryon., Ferr., Ign., Phosph., Sulph., Thuja).

Røblinger, 319 (Acon., Bell., Coff.).

## S.

Saar, 203 (Acon., Arn., Hep., Sulph.).

Saar, deres Forbinding, 205.

Saar paa Brystvorterne, 123 (Arn., Bell., Graph., Rh. t., Sulph., Gummivorter).

Saarfeber, 206 (Acon., Arn., Hep. s.).

Saltstob, 200 (Ars., Graph., Merc., Puls., Rh. t., Sul.).

Sclerom (Gelleævsjorhærdelse) hos Rygsbte, 281 (Ars., Chin. arsen., Lach.).

Secretioner, hos Pattebørn, 255.

Senefruder (Overbeen), 201 (Calc., Sil.).

Sengen, Vandladning i, (om Ratten), 171, 317 (Bell., Caust., China, Dulc., Nux v., Plant., Puls., Sulph.).

Sidesting, 114 (Arn., Squilla);

- see ogsaa Lungehindebetændelse.
- Staalopper, 322, see Spidsopper.
- Stakblærer, 279 (Merc., Rh. t.).
- Starlagensfeber, 319 (Acon., Ars., Bell., Bar., Bry., Coff., Colch., Helleb., Hep. s., Lach., Lyc., Merc., Mur. ac., Pho., Rh. t., Sulph.).
- Starlagensfeber, Præservativet mod, 322 (Acon., Bell.).
- Starlagensfeber, Bandstot under, 321 (Ars., Colch., Hell., Hep. s., Lyc., Merc., Rh. t.).
- Stelen, hos Børn, 294 (Bell., Cina, Hyosc., Mar. v., Spig.).
- Stindøb, hos Nyfødte, 268 (Op. Tart. em.; Bad, Rysseer, Lufthinblæsning, Gnidning, Barme).
- Stjørbug, 213 (Chi., Kreos., Merc., Pho., Sulph. ac.).
- Stjørbug, 78 (Bor., Carb. v., Kali. chloric., Merc., Mur. ac., Nitr., Staph.).
- Stjørbug, hos Børn, 296 (Bor., Kali. chloric., Merc., Sulph. ac.).
- Strigen, hos Pattedørn, 282 see Svølgssked.
- Strigen, hos Pattedørn, dens Betydning, 254.
- Strofler, 325 (Calc., Merc., Sil., Sulph.), see ogsaa Rjertelsgge.
- Stræl, dens Følger, 276 (Acon., Op.).
- Sturv, 280, 290 (Acon., Hep. s., Merc., Rh. t., Sassap., Viola. tric.).
- Slagflod, 227 (Arn., Bar., Bell., Op.).
- Slimudflod, 179 see Svibt flod.
- Slimbræfning, 129 (Acon., Bell., Ip., Puls., Tart. em.).
- Smerter, i Rygsjet, 212 (Arn., Bry., Led., Nux v., Rh. t., Sulph.).
- Snigende Feber, see bestist Feber.
- Snue, 73 (Acon., Ars., Bry., Cham., Euph., Lach., Merc., Nux v., Puls., Samb.).
- Snue, Cronist (Forstoppelse i Næsen), 75 (Aur., Calc., Jod, Puls., Sil., Sulph.).
- Snue, Materie-, 75 see Næseboldensflod.
- Snue, hos Pattedørn, 75, 279 (Nux v., Samb.).
- Sovebesværligheber, 229, 241, 282.
- Svølgssked, 312 (Acon., Colc., Cina, Merc., Sabad., Spig., Sulph.).
- Spidsopper, 322 (Acon., Bell., Merc., Sulph.).
- Springorme, 312 (Acon., Calc., Ferr., Ign., Marum., Merc., Sulph., Rysterer af Affog af Balnøbbeblade).
- Spytflod, 80 (Ant. crud., Bar., Bell., Colch., Euphorb., Hep. s., Jod, Laches., Merc., Nux v., Nitr. ac.).
- Spytflod, Mercurial-, 81 (Hep. s., Jod, Nitr. ac.).

- Spøttklob, hos Battedørn, 297.  
 Stemmemangel, 104, see Hæshed.  
 Steenbesværigheder, see Galdesteenskolik og Urinsteen.  
 Stil af Bier, see Vid.  
 Stinknase, see Næseboldestab.  
 Stivtrampe, 226 (Ang., Bell., Camph., Ip., Mosch., Op., Plat., Sec. c., Stram.).  
 Stolubtømmelser, hos Nyfødte, 256.  
 Strubehoste, 303 (Acon., Brom., Hep. s., Jod., Phos., Spong., Tart. em.).  
 Strubehoveblister, see Hæshed og Høste.  
 Svampe, 296 (Bor., Kali. chloric., Merc., Sulph. ac.).  
 Svimmelhed, 54 (Acon., Bell., Cocc., Nux v., Pho., Op., Puls., Rh. t., Ver.).  
 Svimmelhed, hos Frugtsummelige, 234 (Bell., Nux v., Sep.).  
 Svindsot, 120, see Lungesygge og Tøring.  
 Svulster, 200, see Sætsvulst.  
 Svulster, 198 (Ars., Asa., Calc., Carb. v., Chi., Cond., Con., Jod., Kreos., Lach., Merc., Mur. acid., Nitr. ac., Pho., Sec. c., Sil., Staph., Sulph., Sulph. ac.).  
 Svulst, i Rinderne, opstaaet af Hjertelidelser, see Hæresygge.  
 Svulst, i Rinderne, opstaaet af Tandsmærter, 88 (Arn., Bell., Cham., Merc., Nux v., Puls., Staph.).  
 Svækkelse, i Høreorganerne, 70 (Bell., Bry., Caust., Cann., Graph., Lach., Mang., Merc., Petrol., Pho., Puls., Sil., Sulph., Ver.).  
 Sygdomssymptomer, 13.  
 Sygdomssymptomer, hos Børn, 251.  
 Syge=Examen, 13.  
 Sygesvagthed, 63, see Dienesvagthed.  
 Syre, see Mavesyre.  
 Sætsvulst, 200 (Calc., Sil.).  
 Sønforstyrrelse, ved Drømme, 231 (Bell., Bry., Chi., Nux v., Pho., Puls., Sulph.).  
 Sønforstyrrelse, ved Sammenfaren, 231 (Bell., Bry., Cupr., Hyosc., Ip., Op., Puls., Sulph.).  
 Sønforstyrrelse, ved Snorken, 231 (Chi., Ign., Nux v., Op., Stram.).  
 Sønforstyrrelser, ved Talen, 231 (Ars., Bell., Cham., Jal., Ign., Nux v., Puls., Zinc.).  
 Søvngjængeri, see Rattedangring.  
 Søvnløshed, 229, 282 (Acon., Ars., Bell., Cham., Coff., Con., Jal., Ign., Op., Puls., Sulph.).  
 Søvnløshed, hos Barselskvinder, 241 (Bell., Coff.).  
 Søvnløshed, hos Nyfødte, 282 (Acon., Bell., Bry., Cham., Coff., Hyosc., Ran. bulb.).  
 Søvnløshed, hos Oldinge, 230 (Con., Op.).

**T.**

Taaresiftel, 63 (Natr. m., Sil.).  
 Tandfiftel, 88 (Aur., Calc., Hep. s., Jod, Merc., Pho., Sil., Staph.).  
 Tandbefværligheber, 296 (Acon., Bell., Calc., Cham., Coff., Ign., Merc., Sulph.).  
 Tandfjæbbfber, 88, see ogsaa Taaresjæge, (Merc., varme Omflag).  
 Tandframpe, 298 (Bell., Cham., Ign.).  
 Tandpine, 83 (Acon., Ant. cr., Arn., Bell., Cham., Chi., Magnes. c., Merc., Mez., Nux v., Pho., Puls., Rh. t., Sil., Staph., Spig.).  
 Tandpine, hos Frugtffomme- lige, 234 (Bell., Calc., Puls., Sep.).  
 Tandubflet, 296 (Sulph.).  
 Tarmbrof, see Brof.  
 Tarmffynqning, 160 (Acon., Caps., Nux v., Op., Plumb., Sulph., Thuj.).  
 Temperatur, hos Battebørn, 257.  
 Tefiffelfbetændelfe og Svulff, 174 (Arn., Aur., Bell., Cham., Con., Graph., Jod, Merc., Rhod., Sil.).  
 Tefiffelubflet, 174 (Ant. cr., Aur., Ign., Merc., Nitr. ac., Petrol.).  
 Tefiffelfvatterffot, see Vandbrof.  
 Tilberedning, af homøopathiffe Lægemibler, 34.  
 Trichiner, 163 (Arn., Ars., Chi., Ferr., Helleb., Rh. t.).

Trødfte, 295 (Bor., Kali chloric., Merc., Sulph. ac.).  
 Tuberculofe, Hjernens, 287 see Vand i Hovebet.  
 Tuberculofe, i Lungerne, 120 see Tøring.  
 Tungebelægning, 81.  
 Tungebelægning, hos Batte- børn, 278.  
 Tungebetændelfe, 79 (Acon., Arn., Bell., Canth., Lach., Merc.).  
 Tungebulf, 79 (Merc., Mur. ac., Nitr. ac.).  
 Tungebulføffhed, 79 Aur., Lach., Puls.).  
 Tungefammelfe, 79 (Caust., Mur. ac.).  
 Tungeffvulff, 79 (Acon., Ars., Con., Jod).  
 Tungefførigffhed, 70 (Bell., Caust., Con., Graph., Lach., Mang., Merc., Petrol., Pho., Puls., Sil., Sulph., Ver.).  
 Tøndernes Frembrud hos Børn, 264.  
 Tørendefieber, see heffiff Fieber.  
 Tøreorm (Anffgffffinner, Sub- orm), 184 (Ant. cr., Bell., Merc., Nitr. ac., Puls., Sep., Sulph.).  
 Tøreorm (Suborm), hos Batte- børn, 279.  
 Tøring, 315, 126, see Atropfi, (Arn., Ars., Bell., Bry., Calc., Chi., Ferr., Jod, Kali c., Kreos., Merc., Nitr. ac., Phos., Puls., Stann., Sulph.).

## U.

Udslet-Blære (Pemphigus),  
 279 (Merc., Rh. t.)  
 Udslet, 191 (Ars., Ant. c.,  
 Graph., Lach., Merc.,  
 Mez., Puls., Rh. t., Sulph.).  
 Udslettheden ved de homöop.  
 Lægemidler, 21.  
 Underlivsbetændelse, 137  
 (Acon., Ars., Bell., Bry.,  
 Canth., Hyosc., Ip.,  
 Merc.).  
 Underlivstrampe, 176, see  
 Menstrualkolik.  
 Uregelmæssigheder, i Smagen,  
 81.  
 Uregelmæssigheder, i Synet,  
 63.  
 Urin, dens Forandringer i  
 Sygdomme, 170.  
 Urin, dens Secretion (Af-  
 sondring), hos Bættedøgn,  
 256.  
 Urinbesværligheder, 170.  
 Urinbesværligheder, hos Frugt-  
 sammelige, 234 (Canth.,  
 Con., Puls.).  
 Urinbesværligheder, hos Bætte-  
 døgn, 273.  
 Urinladning, uvilkaarlig og  
 smertefuld, 184, 171, 317  
 (Bell., Carb. v., Caust.,  
 Chi., Dnlc., Hep. s., Puls.,  
 Sulph.).  
 Urinrørsforæmring, 170.  
 Urinstandning, 170 (Canth.,  
 Merc., Nux v., Sep.).  
 Urinsteensbesværligheder, 170.  
 Urinavgang (ved Hoste, Læ-  
 ter etc.), 171 (Ant. cr.,  
 Bry., Puls., Zinc.).

Urintrang, 171 (Arg., Bell.,  
 Petrosel., Puls., Spig.).  
 Urinladning, smertefuld, 170  
 (Acon., Arn., Bell.,  
 Camph., Canth., Cham.,  
 Merc., Nux v., Puls.,  
 Sulph.).

## B.

Vaccinationstopper, 323  
 (Acon., Sulph.).  
 Vandbrot, 174 (Graph., Jod,  
 Rhod., Sil.).  
 Vand, i Hovedet, medfødt,  
 288 (Helleb., Jod).  
 Vand, i Hovedet, 288 (Ap.,  
 Arn., Bell., Bry., Op.,  
 Sulph.), see Hjernebetæn-  
 delse.  
 Vandopkastning, 129 (Ars.,  
 Bell., Caust., Ip., Sulph.  
 ac.).  
 Vandstræt, 249.  
 Varices, 234, see Hærefnuder.  
 Varicose Saar paa Hænderne,  
 198 (Carb. v., Puls.,  
 Sulph.).  
 Varioloïder, 323 (Acon.,  
 Sulph.).  
 Varmen, hos Bættedøgn, 256.  
 Vandstet, efter Starlagens-  
 feber, 321 (Ars., Colch.,  
 Hell., Hep. s., Lyc.,  
 Merc., Rh. t.).  
 Beer, 237.  
 Beer, manglen, 237 (Coff.,  
 Op., Sab., Sec. c.).  
 Beer, for smertefulde, 237  
 (Acon., Bell., Coff.).  
 Beer, for svage, 237 (Nux v.,  
 Puls.).

Beitsbands, 331 (Hyosc., Ign., Stram.).

Benebndbelse, see Krampe-  
aare.

Werthoffst Sygdom, 213, see  
Blodplettsygdom.

Bindkopper, see Spidskopper.

Birkningstiden, for den ho-  
msopat. Medicin, 29.

Borter, 202 (Lyc., Sep., ud-  
vendig: Ver., Thuj.).

Brede, dens Følger, 275 (Cham.,  
Coff.).

Bannen fra, hos Pattedørn,  
240.

Bært, Børnenes, 266.

## A. B. C. D. E.

Uergrelse, følger af, 276  
(Cham., Coff.).

Dienbetændelse, 59, 291 (Acon.,  
Apis., Arn., Ars., Aur.,  
Bell., Euphras., Hep. s.,  
Merc., Nux v., Puls.,  
Spig.).

Dienbetændelse, hos Nyfødt,  
291 (Acon., Ars., Hep.  
s., Ign., Merc.).

Dienbetændelse, scrophuløs,  
292 (Acon., Apis., Ars.,

Aur., Bell., Calc., Can-  
nab., Con., Colch., Graph.,  
Hep. s., Merc., Rh. t.,  
Sil., Staph., Sulph., Thuj.).

Dinene, Flimren for, 64  
(Bell., Carb. v., Caust.,  
Cocc., Dig., Hep. s., Jod,  
Led., Petrol., Tart. em.,  
Thuja).

Dinene, Sæben i Sand, 64 (Eu-  
phras., Croc., Dig., Graph.,  
Merc., Pho., Puls., Rh.  
t., Spig.), see ogsaa Fys-  
stthed.

Dienfbagheb, 63 (Cann.,  
Euphras., Ruta).

Drebetændelse, 66 (Bell.,  
Merc., Puls., Sil.).

Drefusen, 70 (Bell., Bry.,  
Caust., Con., Graph.,  
Lach., Mang., Merc., Pe-  
trol., Pho., Puls., Sil.,  
Sulph., Ver.).

Dreflob, 68 (Aur., Bell.,  
Con., Dulc., Hep. s., Kali.  
c., Lach., Merc., Puls.,  
Sil., Sulph.).

Drefjertelbetændelse, 66, see  
Gaarefyge.

Drepine, 67 (Bell., Cham.,  
Merc., Nux v., Puls.).

Drebor, Anomalier, 70 (Carb.  
v., Lach.).



## Rettelser.

---

Pag.	29	5	Linie	f. n.	forstærket læs forstærket.
"	30	2	—	" "	til læs til.
"	"	3	—	" "	Forløb læs Forløb.
"	58	12	—	" o.	faa læs faae.
"	39	10	—	" n.	de udelades.
"	59	13	—	" "	helhrede læs helbrede.
"	65	4	—	" "	Alumnia læs Alumina.
"	66	8	—	" "	trætte læs trætter.
"	91	21	—	" "	Forværelse læs Forværelse.
"	92	11	—	" "	senegal læs Senega.
"	97	11	—	" "	efter læs ofte.
"	103	9	—	" n.	Tart. emetr. læs Tart. emet.
"	124	11	—	" o.	Calcaraea læs Calcareae.
"	143	18	—	" "	nitrium læs nitricum.
"	149	11	—	" "	Urinledningen læs Urinledningen.
"	156	2	—	" n.	verticolor læs versicolor.
"	172	2	—	" o.	Crudum læs crudum.
"	174	11	—	" n.	Silicia læs Silicea.
"	210	15	—	" "	Beeneber læs Beeneber
"	223	19	—	" o.	mod læs med.
"	238	4	—	" "	Fødselen læs Fødselen.
"	285	9	—	" "	vistnok læs vistnok.
"	298	12	—	" n.	Nordamerika læs Nordamerika.

## Alfabetisk Register.

Pag.	334	første	Spalte	9	Linie	f. n.	skal der efter Bell.
							saac Sepia.
"	335	—	—	3	—	f. o.	emi. læs emet.
"	336	anden	—	6	—	f. n.	vanvandigt læs van-
							digt.

---





# Homøopathisk Apothek,

4, Ny Østergade 4, 2den Sal.

Kjøbenhavn.

---

Apotheket er beliggende isoleret, og Medicinen tilberedes efter originale Forskrifter. — For Nøjagtighed garanteres. Bestillinger udføres prompte og hurtigt til moderate Priser. Ved Ordres bedes meddelt:

- 1) I hvilken Fortyndingsgrad (Potens) Medicinen ønskes, om i Draabeform, i Korn (Strøkugler) eller i Forrivning (Pulverform).
  - 2) Den nøjagtige Adresse.
  - 3) Naar Forsendelses- eller Betalingsmaaden ikke er angivet, benyttes Postforsendelse mod Postoprævning.
- 



## Hus- & Familie-Apotheker,

hensigtsmæssigt og elegant indrettede i polerede Trækasser og Papæsker til

## Homøopathisk Huus- & Familielæge,

af Dr. Clotar Müller.

Oversat fra Tydsk.

Gjennemseet og forøget af Oscar Hansen,

Cand. med. & chir., homøopathisk Læge.